

9.44. Azacitidine : (102/1/1、111/5/1、111/8/1、112/2/1、112/8/1、114/3/1、114/5/1、114/8/1、114/10/1、114/12/1)

9.44.1. Azacitidine 注射劑 (如 Vidaza) : (102/1/1、111/5/1、111/8/1、112/2/1、112/8/1、114/3/1、114/8/1、114/12/1)

1. 骨髓增生不良症候群高危險性病患：頑固性貧血併有過量芽細胞 (RA with excess blasts, RAEB)、轉變中的頑固性貧血併有過量芽細胞 (RAEB in transformation, RAEB-T)、及慢性骨髓單核細胞性白血病 (chronic myelomonocytic leukemia, CMMoL)。

(1) 初次申請時需經事前審查核准後使用，續用不需再事前審查，惟病歷應留存確診之病理或影像診斷證明等報告 (包括每4個月一次骨髓檢查報告以及 CBC/DC 報告)，並記錄治療相關臨床資料 (如每4個月一次臨床療效評估摘要)。(111/8/1、112/2/1、112/8/1、114/3/1、114/8/1、114/12/1)

(2) 使用本藥品之病患，倘疾病惡化至骨髓芽細胞 (myeloblast) 大於30%即停藥。(102/12/1、114/12/1)

(3) 不得併用 venetoclax 或轉換為口服劑型之 azacitidine 成分藥品。(114/12/1)

(4) 本藥品與 decitabine 僅能擇一使用，除因耐受性不良，不得互換。若因無法耐受 decitabine 而轉換至本藥品時需事前申請。使用本藥品無效後，不得再申請 decitabine。(111/5/1)

2. Azacitidine (除 Winduza 及 Azacitidine Lyophilized Inj 100mg "GBC" 以外) 併用 venetoclax，使用於無法接受高強度化學治療之初診斷急性骨髓性白血病 (AML) 病人。(114/8/1)

(1) 需具有下列 I. 或 II. 的條件之一：

I. 75歲以上。

II. 18歲以上但未滿75歲時，需 ECOG performance status 為 2 或 3，且符合下列任一條件者：

i. 具有心臟衰竭治療病史，且 left ventricle ejection fraction (LVEF) <50%。

ii. 具慢性肺部疾病史，且 DLCO <65%。

iii. 具肝功能異常：Bilirubin level 在1.5-3.0倍正常值間。

(2) 需未曾因骨髓化生不良症候群 (myelodysplastic syndrome, MDS) 接受過 azacitidine 或 decitabine 治療者。

(3) 需經事前審查核准後使用，每2個療程需再次申請；再次申請時需檢附療效評估資料，若病情惡化應即停止使用。

(4) 最多給付6個療程。