

2.6.1. 全民健康保險降血脂藥物給付規定表（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1）

降膽固醇藥物，適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一。但下表所列項目不適用表一，僅適用全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二。（115/9/1）

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
simvastatin	AC46402100	Simvatin film coating tablets 20mg
	AB47348100	Vatatin F.C. tablets 20mg "STANDARD"
	BC24339100	Simvahexal film-coated tablets 40mg
	AC49672100	Simatin F.C. tablets 20mg
	AC49841100	Simpotin F.C. tablets 20 mg "Weidar"
	AC47924100	Zostatin F.C. tablets 20 mg "S.C."
	BC23970100	Simvahexal film-coated tablets 20mg
	AC49360100	Bezostatin F.C. tablets 40 mg "S.C."
	AC48813100	Simvatenin F.C. tablets 20mg (simvastatin)
	AC56804100	Simvastatin F.C. tablets 20mg "CYH"
	AC49699100	Simatin F.C. tablets 10mg
	AC47907100	Sinty F.C. tablets 20mg
	AC48926100	Simva F.C. tablets 20 mg
	AC49190100	Sivasin film coated tablets 40mg
	AC58207100	Simvatin film coating tablets 40mg
	AC48608100	Simva F.C. tablets 20mg "Union"
	AC49997100	Simatin F.C. tablets 40 mg
	A055967100	Simva F.C. tablets 40mg "Union"
	AC56806100	Sinty F.C. tablets 40mg
lovastatin	AC39403100	Lozutin tablets 20mg (lovastatin)
	AC39307100	Delipic tablets 20mg "Standard" (lovastatin)
	A042389100	Lovatin tablets 20mg "PANBIOTIC"
pravastatin	BC23596100	Mevalotin protect 40mg tablets
	AC52581100	Joinlo tablets 40mg "EVEREST"
	AB49454100	Pratin tablets 40 mg (pravastatin sodium)
	AB48586100	Pavatin protect tablets 20mg "Standard" (pravastatin sodium)
	AB48681100	U-Chu Pavadin tablets 20 mg
	AB46029100	Pratin tablets 10mg (pravastatin sodium)
	AB48644100	Mechol tablets 20mg "Yung Shin"
	AB49021100	Pratin tablets 20 mg
	BC23597100	Mevalotin protect 20mg tablets
	AC57126100	Pavatin protect tablets 40mg "Standard"

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
		(pravastatin sodium)
	AC48469100	Mechol tablets 10mg "Yung Shin"
	AC57741100	Joinlo tablet 20mg EVEREST
fluvastatin	BC23556100	Lescol XL film-coated tablets 80mg
	BC26147100	Fluvastatin XL film-coated tablets 80mg
	AC56629100	Lecitol XL film-coated Tablets 80mg
atorvastatin	AC55272100	Atorva film-coated tablets 10mg "Standard" (atorvastatin)
	BA25337100	Tulip 20mg film coated tablets
	BA25200100	Tulip 10mg film coated tablets
	AC48879100	Anxolipo F.C. tablet 10 mg
	AC57267100	Atotin F.C. tablets 10mg
	AC51598100	Atoty F.C. tablets 10 mg
	AC58211100	Atotin F.C. tablets 20mg
	AC49226100	Anxolightor F.C. tablets 20 mg
	AC58517100	Atoroty F.C. tablets 20mg
	AC57805100	Atorva F.C. tab. 20mg "Standard" (atorvastatin)
	AA49543100	Atorin F.C. tablet 10mg
	BA25201100	Tulip 40mg film coated tablets
	AA57774100	Atover F.C. Tab. 10mg P.L.
	AC52530100	Atorin F.C. tablets 20mg
	AC55583100	Atorcal F.C. tablets 20mg "S.C."
	AC55895100	Atorcal F.C. tablets 10mg "S.C."
	AA57950100	Atover F.C. tablets 20mg P.L.
	AC55268100	Atorva film-coated tablets 40mg "Standard"(atorvastatin)
	AC55952100	Atoty F.C. tablets 20 mg
	AA56739100	Anxolipo F.C. tablets 20mg
	AC55956100	Lipiminus F.C. tablets 20mg
	AB54967100	Atover F.C. tablets 40 mg "P.L."
	AA49288100	Anxolipo F.C. tablets 40mg
	AC56319100	Lipiminus F.C. tablets 10mg
	AC57133100	Atotin F.C. tablets 40mg
	AC52301100	Lipiminus F.C tablets 40mg
	AC57930100	Atova F.C. tablets 10mg "Yu Sheng"
	AC56682100	Atoroty F.C. tablets 10mg
	AC50086100	Atorcal F.C. tablets 40 mg "S.C."
	AB57967100	Atorstin film coated tablets 10mg

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
	AC58041100	Atoty F.C. tablets 40mg
	AB57772100	Atorstin film coated tablets 40mg
	AB58049100	Atorstin film coated tablets 20mg
	AB51732100	Atorin F.C. tablets 40mg
	AC58262100	Atoroty F.C. tablets 40mg
rosuvastatin	AA57802100	Roty F.C. tablets 10mg
	AA57843100	Roty F.C. tablets 5mg
	BC24597100	Crestor 5mg film-coated tablets
	AC57803100	Roty F.C. tablets 20mg
	BC24129100	Crestor 20mg film-coated tablets
	AB57940100	Rosulator F.C. tablets 10mg "S.C."
	BC26543100	Alvostat film coated tablets 10mg
	AC59266100	Rostatin F.C. tablets 5mg "Standard"
	AC58282100	Rostatin F.C. tablets 10mg "Standard"
	AC58384100	Rosu F.C. tablets 10mg
	AC57130100	Rotlip film-coated tablets 10mg
	AC59652100	Rosulator F.C. tablets 5mg "S.C."
	AC57809100	Rolipostatin 10mg F.C. tablets "Macro"
	BC26900100	Zyrova 20 (rosuvastatin tablets 20mg)
	BC27782100	Zyrova 5 (rosuvastatin tablets 5mg)
	AC58969100	Aladdin F.C. tablets 10mg
	BC27781100	Zyrova 10 (rosuvastatin tablets 10mg)
	AC58067100	Rosutor film-coated tablets 10mg
	BC26544100	Alvostat film coated tablets 20mg
	AC60114100	Rosutor film-coated tablets 5mg
	AC59649100	Rosulip F.C. tablets 5mg C.H.
	AC58270100	Crosuty F.C. tablets 10mg
	AC58622100	Rotlip film-coated tablets 5mg
	AC58098100	Crosuty F.C. tablets 5mg
	AC60197100	Rosutor film-coated tablets 20mg
pitavastatin	BC25350100	Livalo tablets 2mg
	AA58648100	Pitarty F.C. tablets 2mg
	BC27002100	Livalo OD tablets 2mg
	AC58526100	Pitastatin F.C. tablets 2mg
	AC58633100	Pitarty F.C. tablets 4mg
	AC58525100	Pitastatin F.C. tablets 4mg
	AC59398100	Pivas F.C. tablets 2mg
	AC59192100	Pitanxo F.C. tablets 4mg

成分名稱	健保代碼	藥品名稱
	AC60561100	"EVEREST" Huiton F.C. tablets 2mg
	AC61795100	Pistatin F.C. tablets 2mg
	AC58078100	Pitavol F.C. tablets 2mg
	AC60174100	Pitavastatin F.C. tablets 2mg "CYH"
	AC59193100	Pitanxo F.C. tablets 2mg
	AC60290100	Lavitol film coated tablets 4mg
pravastatin 及 fenofibrate 複方	BC26169100	Pravafen 40mg/160mg hard capsules
atorvastatin 及 amlodipine 複方	BC24392100	Caduet 5mg/20mg tablet
	BC24391100	Caduet 5mg/10mg tablet
	AC59887100	Dualpress F.C. tablets 5mg/10mg
	AC60836100	Dualpress F.C. tablets 5mg/20mg

全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表一：(115/9/1)

ASCVD 風險等級	非藥物治療	起始藥物治療 血脂值	主要/（次要） 血脂目標值	處方規定
極高風險	處置各項可改善 心血管風險因子 與藥物治療並行	LDL-C $\geq$ 55mg/dL	LDL-C<55mg/dL(non- HDL-C<85mg/dL)	極高、非常高風險： 一、起始治療：依據基線血脂值、用藥史和臨床狀況，給予中至高強度 statin 或合併 ezetimibe。 二、經起始治療6~8週後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整至高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量，同時考慮合併 non-statin 治療，包含：ezetimibe、PCSK9單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase 抑制劑。 三、更動治療1~3個月內需追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整藥物組合。
非常高風險		LDL-C $\geq$ 70mg/dL	LDL-C<70mg/dL(non- HDL-C<100mg/dL)	
高風險	生活型態改變與 藥物治療並行	LDL-C $\geq$ 100mg/dL	LDL-C<100mg/dL(non- HDL-C<130mg/dL)	高風險： 一、起始治療：依據基線血脂值與臨床狀況，給予中至高強度 statin 或合併 ezetimibe；同時進行生活型態改變。 二、經起始治療6~8週後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮使用高強度 statin 或最大耐受 statin 劑
中風險	給藥前應有3-6 個月	LDL-C $\geq$ 115mg/dL	LDL-C<115mg/dL(non- HDL-C<145mg/dL)	
低風險	生活型態改變， 並處置心血管風	LDL-C $\geq$ 130mg/dL	LDL-C<130mg/dL(non- HDL-C<160mg/dL)	
0項心血管風 險因子	險因子	LDL-C $\geq$ 160mg/dL	LDL-C<160mg/dL	

				量或同時合併 non-statin 治療，包含：ezetimibe、PCSK9單株抗體、siRNA、ATP citrate lyase 抑制劑。 三、更動治療1~3個月內需追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每6個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並考慮調整藥物組合。 中、低風險： 一、起始治療：進行生活型態改變，並處置心血管風險因子。 二、經起始治療3~6個月後，檢測血脂指標，如治療達標，則維持治療，並應每6-12個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，給予中強度 statin。 三、中強度 statin 治療6~8週後追蹤血脂值是否達標，如治療達標，則維持治療，並應每6-12個月追蹤血脂指標；如血脂值未達標，檢視服藥狀況，並可給予高強度 statin 或最大耐受 statin 劑量或合併 non-statin 治療。
--	--	--	--	--

●ASCVD 風險等級定義：

一、極高風險：

(一)冠狀動脈疾病合併下列任一臨床狀況：

1. 一年內曾經歷心肌梗塞。
2. $\geq$ 兩次心肌梗塞病史。
3. 多支冠狀動脈阻塞。
4. 急性冠心症合併糖尿病。

5. 周邊動脈疾病或頸動脈狹窄。

(二) 周邊動脈疾病合併下列任一臨床狀況：

1. 冠狀動脈疾病。

2. 頸動脈狹窄。

二、非常高風險：

(一) 經臨床檢查確診為動脈硬化心血管疾病，包含：

1. 急性冠心症病史。

2. 接受血管再通術(心導管介入治療或外科冠狀動脈繞道手術)。

3. 缺血性中風/短暫性腦缺血發作合併動脈硬化相關疾病或病史。

4. 周邊動脈疾病(曾接受血管再通術、有肢體缺血相關症狀或截肢)。

(二) 經影像檢查確認有顯著斑塊負擔，定義為 $\geq 50\%$ 直徑狹窄率，包含：

1. 冠狀動脈血管攝影。

2. 冠狀動脈或周邊血管電腦斷層攝影。

3. 頸動脈或周邊血管超音波。

三、高風險：

(一) 糖尿病。

(二) 慢性腎臟病(進入透析治療前的慢性腎臟病，包括 $UACR \geq 30\text{mg/g}$ or $eGFR < 60\text{mL/min/1.73m}^2$ 至少持續3個月)。

(三) $LDL-C \geq 190\text{mg/dL}$ 。

(四) 冠狀動脈鈣化分數(CAC) ≥ 400 。

四、中風險：2項(含)以上心血管風險因子。

五、低風險：1項心血管風險因子。

● 心血管風險因子定義：

一、高血壓。

二、男性 ≥ 45 歲，女性 ≥ 55 歲。

三、早發性冠心病家族史(男性 ≤ 55 歲，女性 ≤ 65 歲)。

四、HDL-C：男性 $< 40\text{mg/dL}$ ，女性 $< 50\text{mg/dL}$ 。

五、抽菸。

六、代謝性症候群(符合以下至少三項)：

(一)腹部肥胖(男性 $\geq 90\text{cm}$ ，女性 $\geq 80\text{cm}$)。

(二)血壓偏高($\geq 130/85\text{mmHg}$ 或使用高血壓藥物)。

(三)空腹血糖偏高($\geq 100\text{mg/dL}$ 或使用糖尿病藥物)。

(四)空腹 TG 偏高($\geq 150\text{mg/dL}$ 或使用治療 TG 血脂藥物)。

(五)HDL-C 偏低(男性 $<40\text{mg/dL}$ ，女性 $<50\text{mg/dL}$)。

●各風險等級評估建議：

一、極高風險、非常高風險：

(一)初始評估應檢測完整血脂指標，並應於急性病人入院後24小時內完成血脂檢驗。

(二)處置各項可改善心血管風險因子，包含：血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。

二、高風險、中風險、低風險：

(一)給予完整血脂指標檢測，辨識各項可改善心血管風險因子，包含：血壓、HbA1c、肥胖、抽菸、酒精攝取、生活型態。

(二)ASCVD 風險分級為高風險，當有嚴重高膽固醇血症、肌腱黃色瘤、早發心血管疾病或家族病史時，應依照台灣家族性高膽固醇血症診斷標準進行家族性膽固醇血症篩檢。

(三)若未符合上述高風險條件，應以列在低至中風險欄位的心血管風險因子數量作為風險評估。

●當 LDL-C 達到理想治療目標後，非高密度脂蛋白-膽固醇(non-HDL-C)可作為血脂治療次要標的，其計算方式為總膽固醇數值減掉 HDL-C 數值，尤其適用於合併有高三酸甘油脂、糖尿病、或肥胖的病人以做進一步的心血管風險評估。

全民健康保險降膽固醇藥物給付規定表二：（86/1/1、87/4/1、87/7/1、91/9/1、93/9/1、97/7/1、102/8/1、108/2/1、115/9/1）

	非藥物治療	起始藥物治療血脂值	血脂目標值	處方規定
1. 有急性冠狀動脈症候群病史 2. 曾接受心導管介入治療或外科冠動脈搭橋手術之冠狀動脈粥狀硬化患者(108/2/1)	與藥物治療可並行	LDL-C $\geq$ 70mg/dL	LDL-C<70mg/dL	第一年應每3-6個月抽血檢查一次，第二年以後應至少每6-12個月抽血檢查一次，同時請注意副作用之產生如肝功能異常，橫紋肌溶解症。
心血管疾病或糖尿病患者	與藥物治療可並行	TC $\geq$ 160mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 100mg/dL	TC<160mg/dL 或 LDL-C<100mg/dL	
2個危險因子或以上	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TC $\geq$ 200mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 130mg/dL	TC<200mg/dL 或 LDL-C<130mg/dL	
1個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	TC $\geq$ 240mg/dL 或 LDL-C $\geq$ 160mg/dL	TC<240mg/dL 或 LDL-C<160mg/dL	
0個危險因子	給藥前應有3-6個月非藥物治療	LDL-C $\geq$ 190mg/dL	LDL-C<190mg/dL	

● 心血管疾病定義：

(一) 冠狀動脈粥狀硬化患者包含：心絞痛病人，有心導管證實或缺氧性心電圖變化或負荷性試驗陽性反應者(附檢查報告)

(二) 缺血型腦血管疾病病人包含：

1. 腦梗塞。
2. 暫時性腦缺血患者(TIA)。(診斷須由神經科醫師確立)
3. 有症狀之頸動脈狹窄。(診斷須由神經科醫師確立)

● 危險因子定義：

1. 高血壓
2. 男性 $\geq$ 45歲，女性 $\geq$ 55歲或停經者
3. 有早發性冠心病家族史(男性 $\leq$ 55歲，女性 $\leq$ 65歲)
4. HDL-C<40mg/dL
5. 吸菸(因吸菸而符合起步治療準則之個案，若未戒菸而要求藥物治療，應以自費治療)。

全民健康保險降三酸甘油酯藥物給付規定表

	非藥物治療	起始藥物治療三 酸甘油酯值	三酸甘油酯目 標值	處方規定
心血管疾病 或糖尿病病 人	與藥物治療 可並行	$TG \geq 200\text{mg/dL}$ 且 ($TC/HDL-C > 5$ 或 $HDL-C < 40\text{mg/dL}$)	$TG < 200\text{mg/dL}$	第一年應每3-6個月抽 血檢查一次，第二年 以後應至少每6-12個 月抽血檢查一次，同 時請注意副作用之產 生如肝功能異常，橫 紋肌溶解症。
無心血管疾 病病人	給藥前應有 3-6個月非藥 物治療	$TG \geq 200\text{mg/dL}$ 且 ($TC/HDL-C > 5$ 或 $HDL-C < 40\text{mg/dL}$)	$TG < 200\text{mg/dL}$	
無心血管疾 病病人	與藥物治療 可並行	$TG \geq 500\text{mg/dL}$	$TG < 500\text{mg/dL}$	