4.2.9.Concizumab（如 Alhemo）：（115/11/1）

1.限用於大於12(含)歲A型及B型血友病且有抗體病人(經 Bethesda 分析法證實帶有第八凝血因子或第九凝血因子抑制性抗體≥5.0BU)之預防性治療。

2.開始使用 concizumab 前，rFVIIa 治療應停用至少 12 小時，活化凝血酶原複合物濃縮(aPCC)治療應停用至少 48 小時，才能考慮開始使用。

3.若發生突發性出血時，不須調整劑量。若需要額外的繞徑藥物治療，建議依繞徑藥物核准仿單，使用最低核准劑量及用藥間隔。

4.需經事前審查核准後使用，初次申請以6個月為限，確定維持劑量後，每次申請一年為限。每次給付期滿後，須再次申請並經核准後方得續用。申請續用時，需檢附醫療評估追蹤紀錄表(附表十八之五)、關節出血次數、是否有血栓副作用發生等資料。

5.使用 concizumab 4 週後必須檢附 concizumab 血漿濃度，>4,000ng/mL 給予0.15mg/kg；若使用 0.25mg/kg，必須提出血中濃度<200ng/mL。其他劑量為0.2mg/kg。

6.門診之血友病人得攜回至多一個月藥量備用，繼續治療時，比照化療以「療程」方式處理，並查驗上次治療紀錄（如附表十八之七—全民健康保險血友病患者使用 Alhemo（concizumab)在家治療紀錄）及登錄醫療評估追蹤紀錄表(附表十八之五)。

7.不得與雙特異性單株抗體藥物(如 emicizumab)及 fitusiran 併用。

附表十八之五 重型血友病患「醫療評估追蹤紀錄表」

病人本人至少需於3個月回診時由醫師填寫一次醫療評估追蹤紀錄表

基本資料:

姓名: _____病歷號碼:_____年齡:_____ 歲 體重: _____ 公斤 身高: _____ 公分

血友病: □A型 □B型 □其他_____

回診分類:

□ **預防性注射**4歲及以下之病人，每2至4週應至少回診一次。

□ **預防性注射**4歲以上至12歲之病人，每4至6週應至少回診一次。

□ **預防性注射**12歲以上之病人，每6至8週應至少回診一次。

□ 有抗體之病人**治療時**(抗體最高歷史數值:_____BU/mL)，應該每4-8週至少回診一次

□ **需要時治療之無抗體重型血友病患，每3個月應至少回診一次**

□ **接受「皮下非補充製劑」的治療時，視同Prophylaxis 追蹤**

治療期間：____年___月___日 至 ____年___月____日

一、預防注射：使用劑量: 每公斤_____(單位:IU/μg/mg)

使用頻次：每_____週使用_____次 共 _____次數 共 _____單位/月

□fitusiran 每____月____mg

□concizumab每天____mg

□第八因子(藥名：_____)

□第九因子(藥名：_____)

□其他(藥名：_____)

_____次數 共 _____單位 (activated) PCC(藥名：_____)

_____次數 共 _____單位 recombinant factor VII(藥名：_____)

_____次數 共 _____單位 _____(藥名：_____)

二、出血時注射(突破性出血)：

出血部位：□腦部 □腸胃道 □呼吸道 □肌肉 □關節 □其他:_____

_____次數 共 _____單位 □第八因子 □第九因子 □其他

_____次數 共 _____單位 (activated) PCC(藥名：)

_____次數 共 _____單位 recombinant factor VII(藥名：)

_____次數 共 _____單位 _____(藥名：)

三、手術或侵入性處置: □ 無 □ 有 請說明:_____

四、抗體數值：_____BU /mL 檢驗日期:_____

(有抗體之病人請註明三個月內抗體檢測數值；無抗體之病人請註明一年內抗體檢測數值)

五、每年至少一次檢測最低凝血因子濃度(trough level)_____ 檢驗日:_____

(初次使用或更換預防性治療藥物時，需於第三個月檢測最低凝血因子濃度)；

fitusiran每兩個月至少一次檢測抗凝血酵素(anti-thrombin)濃度_____檢驗日:_____

六、治療計畫：

□維持治療

□調整治療

請說明:_____

□進一步檢查(例如:藥物動力學檢測)

請說明:_____

□療效評估(每年評估一次)

1.Pettersson score、HJHS、肌肉骨骼超音波：

請說明:_____

評估醫師:_____

2.HAL、QoL：

請說明: _____

3.不良事件反應：

請說明: _____

4.併發症：

請說明: _____

評估醫師: 日期:

□ **預防性注射**
□ **出血時注射**

附表十八之七　全民健康保險血友病患者使用「Alhemo（concizumab)」在家治療紀錄表

姓名：＿＿＿＿＿＿　　體重：＿＿＿＿＿公斤　　診斷：□A 型血友病合併第八因子抗體　□其他
□B 型血友病合併第九因子抗體

領藥日(年/月/日）：＿＿／＿＿／＿＿　　領藥量(支)：＿＿＿＿＿＿　　藥品名稱及批號：＿＿＿＿

繳回空筆數量及批號：＿＿＿＿＿＿＿＿　上次家中剩餘藥量(支)：＿＿＿＿　確認人員簽名(章)：＿＿＿＿

注射日	注射劑量	每支含量	出血原因		出血部位（請依背面圖示填寫）			注射後效果		注射後發生之不適症狀	注射者簽名(章)
（月/日）	(mg)		自發性出血	受傷後出血	代號或部位	左	右	改善	未改善		

備註：


1. 病人於下次回診需攜帶此紀錄表，並請黏貼於病歷，同時繳回已注射後之空筆備查。紀錄表未黏貼於回診病歷及未繳回空筆，則該項費用不予支付。
2. 領藥量請詳記藥品規格量及支數，例如：150mg/1.5mLx2 支，使用空筆於繳回時，請由醫療院所相關人員進行確認(包含回收空筆日期及總結存量等)，並請確認人員簽名(章)。
3. 出血部位說明請見背面圖示。

回收空筆日期：＿＿＿＿＿＿　　總結存量(支)：＿＿＿＿＿

Possible Sites of Joint Bleeding
關節可能出血的部位

9 肌肉出血
10 皮下出血
11 腸胃道出血
12 血尿
13 鼻腔出血
14 牙齦出血
15 口腔內出血
16 腦部出血

※如非關節出血，請直接於欄位中填寫出血部位。



★ most common
有記號者最容易出血處

15