4.2.8.Fitusiran(如 Qfitlia)：(115/8/1、115/11/1)

1.用於12歲以上帶有抗體及未帶有抗體的嚴重 A 型（FVIII 小於1%）或 B 型(FIX 小於1%）血友病病人之預防性治療。

2.在病人最初開始使用 fitusiran 治療的7天內，可以繼續使用原先的凝血因子或繞徑治療藥物預防性治療。在 fitusiran 開始治療7天後，則需要停用凝血因子或繞徑治療藥物預防性治療。

3.使用 fitusiran 預防性治療，若發生突破性出血或需要進行手術，需使用的凝血因子或繞徑治療藥物劑量則依 fitusiran 仿單「突破性出血處置指引」中的建議劑量使用。

4.需經事前審查後核准後使用。

(1) 初次申請以6個月為限，確定維持劑量後，每次申請1年為限。

(2) 期滿須再次申請並經核准後方得續用。申請續用時，需檢附並登錄醫療評估追蹤紀錄表(附表十八之五)、抗凝血酵素（anti-thrombin）濃度檢測報告、血栓事件紀錄及劑量調整等資料。

5.使用 fitusiran 治療前及治療後需每2個月檢測 AT 活性，並於給藥劑量調整後重新開始 AT 活性檢測。

6.排除使用的情形：出現肝功能損害者(Child-Pugh 分級 A、B 或 C)。

7.不得與雙特異性單株抗體藥物(如 emicizumab)及 concizumab 併用。(115/8/1、115/11/1)