

OLIMPIADE ASTRONOMI


Tingkat Kabupaten/Kota - 2015

Copyright (c) 2015 Ridlo W. Wibowo (ridlo.w.wibowo@gmail.com)
Sulistiyowati (sulis.astro08@gmail.com)

Solusi ini dibuat tanpa jaminan kesesuaian dengan solusi resmi dari juri olimpiade sains bidang Astronomi. Pengguna boleh menyebarluaskan dan/atau memodifikasi solusi ini dengan mencantumkan sumber asli. Hak cipta soal ada pada Kemendiknas dan dilindungi undang-undang.

Soal Pilihan Berganda

1. Gambar di bawah ini menunjukkan skala sudut deklinasi sebuah teleskop yang dilengkapi skala nonius.



Berapakah sudut deklinasi yang terukur?

- A. 10,04°
- B. 10,30°
- C. 11,30°
- D. 11,20°
- E. 11,40°

Jawaban: D

Pembacaan skala nonius:

1. Lihat nilai skala utama di sebelah kiri nol skala nonius. Dalam soal ini: 10°.
 2. Lihat skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Dalam soal ini: skala ke-3 dari 5.
 3. Sudut bacaan: $10^\circ + \frac{3}{5} \times 2^\circ = 11,20^\circ$ (2° adalah skala yang diwakili oleh 5 strip skala nonius).
-
2. Misalkan terdapat 28 astronom besar abad ini dan mereka setidaknya menjadi pakar di salah satu bidang: keplanetan, fisika bintang, atau kosmologi.


Jumlah astronom yang hanya ahli di bidang keplanetan sama dengan jumlah astronom yang ahli di bidang keplanetan dan fisika bintang. Tidak ada astronom yang hanya ahli fisika bintang atau hanya ahli di bidang kosmologi. Ada enam yang ahli di bidang keplanetan dan kosmologi. Kemudian, jumlah astronom yang ahli di bidang fisika bintang dan kosmologi lima kali lebih banyak dibandingkan jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang.

Bila jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang merupakan bilangan genap dan tidak nol, berapakah jumlah astronom yang hanya ahli di bidang keplanetan?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 9

Jawaban: A

Pernyataan yang dicetak miring di atas dapat diterjemahkan menjadi bentuk diagram seperti pada gambar berikut.



Berlaku:

$$\begin{aligned}
 x + x + y + 5y + 6 &= 28 \\
 2x + 6y &= 22 \\
 x + 3y &= 11
 \end{aligned} \tag{1}$$

disebutkan bahwa y merupakan bilangan genap tidak nol. Hanya ada 1 nilai y yang memenuhi [Persamaan 1](#), yakni 2. $y > 2$ memberikan x negatif, sehingga tidak mungkin. Jadi, $x = 5$.


3. Bila x buah teleskop survei dioperasikan selama x jam setiap hari selama x hari, teleskop tersebut dapat menemukan x kandidat planet ekstrasurya. Berapakah jumlah planet yang dideteksi (tidak harus bilangan bulat) oleh sebuah teleskop yang dioperasikan selama y jam setiap hari selama y hari?
 - A. $\frac{x^3}{y^2}$
 - B. $\frac{y^2}{x^2}$
 - C. $\frac{x^2}{y^2}$
 - D. $\frac{y^3}{x^2}$
 - E. y

Jawaban: B

Laju temuan: $\frac{x}{xxx} = \frac{1}{x^2}$ kandidat per teleskop per jam per hari. Untuk kasus pada soal, jumlah

kandidat yang ditemukan: laju penemuan kali jumlah teleskop kali jam operasi kali hari operasi. Jumlah teleskop = 1, karena yang ditanyakan “oleh sebuah teleskop”. Jumlah kandidat: $\frac{1}{x^2} \times 1 \times y \times y = \frac{y^2}{x^2}$.

4. Perhatikan gambar di bawah ini.




Di antara segitiga berikut, manakah yang sebangun dengan $\triangle AMN$?

- A. $\triangle ACD$
- B. $\triangle ADE$
- C. $\triangle ABN$
- D. $\triangle ABM$
- E. $\triangle DEN$

Jawaban: A

Pada gambar, $\angle ACD$ pasti siku-siku karena sudut tersebut terbentuk di lingkaran, menghadap diameter lingkaran. Dengan demikian, $\angle CDA = \angle NMA$, sehingga $\triangle ACD$ sebangun dengan $\triangle AMN$, digambarkan dalam gambar di bawah ini.




5. Sebuah planet memiliki massa M , volume V , serta kerapatan rata-rata ρ . Planet hanya terdiri atas inti batuan dengan kerapatan $\frac{3}{2}\rho$ serta mantel es dengan kerapatan $\frac{1}{2}\rho$. Berapakah rasio massa es terhadap massa total planet?

- A. 25,0%

- B. 50,0%
- C. 66,7%
- D. 75,0%
- E. 87,5%

Jawaban: A

Sketsa:



Bagian hijau menyatakan inti batuan. Massa total planet merupakan jumlahan antara massa inti m_b dan massa es m_e : $M = m_b + m_e$.

$$\begin{aligned}
 m_b &= \rho_b V_b = \frac{3}{2} \rho \frac{4}{3} \pi r_1^3 \\
 m_e &= \rho_e V_e = \frac{1}{2} \rho \frac{4}{3} \pi (R^3 - r_1^3) \\
 M &= \rho V = \rho \frac{4}{3} \pi R^3 \\
 \frac{m_e}{M} &= \frac{\frac{1}{2} \rho \frac{4}{3} \pi (R^3 - r_1^3)}{\rho \frac{4}{3} \pi R^3} \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{r_1}{R} \right)^3 \right)
 \end{aligned} \tag{2}$$

Hitung $\left(\frac{r_1}{R} \right)^3$.

$$\begin{aligned}
 M &= m_b + m_e \\
 \rho \frac{4}{3} \pi R^3 &= \frac{3}{2} \rho \frac{4}{3} \pi r_1^3 + \frac{1}{2} \rho \frac{4}{3} \pi (R^3 - r_1^3) \\
 R^3 &= \frac{3}{2} r_1^3 + \frac{1}{2} (R^3 - r_1^3) \\
 1 &= \frac{3}{2} \left(\frac{r_1}{R} \right)^3 + \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{r_1}{R} \right)^3 \right) \\
 \frac{1}{2} &= \left(\frac{r_1}{R} \right)^3
 \end{aligned} \tag{3}$$

Masukkan nilai ini ke dalam persamaan [Persamaan 2](#), didapat $\frac{m_e}{M} = \frac{1}{4} = 25\%$.

6. Dalam suatu sistem koordinat kartesian 2 dimensi, lingkaran Bumi dinyatakan dengan persamaan

$$x(x - 4) + y(y - 4) = -4$$

Sebuah partikel neutrino dipancarkan dari titik (4,6) dan mencapai Bumi di titik (2,4). Bila partikel terus bergerak lurus, di titik manakah ia akan keluar menembus Bumi?

- A. (0,0)
- B. (1,0)
- C. (2,0)
- D. (0,2)
- E. (0,1)

Jawaban: D

Titik-titik yang dilalui garis: $(x_1, y_1) = (4, 6)$ dan $(x_2, y_2) = (2, 4)$. Persamaan umum gerak partikel tersebut:

$$y = mx + c \tag{4}$$

Gradien dan [Persamaan 4](#) menjadi:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = 1 \tag{5}$$

$$y = x + c \tag{6}$$

Substitusi [Persamaan 4](#) ke titik 1, didapat: $6 = 4 + c$, $c = 2$, sehingga persamaan garis yang dilalui partikel menjadi $y = x + 2$. Untuk mencari lokasi partikel keluar menembus Bumi, cari perpotongan persamaan garis $y = x + 2$ dengan persamaan lingkaran Bumi. Salah satu titik perpotongan seharusnya titik 2 (2,4).

$$\begin{aligned} x(x - 4) + y(y - 4) &= -4 \\ x(x - 4) + (x + 2)(x + 2 - 4) &= -4 \\ x^2 - 4x + x^2 - 4 &= -4 \\ 2x^2 - 4x &= 0 \\ x^2 - 2x &= 0 \\ x(x - 2) &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ x_2 &= 2 \end{aligned}$$

$x = 2$ merupakan titik partikel masuk menembus Bumi, artinya, titik partikel keluar menembus Bumi: $x = 0$, $y = x + 2 = 2$, pada titik (0,2).

7. Sebuah awan bintang berbentuk bola memiliki radius 100 kali radius Matahari dan memiliki massa 8 kali massa Matahari. Awan tersebut berotasi dengan periode 2000 tahun. Kemudian, awan mengerut hingga radiusnya menjadi 5 kali radius Matahari. Berapakah periode rotasi awan yang telah mengerut?

- A. 100 tahun
- B. 50 tahun
- C. 20 tahun
- D. 5 tahun
- E. 1 tahun

Jawaban: D

Momentum sudut awan sebelum dan setelah pengerutan kekal. Jika diasumsikan awan seperti bola padat, $I_{awan} = \frac{2}{5}m_{awan}r_{awan}^2$. Massa awal (m_i) dan massa akhir (m_f) sama.

$$\begin{aligned}
 L_i &= L_f \\
 I_i\omega_i &= I_f\omega_f \\
 \frac{2}{5}m_i r_i^2 \frac{2\pi}{P_i} &= \frac{2}{5}m_f r_f^2 \frac{2\pi}{P_f} \\
 P_f &= \left(\frac{r_f}{r_i}\right)^2 P_i \\
 P_f &= \left(\frac{5R_\odot}{100R_\odot}\right)^2 2000 \\
 P_f &= 5,
 \end{aligned}$$

dalam satuan tahun.

8. Pada tahun 1850-an, John Herschel melakukan pengukuran pancaran energi Matahari yang sampai ke Bumi. Ia memanaskan 10^{-3} m^3 air ($C = 4200 \text{ J/kg/}^\circ\text{C}$) yang awalnya bertemperatur 25° C menjadi 50° C . Dengan menggunakan cermin pengumpul seluas 5 m^2 , ia memerlukan waktu selama 190 detik. Bila kerapatan air dianggap konstan ($\rho = 1 \text{ kg/m}^3$), berapakah radiasi Matahari yang diterima Bumi berdasarkan eksperimen Herschel?

- A. 560 W/m^2
- B. 860 W/m^2
- C. 1160 W/m^2
- D. 1360 W/m^2
- E. 1660 W/m^2

Jawaban: tidak ada

Kalor yang digunakan untuk memanaskan air: $Q = mC\Delta T = 10^{-3}4200(50 - 25) = 105 \text{ Joule}$.

Daya yang digunakan dalam proses tersebut: $P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{105}{190} = 0,55 \text{ Watt}$.

Radiasi Matahari yang diterima Bumi: $\frac{P}{\text{luas cermin}} = \frac{0,55}{5} = 0,11 \text{ Watt/m}^2$.

9. Gelombang elektromagnetik memiliki rentang spektrum yang amat lebar, dari sinar- γ hingga radio. Berapakah perbandingan energi radio 1400 MHz dengan energi sinar-X 100 keV? Diketahui $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ Joule}$.

Diketahui konstanta Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ dan cepat rambat cahaya $3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- A. $10^4 : 1$

- B. $10^1 : 1$
- C. $1 : 10^3$
- D. $1 : 10^7$
- E. $1 : 10^{11}$

Jawaban: E

Energi pada panjang gelombang radio: $E_r = hf = 6,63 \times 10^{-34} 1400 \times 10^6 \text{ JsHz}$ (Hz sama dengan s^{-1}), $E_r = 9,28 \times 10^{-25} \text{ Joule}$.

Energi sinar-X: $E_x = 100 \text{ keV}$, $E_x = 1,6 \times 10^{-14}$

Perbandingan: $\frac{E_r}{E_x} = 5,8 \times 10^{-11} = 1,72 \times 10^{10}$, jawaban paling mendekati pada orde $1 : 10^{11}$.

10. Orbit X yang mengorbit Matahari diketahui memiliki orbit elips. Bila kecepatan maksimumnya empat kali kecepatan minimumnya, berapa eksentrisitas orbit objek tersebut?

- A. 0,0
- B. 0,2
- C. 0,4
- D. 0,6
- E. 0,8


Jawaban: D

Pada elips berlaku: $v_r^2 = 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{2a} \right)$.

Kecepatan maksimum v_p didapat ketika jarak minimum (di perihelion) sedangkan kecepatan minimum v_a didapat ketika jarak maksimum (di aphelion).

$$\begin{aligned} \frac{v_p^2}{v_a^2} &= \frac{2GM \left(\frac{1}{r_p} - \frac{1}{2a} \right)}{2GM \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{2a} \right)} = \frac{\left(\frac{1}{a(1-e)} - \frac{1}{2a} \right)}{\left(\frac{1}{a(1+e)} - \frac{1}{2a} \right)} = \frac{\frac{2-1+e}{2(1-e)}}{\frac{2-1-e}{2(1+e)}} = \frac{(1+e)^2}{(1-e)^2} \\ \frac{v_p}{v_a} &= \frac{(1+e)}{(1-e)} = 4 \\ 4 - 4e &= 1 + e \\ 5e &= 3 \\ e &= 0,6 \end{aligned}$$

11. Perhatikan gambar di bawah ini:



Sebuah tabung U berdiameter 1,25 cm diisi dengan air ($\rho = 1 \text{ g/cc}$) dan minyak yang tidak diketahui massa jenisnya. Bila tabung, air, dan minyak tersebut dipindahkan ke Mars yang memiliki gravitasi permukaan 4 m/s^2 dan tekanan atmosfer 10^4 Pa , maka ...

- A. ketinggian minyak (diukur dari garis batas air-minyak) akan berubah menjadi 0,5 cm.
- B. ketinggian minyak (diukur dari garis batas air-minyak) akan berubah menjadi 0,4 cm.
- C. tekanan hidrostatik di titik A adalah $P_A \approx 4 \times 10^4 \text{ Pa}$.
- D. tekanan hidrostatik di titik A adalah $P_A \approx 1 \times 10^4 \text{ Pa}$.
- E. air akan menguap sebelum pengukuran dapat dilakukan.

Jawaban: E


Beda ketinggian antara minyak dan air hanya bergantung pada beda kerapatan mereka. Meskipun lingkungan berubah, karena kerapatan masing-masing tetap, beda ketinggian akan tetap sama.

$$\begin{aligned}\rho_{\text{minyak}} g h_{\text{minyak}} &= \rho_{\text{air}} g h_{\text{air}} \\ \rho_{\text{minyak}} &= \frac{h_{\text{air}}}{h_{\text{minyak}}} \rho_{\text{air}} \\ \rho_{\text{minyak}} &= \frac{1}{2} \rho_{\text{air}}.\end{aligned}$$

Di Mars, tekanan hidrostatik di A: $P = \rho_{\text{minyak}} g_{\text{Mars}} h = 500 \times 4 \times 0,02 = 40 \text{ Pa}$.

Dari hasil ini, opsi A-D tidak mungkin, sehingga opsi yang mungkin adalah E. Selain itu baca kembali berbagai sumber mengenai keberadaan air dalam bentuk cair di Mars. Akan banyak ditemukan penjelasan bahwa air dalam wujud cair akan segera menguap di Mars.

Berikut diagram fase air, dan terlihat bahwa jika di Bumi dengan berbagai suhu memungkinkan 3 wujud air, yaitu gas, cair, dan padat. Berbeda untuk Mars, tekanan atmosfer yang rendah membuat air tidak mungkin terbentuk dalam wujud cair, berbagai kemungkinan suhu di Mars (garis merah) hanya menghasilkan wujud air sebagai padatan (es di permukaan) atau gas.



Source: <http://www.iceandclimate.nbi.ku.dk/>

12. Benda A bermassa 2 satuan berada di koordinat $(-1,2)$, sedangkan benda B dengan massa 4 satuan berada di koordinat $(2,-1)$. Di manakah posisi pusat massa sistem dua benda tersebut?

- A. $(0,0)$
- B. $(4,0)$
- C. $(6,0)$
- D. $(1,-4)$
- E. $(1,-6)$

Jawaban: tidak ada

Pusat massa sistem: (x_{pm}, y_{pm}) .

$$x_{pm} = \frac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B} = \frac{-2+8}{6} = 1.$$

$$y_{pm} = \frac{m_A y_A + m_B y_B}{m_A + m_B} = \frac{4-4}{6} = 0.$$

Koordinat pusat massa: $(1,0)$

13. Terang bintang dinyatakan dalam skala magnitudo (m) yang merupakan logaritma dari energinya yang diterima (E). Menurut Pogson, $m = -2,5 \log E + C$, dengan C menyatakan suatu konstanta.

Misalkan terdapat dua bintang dengan energi masing-masing 10^2 dan 10^4 satuan, sementara bintang pertama memiliki magnitudo $+3$, berapakah magnitudo bintang kedua?

- A. $+2$ mag
- B. $+0$ mag
- C. -2 mag
- D. -5 mag
- E. -8 mag

Jawaban: C

$$m_2 - m_1 = -2,5 \log E_2 + C - (-2,5 \log E_1 + C)$$

$$m_2 - m_1 = -2,5 \log \frac{E_2}{E_1}$$

$$m_2 - m_1 = -2,5 \log \frac{10^4}{10^2}$$

$$m_2 - m_1 = -5$$

$$m_2 = -2$$

14. Tabel berikut merangkum jumlah bintang dalam rentang magnitudo tertentu yang teramati oleh sebuah teleskop:

Magnitudo	Jumlah
6,0-8,0	10
8,0-10,0	23
10,0-12,0	45
12,0-14,0	30
14,0-16,0	11

Berapakah nilai modus dari distribusi tersebut?

- A. 10,0
- B. 10,2
- C. 11,0
- D. 11,2
- E. 12,0

Jawaban: D

Pada data berkelompok, nilai modus: $M_o = L + \frac{\Delta f_1}{\Delta f_1 + \Delta f_2} C$, L menyatakan tepi bawah kelas modus, Δf_1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, Δf_2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, C panjang kelas.

Untuk soal tersebut: $M_o = 10,0 + \frac{22}{22+15} 3 = 11,28$. Dalam pilihan jawaban, yang paling mendekati: 11,2.

15. Jumlah foton (berpanjang gelombang $\lambda = 555 \text{ nm}$) minimum per detik yang diperlukan untuk menimbulkan rangsangan visual pada mata normal adalah 100 buah. Berapa energi 100 foton tersebut bila dinyatakan dalam watt?

Diketahui konstanta Planck $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ Js}$ dan cepat rambat cahaya $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$.


- A. $1,0 \times 10^{-17} \text{ watt}$
- B. $2,3 \times 10^{-17} \text{ watt}$
- C. $3,6 \times 10^{-17} \text{ watt}$
- D. $4,9 \times 10^{-17} \text{ watt}$
- E. $0,0 \times 10^{-17} \text{ watt}$

Jawaban: C

Energi per satu foton $= \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \cdot 3,00 \times 10^8}{5,55 \times 10^{-7}} = 3,58 \times 10^{-19} \text{ joule}$.

Energi 100 foton yang diterima per detik $= 3,58 \times 10^{-17} \text{ watt}$.

16. Seorang insinyur dari LAPAN mengaku menemukan sebuah zat pendingin roket berbahan dasar air. Zat tersebut dilewatkan di antara 3 buah roket yang saling terhubung seperti tampak pada gambar berikut ini.




Bila roket memiliki radius R dan tinggi 30 meter, berapakah volume zat pendingin yang dapat dilewatkan pada celah tersebut?

- A. $30(\sqrt{3} - \frac{1}{4}\pi)R^2$
- B. $15(\sqrt{\frac{3}{4}} - \frac{1}{2}\pi)R^2$
- C. $30(\sqrt{5} - \frac{1}{3}\pi)R^2$
- D. $60(\sqrt{\frac{3}{4}} - \frac{1}{4}\pi)R^2$
- E. $15(2\sqrt{5} - \frac{1}{4}\pi)R^2$

Jawaban: D

Sketsa bantu:



$$\text{Luas segitiga sama sisi} = \frac{1}{2} \cdot 2R \cdot \sqrt{3}R = \sqrt{3}R^2.$$

$$\text{Luas tiga juring} = 3 \cdot \frac{60^\circ}{360^\circ} \cdot \pi R^2 = \frac{1}{2}\pi R^2.$$

$$\text{Volume celah} = 30 \left(\sqrt{3} - \frac{1}{2}\pi \right) R^2 = 60 \left(\sqrt{\frac{3}{4}} - \frac{1}{4}\pi \right) R^2.$$

17. Planet Mars dalam kebudayaan Jawa seringkali disebut sebagai “bintang” *Jaka Belek* karena warnanya yang kemerahan. Mengapa planet Mars tampak kemerahan?

- A. Karena planet Mars memantulkan cahaya Matahari yang berwarna jingga kemerahan.
- B. Karena atmosfer Mars mengandung gas rumah kaca CO_2 yang menyekat panas.
- C. Karena cahaya planet Mars diserap oleh atmosfer Bumi, maka terlihat kemerahan seperti Matahari saat senja.

- D. Karena planet Mars diselubungi *aerosol* yang menghamburkan cahaya biru.
- E. Karena permukaan Mars diselimuti oksida besi yang berwarna kemerahan.

Jawaban: E

18. Planet Venus merupakan planet anggota Tata Surya dengan temperatur global paling tinggi, $T \simeq 700$ K, penyebabnya adalah ...
- A. tingginya energi kinetik partikel bermuatan yang dibawa angin Matahari.
 - B. pengerutan gravitasi Venus menghasilkan energi termal yang lebih tinggi.
 - C. Venus menerima radiasi matahari 90% lebih banyak dibandingkan Bumi.
 - D. konsentrasi karbondioksida di atmosfer Venus amat tinggi, menjebak lebih banyak panas yang diterimanya dari Matahari.
 - E. Venus memiliki albedo yang lebih tinggi dibandingkan planet-planet lain.

Jawaban: D


Efek rumah kaca (*runaway greenhouse effect*). Energi yang diterima Venus memang lebih besar namun jika hanya itu penyebabnya tidak akan mampu menaikkan suhu hingga 700 K.

19. Seorang astronom dari planet San Fierro sedang mengukur diameter sudut dari satelit yang bernama Lupin. Astronom tersebut hanya mengandalkan jengkal tangannya untuk melakukan pengukuran. Diketahui bahwa diameter Lupin adalah 6000 km sedangkan jaraknya dari permukaan San Fierro adalah 15000 km. Berapakah diameter sudut Lupin yang terukur dengan asumsi bahwa satu jengkal tangan setara dengan bentangan sudut 20° ?
- A. Sekitar 1 jengkal
 - B. Sekitar $1/2$ jengkal
 - C. Sekitar $1/4$ jengkal
 - D. Tepat 2 jengkal
 - E. Tepat $3/2$ jengkal

Jawaban: A

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= \frac{3000}{15000} \\ \sin \alpha &= 0.2 \\ \alpha &= 11.5^\circ \\ \delta &= 2\alpha = 23^\circ\end{aligned}$$


Sketsa bantu:



20. Diketahui rapat jumlah debu antar bintang sebesar ρ sedangkan luas penampang tiap debu adalah σ . Maka, jarak rata-rata yang ditempuh setiap debu sebelum bertumbukan dengan debu lain adalah

- A. $\rho\sigma$
- B. $\frac{\rho}{\sigma}$
- C. $\frac{1}{\rho\sigma}$
- D. $\log \frac{\rho}{\sigma}$
- E. $\left(\frac{\sigma}{\rho}\right)^{1/4}$

Jawaban: C



Andaikan luas penampang tumbukan tiap debu adalah σ , maka sepanjang lintasan L yang ia lalui akan berpeluang bertemu partikel sejumlah N . Lintasan tersebut dapat digambarkan sebagai tabung dengan alas σ dan panjang L . Jumlah partikel yang mungkin ia “temui” adalah $N = \rho V = \rho\sigma L$. Sehingga jarak rata-rata tiap tumbukan dapat dihitung:

$$\text{mean free path} = \frac{\text{panjang lintasan}}{\text{jumlah partikel di lintasan}} = \frac{L}{\rho\sigma L} = \frac{1}{\rho\sigma}$$

21. Ceres is the largest main-belt asteroid which mainly consists of stone. The mass of this small body is roughly 1/6500 times Earth’s mass, while the radius is just 1/13 Earth’s radius. How weak does the surface gravity of Ceres pull a falling body, compared to the Earth’s gravity?

- A. 500 times weaker
- B. 137 times weaker
- C. 38 times weaker
- D. 22 times weaker
- E. 6 times weaker

Jawaban: C

$$M = \frac{1}{6500} M_E \text{ dan } R = \frac{1}{13} R_E$$

$$\frac{g}{g_E} = \frac{\frac{GM}{R^2}}{\frac{GM_E}{R_E^2}} = \frac{M}{M_E} \left(\frac{R_E}{R}\right)^2$$

$$\frac{g}{g_E} = \frac{1}{6500} 13^2$$

$$g = 0.026g_E \text{ atau } 38.46 \text{ kali lebih kecil.}$$

22. There is a terrestrial planet without atmosphere which the maximum surface temperature is mainly governed by three factors: (1) incoming radiation from its star, (2) albedo or reflectance of the planet, and (3) its rotation. Among the following statements, which one is correct?
- Planet's maximum temperature will be lower if the planet rapidly rotates around its axis.
 - Planet's maximum temperature will be higher if the planet rapidly rotates around its axis.
 - If the planet has high reflectivity, then the maximum temperature will be higher.
 - If the planet has low albedo, then the maximum temperature will be lower.
 - High stellar radiation melts the ice polar cap and chill the planet.

Jawaban: A

Rotasi yang cepat membuat suhu permukaan yang menghadap (siang) dan tidak menghadap bintang (malam) menjadi lebih merata.

Albedo atau reflektansi merupakan perbandingan energi yang dipantulkan dengan yang diterima, sehingga semakin besar nilainya maka semakin rendah temperatur maksimumnya dan sebaliknya.

Gunakan petunjuk ini untuk menjawab soal-soal berikut:

- 1, 2, dan 3 benar
- 1 dan 3 benar
- 2 dan 4 benar
- hanya 4 benar
- semua salah

23. Misalkan $a \blacktriangleright b$ menyatakan operasi dua bilangan a dan b yang menghasilkan nilai terbesar antara keduanya, sedangkan $a \blacktriangleleft b$ menghasilkan bilangan terkecil antara keduanya. Berlaku pula hubungan $a \blacktriangleright a = a$ dan $a \blacktriangleleft a = a$. Di antara pernyataan berikut mana yang benar?

- $a \blacktriangleright b = b \blacktriangleright a$
- $a \blacktriangleright (b \blacktriangleright c) = (a \blacktriangleright b) \blacktriangleright c$
- $a \blacktriangleleft (b \blacktriangleright c) = (a \blacktriangleleft b) \blacktriangleright (a \blacktriangleleft c)$
- $a \blacktriangleleft (b \blacktriangleright c) = (a \blacktriangleleft b) \blacktriangleright c$

Jawaban: A

No 1 dan 2 jelas benar sehingga 3 juga kemungkinan benar. Cara paling mudah, dicoba untuk nilai $a > b$ dan c , $a < b$ dan c , dan nilai a diantara b dan c . :)

24. Bila diketahui bahwa vektor $\vec{A} = 2i + j - k$ dan vektor $\vec{B} = i - 2j + 2k$, maka pernyataan yang benar adalah

- $\vec{A} + \vec{B} = 3i - j + k$
- $\vec{A} \cdot \vec{B} = 2i - 2j - 2k$
- $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ berada di bidang yz
- \vec{A} dan \vec{B} membentuk sudut $< 60^\circ$.

Jawaban: B

$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= (2 \cdot 1) + (1 \cdot -2) + (-1 \cdot 2) = 2 \\ \|A\| \|B\| \cos \theta &= 2 \\ \sqrt{6} \sqrt{9} \cos \theta &= 2 \\ \theta &= 74.2^\circ\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{C} &= \vec{A} \times \vec{B} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} i - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} j + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} k \\ &= 0i - 5j - 5k \\ &\text{berada di bidang } yz\end{aligned}$$

25. On November 14th 2014, Rosetta project operated by European Space Agency has successfully landed its spacecraft on the surface of comet C67/P Churyumov-Gerasimenko. The landing was hard process, but a great achievement because of the following reason, except...
1. The comet exerts a very low gravitational force to the spacecraft.
 2. there are so many debris encircling the comet.
 3. the spacecraft bounced several times before it actually landed.
 4. at that time, the comet was located very far away from Earth, outside the orbit of Neptune.

Jawaban: D

Orbit komet berada di dalam orbit Jupiter ketika Rosetta (Philae) mendarat, jadi pernyataan ke-4 salah. Sedikit gas dan debu akan dikeluarkan oleh komet, “mungkin” dapat mengganggu misi (misal dapat [menutupi solar panel](#)). Ingat ada kata *except* di situ sehingga jawabannya D. Sumber: cari berita terkini sains dan astronomi.

Gunakan petunjuk ini untuk menjawab soal-soal berikut:

- A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab-akibat.
 - B. Pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak memiliki hubungan sebab-akibat.
 - C. Pernyataan pertama benar, sedangkan pernyataan kedua salah.
 - D. Pernyataan pertama salah, sedangkan pernyataan kedua benar.
 - E. Kedua pernyataan salah.
26. Bumi mengalami gerak presesi seperti gasing yang berputar miring. Gerak tersebut mengubah anggota rasi bintang zodiak yang dilalui Matahari setiap tahunnya.

sebab

Titik *vernal equinox*, yang menandai perpotongan garis ekuator langit dan ekliptika, bergeser ke arah Timur sedikit demi sedikit.

Jawaban: E

Presesi mengubah arah sumbu rotasi Bumi, namun tidak mengubah bidang ekliptika, sehingga anggota zodiak akan tetap sama. Titik *vernal equinox* di langit bergeser ke arah Barat.

27. Jika orbit Bumi berubah menjadi 7 satuan astronomi (sa), maka 1 *parsec* setara dengan $1,55 \times 10^{14}$ km.

sebab

Satu *parsec* merupakan jarak bintang ketika Matahari, bintang, dan Bumi membentuk sudut sebesar satu menit busur.

Jawaban: E

Satu *parsec = parallax second* merupakan jarak bintang ketika Matahari, bintang, dan Bumi membentuk sudut sebesar satu “detik” busur. Jarak satu *parsec* apabila orbit Bumi 7 sa menjadi $2,16 \times 10^{14}$ km.

28. Aurora does not occur everyday.

because

This phenomenon is caused by bombardment of energetic particles from the active Sun.

Jawaban: D

Aurora terjadi setiap hari, terjadi karena partikel-partikel bermuatan dari angin Matahari yang dibelokkan oleh medan magnet Bumi sebagian sampai ke atmosfer melalui kutub-kutub magnetnya, semakin jelas ketika aktivitas Matahari meningkat. Terlihat atau tidaknya tergantung banyak faktor, antara lain: lintang pengamat (hanya daerah dekat kutub yang bisa melihat), cerah tidaknya langit, siang malam, musim, polusi cahaya, dan tentunya aktivitas Matahari.

29. We can see dark and patchy region with less stars around the constellation of Sagittarius, the direction of galactic center.

because

Our Milky Way galaxy hosts a super-massive black hole in its center that swallows surrounding gas and stars.

Jawaban: B

Arah pusat terlihat gelap karena banyak debu yang mengisi ruang antar bintang.

30. In March 9th 2016, magnificent total solar eclipse will occur and can be observed in several region in Indonesia.

because

The umbral shadow will be crossing South Sumatra, Kalimantan, and Halmahera island.

Jawaban: A

Tunggu saja... tanggal 9 Maret 2016! :)

Sumber: cari info peristiwa astronomi.

[Link NASA](#)