

KdV 方程在可测集上的两点时刻能观测不等式

汇报人: 王允磊

指导老师: 王明

学院: 数学与物理学院



2021-11-22

介绍: 能观测不等式

在偏微分方程中, 对演化方程建立能观测不等式一直是非常重要的课题. 例如, 考虑薛定谔方程

$$i\partial_t u - \Delta u = 0, \quad u(0, x) = u_0(x) \in L^2(\Omega), \quad (1)$$

其中 $u_0(x)$ 是方程的初始函数, 上述方程的解函数设为 $u(t, x)$.

如果对于某个区域 $\omega \subset \Omega$, 存在常数 $C = C(\omega, T)$ 使得

$$\int_{\Omega} |u(T, x)|^2 dx \leq C \int_0^T \int_{\omega} |u(t, x)|^2 dx dt \quad (2)$$

成立, 我们把该不等式称为给定方程的能观测不等式.

两点能观测不等式

前面提到的结果中, 观测时间总是一个开区间, 即在时间轴上的一个正测度集上稠密.

那么观测时间可以取某种意义上更小的集合吗?

这在某些方程某些情形下是可以的. 考虑下述薛定谔方程

$$i\partial_t u - \Delta u = 0, \quad u(0, x) = u_0(x) \in L^2(\mathbb{R}^n). \quad (3)$$

Gengsheng Wang, Ming Wang, Yubiao Zhang[JEMS, 2019] 证明了下述定理

薛定谔方程两点时刻能观测不等式

对所有满足方程 (3) 的 $u(t, x)$ 都有

$$\int_{\mathbb{R}^n} |u_0(x)|^2 dx \leq C e^{\frac{Cr_1 r_2}{t}} \left(\int_{|x| \geq r_1} |u_0(x)|^2 dx + \int_{|x| \geq r_2} |u(t, x)|^2 dx \right). \quad (4)$$

不确定性原理

函数 f 的傅立叶变换为

$$\widehat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix \cdot \xi} \, d\xi. \quad (5)$$

调和分析中的不确定性原理告诉我们: 如果一个函数及其傅立叶变换在无穷远处等于 0, 则这个函数恒为 0.

Logvinenko-Sereda[Teor. Funkc. Funkc. Anal., 1974] 证明了

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 \, dx \leq C e^{Cr_1 r_2} \left(\int_{|x| \geq r_1} |f(x)|^2 \, dx + \int_{|x| \geq r_2} |\widehat{f}(\xi)|^2 \, d\xi \right). \quad (6)$$

不确定性原理有许多不同控制区域的版本, 而之前提到的定理完整版其实就是建立了不确定性原理和两点能观测不等式的等价关系.

薛定谔方程两点能观测不等式的特点

- 该不等式一改之前时间上必须是开区间的限制, 把一段时间改进到了两点时刻. 在此之前, 全空间情形下的结果只有在一段时间上有界区域外的能观测不等式, 该结果由 Rosier-Zhang[JDE, 2009] 证明.
- 建立了能观测不等式和不确定性原理的等价性.
- 常数关于 r_1, r_2 的依赖关系是最优估计, 相应的两点时刻也是最优.

KdV 方程两点能观测不等式

考虑下述线性 Korteweg-de Vries (KdV) 方程

$$\partial_t u + \partial_x^3 u = 0, \quad u(0, x) = u_0(x) \in L^2(\mathbb{R}). \quad (7)$$

一个自然而然的问题是, KdV 方程是不是也有类似的两点能观测不等式?

KdV 方程在这方面的结果和薛定谔方程类似, 有许多定性的唯一延拓性:

- [B.Y. Zhang, SIAM J. Math. Anal., 1992] 若 u 在 $(-\infty, c) \times t_0, t_1$ 上等于零, 则 $u \equiv 0$.
- [J. Bourgain, IMRN, 1997] 若 u 在球外的一段时间等于零, 则 $u \equiv 0$, 这对非线性情形也成立.
- [Kenig et.al., JFA, 2007; Bull. AMS, 2012] 当 u 在 t_0, t_1 处指数衰减, 则 $u \equiv 0$.

相关进展

设 $B_r = [-r, r]$, B_r^c 表示 B_r 在全空间 \mathbb{R} 上的补集, 也就是 $B_r^c = (-\infty, -r) \cup (r, \infty)$.

KdV 方程两点时刻能观测不等式 (Ze Li, Ming Wang[SIMA, 2021])

对所有满足方程 (7) 的 $u(t, x)$ 都有

$$\int_{\mathbb{R}} |u_0(x)|^2 dx \leq C e^{Ct^{-\frac{4}{3}}(r_1^4 + r_2^4)} \left(\int_{B_{r_1}^c} |u_0(x)|^2 dx + \int_{B_{r_2}^c} |u(t, x)|^2 dx \right). \quad (8)$$

该不等式与之前的两点能观测不等式一样, 具有相同的形式, 但是这个结果只是对 B_{r_1} 和 B_{r_2} 这类有界集成立.

研究方向

正如前面所提到的, 已有的 KdV 方程两点能观测不等式仅仅对观测区域为有界集外成立, 我们的目标是放宽有界的限制, 主要集中在下面两个方面:

- 1 突破有界限制, 将观测区域推广到一般的测度有限集合外.
- 2 突破 B_{r_1} 和 B_{r_2} 这类集合的测度有限的限制, 使得观测区域可以是某些测度无限的集合外.

根据这两个方向, 我们相应得到了两个主要结果.

主要结果 I

KdV 上两点时刻可测集外能观测不等式

设 S, Σ 为可测集且测度有限, 即 $|S|, |\Sigma| < \infty$. 则对于任意的 $t > 0$, 存在常数 $C = C(t, S, \Sigma) > 0$ 使得满足

$$\partial_t u + \partial_x^3 u = 0, \quad u(0, x) = u_0(x) \in L^2(\mathbb{R}).$$

的所有解 $u(t, x)$ 都如下的两点能观测不等式成立

$$\int_{\mathbb{R}} |u_0(x)|^2 dx \leq C \left(\int_{\mathbb{R} \setminus S} |u_0(x)|^2 dx + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |u(t, x)|^2 dx \right). \quad (9)$$

其中 $C = C(t, |S|, |\Sigma|)$ 是一个仅与 $t, |S|, |\Sigma|$ 相关的常数.

举例与讨论

对比 Ze Li, Ming Wang 的 KdV 能观测不等式的结果, 它们的区别是:

集合 $|S|, |\Sigma|$ 更广泛, 而 Ze Li, Ming Wang 的观测区域外必须满足 $S \subset B_{r_1}(0), \Sigma \subset B_{r_2}(0), r_1, r_2 > 0$.

例如, 对于集合 $S = \Sigma = \bigcup_{n=1}^{\infty} (n, n + \frac{1}{n^2})$, 显然它们都是有限可测集, 但是它们是无界的, 即不包含在任何有界区域内. 对于无界有限测度集合, Ze Li 和 Ming Wang 证明方法无能为力.

主要难点

在我们的主要结果 I 中, 取消了有界性这一限制, 这使得我们不得不放弃运用解析性质的思路, 另辟蹊径. 我们最终选择了更加一般化的算子方法, 从而去除了有界的限制.

但是另一方面, 我们也牺牲了精确的常数依赖关系.

常数估计

前面提到我们的方法限制, 从而无法计算出相应的常数, 但是实际上, 如果两个集合的测度足够小, 比如

$$|S||\Sigma| < 1,$$

我们依然可以得到一个相对之前更加精确的常数:

$$C = \frac{C'(t)}{1 - |S||\Sigma|}.$$

集合密度

接下来我们想在原有的方法基础上, 突破测度有限的限制. 在介绍我们的主要结果 II 之前, 我们需要引入一个概念:

α 密度集

一个可测集 A 称为具有 $|x|^{-\alpha}$ 密度, 如果其满足: 对于一个给定的 $\alpha > 0$, 有下式成立

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow \infty} |A \cap [x, x+1]| \lesssim |x|^{-\alpha}. \quad (10)$$

粗略地说, 一个 α 密度集就是一个密度随空间变量 x 呈 $|x|^{-\alpha}$ 衰减的可测集.

主要结果 II

有了集合密度的定义, 我们就可以用它来表述我们第二个结果:

测度可能无限的能观测不等式

设 S 和 Σ 均为密度 $\alpha > \frac{5}{6}$ 的可测集, 并且 $S, \Sigma \subset (c, \infty)$ 或者 $S, \Sigma \subset (-\infty, c)$, 其中 $c \in \mathbb{R}$ 为一个常数. 则对任意的 $t > 0$, 存在常数 $C = C(t, \alpha) > 0$ 使得能观测不等式 (9) 仍然成立.

举例与讨论

为了满足定理的密度条件, 我们可以设集合

$$S = \Sigma = \bigcup_{n=1}^{\infty} [n, n + \frac{1}{n^{\frac{5.1}{6}}}] . \quad (11)$$

显然 S 和 Σ 都满足定理的条件, 并且测度无限, 所以这是和之前所有能观测不等式都不一样的新结果.

实际上, 定理中对于密度的限制经过仔细计算后, 可以放宽为

$$\begin{cases} \alpha + \beta > \frac{5}{3}, \\ \alpha + 3\beta > 3, \\ 3\alpha + \beta > 3, \\ \alpha, \beta > \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (12)$$

其中 α 和 β 分别是 S 和 Σ 的密度.

上述区域可以用图像表示为




Figure 1: 保证 $\int_{\mathbb{R}^2} K^2 dx dy < \infty$ 的区域

方法的推广

我们使用的算子方法并不仅仅局限于各种演化方程的演化算子 $S(t)$, 只要是满足条件的算子均可以建立类似的不等式.

例如, 对于著名地 Hilbert 算子

$$Hf(x) \equiv \text{p.v.} \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(x-t)}{t} dt, \quad (13)$$

集合其在任意有限测度上的反局部性, 利用上述的证明方法便可得到不等式

$$\int_{\mathbb{R}} |f|^2 dx \leq C \left(\int_{A^c} |f|^2 dx + \int_{B^c} |Hf|^2 dx \right). \quad (14)$$

总结与展望

我们的主要工作是得到了关于 KdV 方程两个新的能观测不等式, 它们与已有的结果互不包含: 对于 S, Σ 两个可测集, 为了让两点能观测不等式

$$\int_{\mathbb{R}} |u_0(x)|^2 dx \leq C \left(\int_{\mathbb{R} \setminus S} |u_0(x)|^2 dx + \int_{\mathbb{R} \setminus \Sigma} |u(t, x)|^2 dx \right)$$

成立, 可以

- ① 取 S, Σ 为测度有限的可测集.
- ② 取 S, Σ 为密度满足一定条件的可测集, 并且可以适当选取密度使得集合测度无限.

末尾, 我们也提及了方法的一般性, 对于能观测不等式的探索远未停止, 主要集中在:

- ① 充分利用方法的一般性, 得到其它线性算子的类似不等式.
- ② 尝试得到常数 C 和 t, S, Σ 之间更加精确的依赖关系.

谢谢!