

Teorema de Ceva. Teorema de Menelao.

Los teoremas de Ceva y Menelao son herramientas que permiten trabajar muchos problemas en los que intervienen la colinealidad de puntos y la concurrencia de rectas. Ambos están estrechamente relacionados, aun cuando el de Menelao es del siglo primero y el de Ceva del siglo XVII.


Una recta que pasa por un vértice de un triángulo pero que no coincide con ningún lado, se llama usualmente **recta ceviana** del triángulo.

Un punto que esté en un lado de un triángulo, pero que no coincida con ningún vértice, se llama usualmente **punto de Menelao** del triángulo para dicho lado.


Teorema 1. Teorema de Ceva

Tres cevianas AL , BM y CN de un triángulo ABC son concurrentes en el punto O si y sólo si:

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$$



Demostración. Se traza por A una paralela a BC . Sean S y T las intersecciones de BM y CN con esta paralela, respectivamente.



Se tiene que

$$\triangle BLO \sim \triangle SAO$$

, por lo que


$$\frac{BL}{LO} = \frac{SA}{AO} \quad (1)$$

$$\triangle OLC \sim \triangle OAT$$

, por lo que

$$\frac{OL}{LC} = \frac{OA}{AT} \quad (2)$$

Por otro lado




Se tiene que

$$\triangle CMB \sim \triangle AMS$$

, por lo que

$$\frac{CM}{MA} = \frac{BC}{SA} \quad (3)$$

finalmente



Se tiene que

$$\triangle ANT \sim \triangle BNC$$

, por lo que

$$\frac{AN}{NB} = \frac{AT}{BC} \quad (4)$$


Multiplicando (1), (2), (3) y (4), se obtiene:

$$\frac{BL}{LO} \cdot \frac{OL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} \cdot \frac{AN}{NB} = \frac{SA}{AO} \cdot \frac{AO}{AT} \cdot \frac{BC}{SA} \cdot \frac{AT}{BC}$$

por lo tanto

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$$

Inversamente, supóngase que L, M y N son tres puntos en los lados BC, CA y AB del triángulo ABC y que la relación anterior se satisface. Sea O el punto de intersección de BM y CN. Se traza la recta AO. Sea L' el punto de intersección de AO con BC. Por el teorema de Ceva:



$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL'}{L'C} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$$

por tanto

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL'}{L'C} \cdot \frac{CM}{MA} = 1 = \frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA}$$

de donde

$$\frac{BL'}{L'C} = \frac{BL}{LC}$$


y por tanto $L = L'$

□


Teorema 2. (Teorema de Menelao) Si una recta interseca los tres lados BC , CA y AB del triángulo ABC en los puntos L , M y N respectivamente, entonces:

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$

e inversamente si L , M y N son tres puntos en los lados BC , CA y AB de un triángulo ABC , para los cuales se cumple la relación anterior, entonces los tres puntos son colineales.



Demostración. Sean P , Q y R los pies de las perpendiculares desde A , B y C a la recta determinada por L , M y N .



Se tiene $\triangle ANO \sim \triangle BNQ$

$$\frac{AN}{NB} = \frac{PA}{BQ} \quad (5)$$

Se tiene $\triangle BLQ \sim \triangle CLR$

$$\frac{BL}{LC} = \frac{QB}{CR} \quad (6)$$

Se tiene $\triangle CMR \sim \triangle AMP$

$$\frac{CM}{MA} = \frac{RC}{AP} \quad (7)$$

Multiplicando (5), (6) y (7), se obtiene:


$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = \frac{PA}{BQ} \cdot \frac{QB}{CR} \cdot \frac{RC}{AP} = -1$$

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$


Inversamente Supongamos que si L, M y N son tres puntos en los lados BC, CA y AB de un triángulo ABC, para los cuales se cumple la relación anterior,

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$

entonces los tres puntos son colineales.



Dado un triángulo ABC y dos puntos N,M en los lados AB y AC respectivamente, ahora unimos con una recta los puntos N y M



y al punto de intersección con BC lo llamamos L'.

Se tiene entonces por Menelao que

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL'}{L'C} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$

y por hipótesis

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$

de manera que

$$\frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1 = \frac{AN}{NB} \cdot \frac{BL'}{L'C} \cdot \frac{CM}{MA}$$


se tiene entonces que

$$\frac{BL}{LC} = \frac{BL'}{L'C}$$

y consecuentemente $L = L'$ y entonces los tres puntos son colineales

□

Teorema 3. (*Teorema de la división interna y externa*) Si P , L y M son puntos respectivamente en los lados AB , BC y CA del triángulo ABC , tales que AL , BM y CP son concurrentes y si la recta LM interseca AB en Q , entonces los puntos P y Q son conjugados armónicos con respecto al segmento AB .



Demostración. Ya que AL , BM y CP son concurrentes, por el teorema de Ceva se tiene que,

$$\frac{AP}{PB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = 1$$

Ya que L , M y Q son colineales, por el teorema de Menelao se tiene que,

$$\frac{AQ}{QB} \cdot \frac{BL}{LC} \cdot \frac{CM}{MA} = -1$$

Se tiene entonces que,

$$\frac{AP}{PB} = -\frac{AQ}{QB}$$

por lo que P y Q son conjugados armónicos respecto del segmento AB . □