


CSLB cluster architecture
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
I
10^{-1}
10^0
q
CSLBs
CSLB + 6uM Syn1
CSLB + 4uM Syn1
CSLB + 6uM Syn1 + 12uM aSynWT
CSLB + 6uM Syn1 + 24uM aSynWT
CSLB + 6uM Syn1 + 24uM ATP

Form factor fit for q > 0.15 /nm
⇒ fit entire curve with *I(q) = F(q) * S(q)*

Lorentzian + sigmoid

$$S(q) = \frac{\text{scale}}{\left(q^2 - q_0^2\right)^2 + \gamma^2 q^2} + \frac{1}{1 + e^{-k\,(q - q_0)}}$$



q0 = 0.106 (0.05, 1)
gamma = 0.04 (0, 0.3)
k = 500 (50, 1e+03)
scale = 1.3e-05 (0, 1.01)
chi2_initial = 10.798

q0_fit = 0.10668 ± 0.00095018
gamma_fit = 0.030239 ± 0.001724
k_fit = 379.2 ± 204.97
scale_fit = 1.7595e-05 ± 1.6596e-06
chi2 = 5.04

initial guess
fit
ellips_DAB
cutoff Lorentzian
cutoff form factor fit
$q > 0.15\,\text{nm}^{-1}$
I_SUB

number of data points at the maximum pretty small
⇒ this is probably as good as it gets
⇒ only a tiny difference (maybe 1 nm)

