

EXERCICE N°1 (8 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$.

1/ Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{x^2 - 2}{x - 2}$, et soit (C) sa courbe représentative dans le repère R .

- Vérifier que : pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, on a $f(x) = -2 - \frac{3}{x-2}$.
- Etudier le sens de variation de f et dresser son tableau de variation.
- Tracer la courbe (C) .

2/ Soient g et g_1 les fonctions définies respectivement par : $g(x) = \sqrt{x+3} - 1$ et $g_1(x) = \sqrt{x+3}$.

- Dresser le tableau de variation de g_1 .
- Tracer la courbe représentative (C') de g dans le repère R .
- Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection des courbes (C) et (C') .

Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \leq g(x)$.

3/ Soit h la fonction définie par : $h(x) = \frac{-2x+1}{x-2}$ et soit (Γ) sa courbe représentative dans le repère R .

- Tracer la courbe (Γ) à partir de la courbe (C) .
- Dresser alors le tableau de variation de h .

4/ a) Tracer la parabole (P) d'équation : $y = -\frac{1}{3}x^2 - 2$.

- En déduire que l'équation : $x^2 |x-2| + 6(|x-2| - x) + 3 = 0$, admet deux solutions distinctes x_1 et x_2 .
Donner la valeur exacte de l'une de ces solutions et un encadrement d'amplitude 0.25 de l'autre.

EXERCICE N°2 (5 points)

Le plan P est rapporté à un repère orthonormé $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$.

Soient m un paramètre réel et $(C_m) = \{M(x, y) \in P / x^2 + y^2 - 2mx + 2(m-2)y = 0\}$.

1/ Montrer que pour tout m de \mathbb{R} , (C_m) est un cercle dont on précisera les coordonnées de son centre I_m et la valeur de son rayon R_m .

- Montrer que les cercles (C_m) passent par deux points fixes A et B dont on donnera les coordonnées.
- En déduire que les points I_m sont sur une droite fixe dont on donnera une équation cartésienne.

3/ Soit (D) la droite d'équation : $x + 3y - 18 = 0$.

- Montrer qu'il existe deux cercles (C_{m_1}) et (C_{m_2}) tangents à la droite (D) , on prendra $m_1 < m_2$.

Tracer les cercles (C_{m_1}) et (C_{m_2}) et la droite (D) .

- Soit I le point d'intersection de la droite (D) et de la droite Δ d'équation : $x + y - 2 = 0$.

Montrer que (C_{m_1}) est l'image de (C_{m_2}) par une homothétie H de centre I dont on précisera le rapport.

EXERCICE N°3 (7 points)

On donne dans l'espace deux triangles équilatéraux ABC et ABD situés dans deux plans perpendiculaires P et Q .
On désigne par I, J, K, L, M et N les milieux respectifs des segments $[AB], [CD], [CA], [CB], [DB]$ et $[DA]$ et on pose $AB = a, a \in \mathbb{R}^+$.

- Montrer que la droite (DI) est perpendiculaire au plan P .
 - Déterminer la nature du triangle ICD puis calculer DC en fonction de a .
- Montrer que la droite (AB) est perpendiculaire au plan (ICD) .
 - En déduire que la droite (IJ) est la perpendiculaire commune des droites (AB) et (DC) .
- Montrer que le quadrilatère $KLMN$ est un rectangle.
- Soit R le plan passant par K et parallèle aux droites (AB) et (DC) .
 - Déterminer l'intersection du plan R avec chacun des plans P et Q .
 - Montrer que R est le plan médiateur du segment $[IJ]$.
- Calculer en fonction de a le volume de la pyramide $JKLMN$.
- Soit Δ l'axe du cercle circonscrit au triangle ABC et soit F le milieu du segment $[MN]$.
 - Montrer que Δ est contenue dans le plan (ICD) .
 - Soit E le point d'intersection de Δ et R , montrer que E est le centre de gravité du triangle FKL .

18 JANVIER
Rue Tahar Kmmoun Imm Rahma
SFAX 3000-Tél:22.740.480

58 059 297

Ex N° 1:

$$1) a) -2 - \frac{3}{x-2} = -2 \frac{(x-2)-3}{x-2}$$

$$= -2 \frac{x-2-3}{x-2} = -2 \frac{x-5}{x-2}$$

$$= f(x)$$

$$f(x) = -2 - \frac{3}{x-2} \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

⊙ soit a et $b \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$

tel que $a < b$

$$a-2 < b-2$$


$$\frac{1}{a-2} > \frac{1}{b-2}$$

$$-2 - \frac{3}{a-2} < -2 - \frac{3}{b-2}$$


$$-2 - \frac{3}{a-2} < -2 - \frac{3}{b-2}$$

$$f(a) < f(b)$$

d'où f est croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$



c)



cf. strim. hyperbole de centre $I(2, -2)$
et d'asymptote $x=2$ et $y=-2$

$$2) g(x) = \sqrt{x+3} - 1$$

$$g_1(x) = \sqrt{x+3}$$

$$D_{g_1} = \{x \in \mathbb{R} \mid x+3 \geq 0\}$$

$$x+3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -3$$

$$D_g = [-3, +\infty[$$


soit a et $b \in [-3, +\infty[$ tel que $a < b$

$$a+3 < b+3$$

$$\sqrt{a+3} < \sqrt{b+3}$$

$$f(a) < f(b)$$

d'où f est croissante sur $[-3, +\infty[$



soit (φ_1) est la représentation graphique de g_1

et (φ') est la représentation graphique de g

donc $(\varphi') = t_{-1} \circ (\varphi_1)$

$$c) f(x) = -2 - \frac{3}{x-2} \Leftrightarrow \frac{2x+1}{x-2} = \sqrt{x+3} - 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x+1}{x-2} + 1 = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x+1+x-2}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3x-1}{x-2} = \sqrt{x+3}$$

البريد
4

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (نهج الطاهر كدون أمام البليروم 4 - الهاتف : 22 740 485)

نهج الطاهر كدون SFAX مكتبة 18 جانفي SFAX

58 059 297

<https://www.facebook.com/CopiePilotee>

نهج الطاهر كدون

copie
copie

58 059 297

https://www.facebook.com/CopiePilotee

d'ont [I, J] sont les perpendiculaires communes de (AB) et (CD)...

2°) on a: (KL) // (AB) et (MN) // (CD)...

et (KL) // (MN) et (KL) // (AB)...

d'où (KL) // (MN) et KL = MN = 1/2 AB

et on a: (AB) ⊥ (ICD) et (CD) ⊥ (ICD)

d'où (AB) // (CD)

et on a: (KL) // (AB)

et (MN) // (CD) (P.S. A.T. B.C.D. on a L.A.B.C. et M = B.A.C)

d'où (KL) // (MN)

d'où on a: (KL) // (MN) et KL = MN

et (KL) // (MN)

D'où KLMN est un rectangle

3°) a) on a: (AB) // (KL) et (CD) // (MN) et (AB) // (CD) et (KL) // (MN)

et (CD) // (KL) et (MN) // (AB)

et (KL) // (MN) et (KL) // (AB)

d'où R = (KLM)

R ∩ E = (KL) et R ∩ F = (MN)

b) On a L I = L J (car L est le milieu de AB et CD)

et L I = L J (car L est le milieu de AB et CD)

et L I = L J (car L est le milieu de AB et CD)

d'où L I = L J d'où L est le milieu de AB et CD

et on a: (I J) ⊥ (AB)

et (AB) // (R)

d'où (I J) ⊥ (R)

or L ∈ (R)

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

d'où R est le plan médiateur de [AB] et [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et (R) est le plan médiateur de [CD]

et (R) est le plan médiateur de [AB]

et H = I + C

or IC = a√3/2 d'où HI = a√3/4

et OI = 1/3 CI = 1/3 x a√3/2

OI = a√3/6

HO = HI - OI

= a√3/4 - a√3/6 = a√3/12

HO/HI = (a√3/12) / (a√3/4) = 1/3

d'où HE/HF = HO/HI = 1/3

d'où HE = 1/3 HF

FE = FH - HE

= FH - 1/3 FH = 2/3 FH

d'où FE = 2/3 FH

Enfin, E est le centre de gravité du triangle FKL

58 059 297

18 JAN 2004
Rue Tahar Kammouj
SFAX 3000 TUNISIE

58 059 297

18 JAN 2004
Rue Tahar Kammouj
SFAX 3000 TUNISIE

