

NOM.....PRENOM.....

(6/6)

## ❖ EXERCICE 1 (8 points)

Pour le traçage des courbes on utilisera des couleurs différentes.

Soit la fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \rightarrow \frac{2}{x}$ . On note  $(C_f)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. a) Étudier la parité de  $f$ .

b) Étudier les variations de  $f$  et dresser son tableau de variation.

c) Tracer la courbe  $(C_f)$  dans le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

2. Soit la fonction  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \rightarrow -x^2 + 2x + 2$ . On note  $(C_g)$  sa courbe représentative dans le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

a) Vérifier que pour tout  $x \in \mathbb{R}^*$ ,  $g(x) = f(x) + 2$ .

b) Tracer la courbe  $(C_g)$  dans le même repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

3. Soit la fonction  $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \rightarrow \frac{2x+2}{|x|}$ . On note  $(C_h)$  sa courbe représentative dans le repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

a) Tracer à partir de  $(C_f)$  la courbe  $(C_h)$  dans le même repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

b) En déduire le tableau des variations de la fonction  $h$ .

c) Déterminer, graphiquement, suivant les valeurs du réel  $m$  le nombre des solutions de l'équation :  $m|x| - 2x - 2 = 0$ .

d) Résoudre graphiquement l'équation :  $|h(x)| + h(x) = 6$ .

## ❖ EXERCICE 2 (6 points)

On donne dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  les points  $A(0, 3)$

et  $B(4, -5)$ .

مكتبة 14 جانفي قابس

Librairie 14 Janvier Gabès

Tél : +21655267618

On désigne par (C) le cercle de diamètre [AB].

1. a) Déterminer le centre I et le rayon R du cercle (C).

2. Soit  $\Delta$  la droite d'équation :  $x - 2y + 6 = 0$ .

a) Montrer que  $\Delta$  est perpendiculaire à (AB).

b) Montrer que (C) et  $\Delta$  sont tangents et déterminer les coordonnées du leur point de contact.

3. Soit  $m$  un réel différent de 1. On désigne par  $(C_m)$  l'ensemble des points  $M(x,y)$  du plan vérifiant :

$$x^2 + y^2 - 2(2m + 1)x + 2(m - 1)y + 12m - 3 = 0.$$

a) Déterminer l'ensemble  $(C_1)$ .

b) Montrer que pour tout réel  $m \neq 1$ ,  $(C_m)$  est un cercle dont on précisera le centre  $I_m$  et le rayon  $R_m$ .

c) Montrer que tous les centres  $I_m$  sont alignés.

d) Déterminer  $m$  pour que le cercle  $(C_m)$  soit sécant à  $\Delta$ .

مكتبة 14 جانفي قابس  
Librairie 14 Janvier Gabès  
Tél : +21655267618

### ❖ EXERCICE 3 (6 points)

Dans l'espace on considère un tétraèdre ABCD tel que les faces BAC et BDA sont des triangles rectangles et isocèles en B et la face ACD est un triangle équilatéral.

Soit M le milieu du segment [CD] et le point E centre du gravité du triangle ACD. On se propose d'étudier le plan (BCD) et d'étudier le plan E sur le plan (BCD).

1. a) Montrer que  $BC = BD$ .

b) En déduire que (ABI) est le plan médiateur du segment [CD].

c) Montrer que (AB) est perpendiculaire au plan (BCD).

d) Montrer que les plans (ABI) et (BCD) sont perpendiculaires.

2)a) Montrer que (AB) est l'axe du cercle circonscrit au triangle ACD.

b) déduire que BEI est un triangle rectangle en E

3. a) Vérifier que (BI) est la droite l'intersection des plans (ABI) et (BCD).

b) Déduire que B, F et I sont aligné.



مكتبة 14 جانفي قابس  
Librairie 14 Janvier Gabès  
Tél : +21655267618



## ❖ Exercice 1

1) a)  $D_f = \mathbb{R}^* = ]-\infty, 0[ \cup ]0; +\infty[$

$-x \neq 0 \Rightarrow -x \neq 0 \Rightarrow -x \in D_f$

1)  $f(-x) = \frac{2}{-x} = -f(x)$

donc  $f$  est impaire

b) Sur  $] -\infty; 0[$


$a < b < 0$

$\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

$\frac{1}{b} < \frac{1}{a}$

$f(b) < f(a)$

$= f^{-1}$

et sur  $]0; +\infty[$   $f^{-1}$  $C_f$  est un hyperbole de centre  $I(0; 0)$ 


$x = 0$  AV et  $y = 0$  AH.

2 a)  $g(x) = \frac{2x+2}{x} = \frac{2x}{x} + \frac{2}{x} = 2 + \frac{2}{x} = f(x) + 2$

2

Voir Annexe.

b) TV (h)



c)

$m|x| - 2x - 2 = 0$

$m|x| = 2x + 2; x \neq 0$

$m = \frac{2x+2}{|x|}$

 $h(x) = m$  n'a pas de sol si  $m \leq -2$ une sol si  $m \in ]-2; 2]$ deux Sol si  $m > 2$ 

d)

$|h(x)| + h(x) = 6$

$|h(x)| = 6 - h(x) \Leftrightarrow 6 - h(x) > 0$

$h(x) < 6$  alors Si  $x > 0$   $\frac{2x+2}{x} = 6 \Rightarrow 4x = 2 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

si  $x < 0$   $\frac{2x+2}{-x} = 6 \Rightarrow x = \left(-\frac{1}{4}\right)$

$S = ]-\infty; -\frac{1}{4}] \cup [\frac{1}{2}; +\infty[$

## ❖ Exercice 2

 $C$  (diamètre  $[AB]$ )

1)

$A * B = (2; -1)$

Rayon  $= \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{16+64}}{2} = \frac{\sqrt{16 \times 5}}{2} = 2\sqrt{5}$ .

Donc

$C: (x-2)^2 + (y+1)^2 = 20 = (2\sqrt{5})^2$

$C(I(2; -1); R = 2\sqrt{5})$

2)  $\Delta: x - 2y + 6 = 0$

a)  $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  Vect directeur de  $\Delta$ .

$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \end{pmatrix}$

$2 \times 4 + 1 \times (-8) = 8 - 8 = 0 \Rightarrow \Delta \perp (AB)$

b)  $d(I(2; -1); \Delta: x - 2y + 6) = \frac{|2 + 2 + 6|}{\sqrt{1+4}}$

$= \frac{10}{\sqrt{5}} = \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5} = \text{Rayon}$

donc  $\Delta$  et tang a  $C$  en  $J$ 

$J(x, y) \in \Delta \Rightarrow x = 2y - 6$

$J(x, y) \in C \Rightarrow (2y - 6 - 2)^2 + (y + 1)^2 = 20$

$\Rightarrow (2y - 8)^2 + (y + 1)^2 = 20$

$\Rightarrow 4y^2 - 32y + 64 + y^2 + 2y + 1 = 0$

$5y^2 - 30y + 45 = 0$

$y^2 - 6y + 9 = 0$

$a = 1$

$b = (-6)$

$c = 9$

$\delta = 36 - 36 = 0 \Rightarrow y = \frac{-b}{2a} = \left(-\frac{9}{2}\right)$

$J\left(-15; -\frac{9}{2}\right) \in C \cap \Delta = \left\{\left(-15; -\frac{9}{2}\right)\right\}$

3)a)

$m \neq 1$

$C_m: x^2 - 2(2m+1)x + y^2 + 2(m-1)y + 12m - 3 = 0$

$$\begin{aligned}
 &-(2m+1))^2 - (2m+1)^2 + (y+m-1)^2 - (m-1)^2 = \\
 &\quad -12m+3 \\
 &\quad (x-(2m+1))^2 + (y-(-m+1))^2 \\
 &= 4m^2 - 4m - 1 - m^2 + 2m - 1 = -12m + 3
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 (x-(2m+1))^2 + (y-(1-m))^2 &= 5m^2 - 10m + 5 \\
 &= 5(m^2 - 2m + 1) \\
 &= 5(m-1)^2 > 0 \\
 &\text{car } m \neq 1
 \end{aligned}$$

donc  $\mathcal{C}$  est un cercle de centre

$$I_m(2m+1; 1-m) \text{ et de rayon } R_m = |m-1|\sqrt{5}$$

$$c) I_{m+1}(2m+3; -m); I_{m-1}(2m-1; 2-m)$$

$$\text{Det}(\overrightarrow{I_m I}; \overrightarrow{I_m I_{m-1}}) = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 2 = 0$$

donc tous les centres  $I_m$  sont alignés.

$$d) d(I_m; \Delta) = \frac{|2m+1+2n-2+6|}{\sqrt{1+4}} = \frac{|4m+5|}{\sqrt{5}}$$

< Rayon

$$\frac{|4m+5|}{\sqrt{5}} < (m-1)\sqrt{5} \Rightarrow |4m+5| < 5|m-1|$$

$$\left| \frac{4m+5}{m-1} \right| < 5 \Rightarrow -5 < \frac{4m+5}{m-1} < 5$$

### ❖ Exercice 3

$$AC = CD = AD$$

1)  $E$  centre de gravité de  $ACD$

a)  $BC = BD = BA$  car  $BCA$  et  $BDA$  sont isocèles.

b)

$$\begin{aligned}
 AC &= AD \\
 BC &= BD \\
 FC &= ID
 \end{aligned}$$

donc  $(ABI)$  plan médiateur de  $[CD]$

c)  $(AB) \perp (BD)$

$$(AB) \perp (BC)$$


$$\Rightarrow (AB) \perp (BCD)$$

d)  $(AI) \perp (CD)$  et  $(AB) \perp (BCD) \Rightarrow$

$$(ABI) \perp (BCD)$$

2) a)  $ADC$  triangle équilatéral

$E$  centre de gravité et donc centre de cercles circonscrit au triangle  $ACD$ :  $\mathcal{C}$  et  $BA = BC = BD$



donc  $(BE)$  Axe du cercle  $\mathcal{C}$ .

b)  $(BE) \perp (ADC) \Rightarrow (BE) \perp (EI)$

$\Rightarrow BEF$  triangle rectangle en  $E$

3) a) on a  $(BI) \subset (BCD)$

$$(BI) \subset (ABI) \Rightarrow (BCD) \cap (ABI) = (BI)$$

b)

$$\text{on a } (AB) \perp (BI)$$


$$(EF) \perp (BCD)$$

$$\Rightarrow (AB) \parallel (EF)$$

$$\Rightarrow F \in (BI)$$

$B; F$  et  $I$  Sont alignés

مكتبة 14 جانفي قابس  
Librairie 14 Janvier Gabès  
Tél : +21655267618



مكتبة 14 جانفي قابس  
 Librairie 14 Janvier Gabès  
 Tél : +21655267618