

الإعدادية: التوجيهية

سلسلة تمارين عدد 2

الأساتذة: المولى، الطاهر

9 أسبوع

2017/2018

مستألفين

تمرين عدد 1:

أجب بصواب أو خطأ

$$\sqrt[10]{\left(\frac{4}{5}\right)^{110} - \left(\frac{4}{5}\right)^{112}} \in \mathbb{D} \quad -3 \quad -2 \quad \sqrt[10]{2 + \sqrt{\frac{98}{162}}} \in \mathbb{I} \quad \sqrt{\frac{980}{720}} = 1,16 \quad -1$$

4 - محافظة أرقام يوجد 5 أرقام مختلفة ألوانها عدد إكثبات سحب لثمنين من الحافظة هو 10

5 - مهما يكن الرقم a فإن العدد $x = 4a5a8a4$ يقبل القسمة على 6

6 - بجانب اعدادية مكتبتان في فترة واحدة توضع ثلاثة لأتميد كل على حدى لاختفاء كراسة من إحدى المكتبتين عدد المكتبتين توجه التلاميذ إلى المكتبتين هو 8

7 - (O, I, J) معين في المستوي و A و B نقطتان بحيث $(AB) \perp (OJ)$ إذن $y_B = y_A$

8 - (C, I, J) معين مستقيم في المستوي و A و B و C نقط بحيث $|x_A - x_B| = |x_B - x_C|$ إذن $AB = BC$


تعيين عدد 2:

1 - باستعمال الأرقام 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 كم من عدد ذو 3 أرقام يمكن كتابته بحيث رقم العشرات و رقم المئات مختلفين في باقي قسمتها الإقليدية على 2 و رقم الآحاد هو مجموع رقمي العشرات و المئات

2 - باستعمال الأرقام 1, 2, 3, 4, 7 كم يمكن من كتابة عدد ذو ثلاثة أرقام بحيث رقم عشراته و رقم مئاته مختلفين في باقي قسمتها الإقليدية على 3 و رقم آحاده هو الفرق بين رقم مئاته و رقم عشراته إن كان رقم مئاته أكبر أو العكس

تعيين عدد 3:

نريد الأملب من A إلى O بحيث γ يمكننا التنقل الأ على الميوز أو إلى الأعلى



تعيين عدد 4:

لكن المجموعة التالية $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ $A = \left\{ \frac{70}{14}; -2, 37; \sqrt{\pi}; \sqrt[11]{\frac{1}{5}}; \sqrt[11]{\frac{1}{625}}; \sqrt[11]{\frac{1}{625}} \right\}$

$$5 \quad A \quad -11 \quad A \quad \frac{11}{5} \quad A$$

$$A \cap I, A \cap D, A \cap Q, A \cap N$$

تعيين عدد 5:

ليكن المعدادان الحقيقيين $a = \sqrt{3} - [-(\sqrt{2} + 1) + \pi] - \sqrt{3} + 4$ و $b = -1 - [-\pi - (3 + \sqrt{5})] - (6 + \sqrt{5})$

أ- اختصر كلا من a و b

ب- بين أن $(a-1)$ و $(b-\sqrt{2})$ عدنان متقابلين

تعيين عدد 6:

ليكن (O, I, J) ميّنا متعامدا من المستوي بحيث $OI = OJ = 1$

1- لتكن النقط $A(-1,0)$ و $B(3,0)$ و $D(1,4)$ و النقط M منتصف $[DB]$. جد احداثيات النقط M

2- ليكن Δ مستقيما يمر من B و ينتمي لمنحى (AD)

أ- ابن النقط C مسقط D على Δ و قائل لمنحى (AB)

ب- بين أن $C(5,4)$

3- (AD) ينقطع (OJ) في النقط N


أ- مامى احداثيات النقط N بقول $(2; 0)$

ب- لتكن النقط P بحيث $P(2,0)$. بين أن الرباعي $OPMN$ مربع

ج- (MP) ينقطع (DC) في النقط K . مامى احداثيات النقط K على جواربك

د- بين أن N هي مسقط K على (OJ) و قائل لمنحى (OM)

هـ- لتكن النقط $E(0,3)$ و النقط F من (PN) بحيث $PF = 3$ و النقط H نقطة تقاطع (EF) و لتكن النقط R تقاطع (PH) و (FK) بين أن RMP متثلين الصلزون في M



تعيين عدد 7:

ليكن ABC مثلثا. ابن النقط I منتصف $[CB]$ و J منتصف $[AC]$ و H منفرجة I بالنسبة إلى B و النقط E من

$$AE = \frac{3}{4} AB$$

بحيث $[AB]$

بين أن E و H على استقامة واحدة

(29)

أساسي

عدديّة النموذجيّة بـعقّاقس

سلسلت تمارين عدد 2

رين عدد 1

نظاً (2) خطاً (3) صواب (4) صواب (5) صواب (6) صواب (7) خطاً (8) خطاً

رين عدد 2

a, b, c عدد حيث $a \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ و $b \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ و $c = a + b$

و $c = a + b$ واحد فردي والاخر زوجي

الحالة 1: $a=1 \leftarrow b=0 \leftarrow c=1$

" $a=1 \leftarrow b=2 \leftarrow c=3$

" $a=1 \leftarrow b=4 \leftarrow c=5$

" $a=2 \leftarrow b=1 \leftarrow c=3$

" $a=2 \leftarrow b=3 \leftarrow c=5$

" $a=3 \leftarrow b=0 \leftarrow c=3$

" $a=3 \leftarrow b=2 \leftarrow c=5$

" $a=4 \leftarrow b=1 \leftarrow c=5$

" $a=5 \leftarrow b=0 \leftarrow c=5$

لم الحل هو 9

a, b, c عدد حيث $a \in \{1, 2, 3, 4, 7\}$ و $b \in \{1, 2, 3, 4, 7\}$ و $c = |a - b|$

و $c = |a - b|$

الحالة 1: $a=1 \leftarrow b=2 \leftarrow c=1$

" $a=1 \leftarrow b=3 \leftarrow c=2$

" $a=2 \leftarrow b=1 \leftarrow c=1$

" $a=2 \leftarrow b=3 \leftarrow c=1$

" $a=2 \leftarrow b=4 \leftarrow c=2$

" $a=3 \leftarrow b=1 \leftarrow c=2$

" $a=3 \leftarrow b=2 \leftarrow c=1$

" $a=4 \leftarrow b=1 \leftarrow c=3$

" $a=4 \leftarrow b=7 \leftarrow c=3$

30

422

431

734


الحالة 4 : $c=2 \leftarrow b=2 \leftarrow a=4$

$c=1 \leftarrow b=3$

الحالة 5 : $c=4 \leftarrow b=3 \leftarrow a=7$

كم الحلول هو 12

تتمين عدد 3



$$5 \in A; \frac{11}{5} \in A; -11 \notin A$$

$$A \cap I = \left\{ \sqrt{\frac{11}{5}}; \sqrt{\frac{11}{5}} \right\}; A \cap Q = \left\{ \frac{70}{5}; -2,37; 1,573; \sqrt{2 - \sqrt{\frac{1}{625}}}; 1,23,4567891011 \right\}; A \cap N = \left\{ \frac{70}{14} \right\}$$

$$A \cap D = \left\{ \frac{70}{5}; -2,37; \sqrt{2 - \sqrt{\frac{1}{625}}}; 1,23,4567891011 \right\}$$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

