


بين أن $K\left(1, \frac{1}{2}\right)$ في المعين (C, I, M)



- لكن M نقطة تقاطع (BH) و (AC) .

34

لا عددية النموذجية بعفاس

تقریریں عدد 1

(۱) خطاً (۲) صواب (۳) صواب (۴) صواب

تمرین عدد ۲

المجموعات هي: $\{\sqrt{2}, \sqrt{\frac{12}{23}}, 2, 3, 4, 1\}$; $\{\sqrt{2}, \sqrt{\frac{12}{23}}, 3, 1, 4, 15\}$; $\{\sqrt{2}, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 15\}$
 $\{\sqrt{5}, \sqrt{\frac{12}{23}}, 2, 3, 4, 1\}$; $\{\sqrt{5}, \sqrt{\frac{12}{23}}, 3, 1, 4, 15\}$; $\{\sqrt{5}, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 15\}$

تَمْرِين عدد 3

(1) کم امکانیت توجود ل ترکیبۃ المجلس هي 10

(2) کم امکانیہ مختلفہ لٹرکیٹ المجلس هي 60

تحریر علی عبداللہ

- 3,14 € A

- 1 ∈ A

 $5 \in A0$
$$A \cap I = \{-\sqrt{\pi^2}, \sqrt{3}\}, A \cap \mathbb{D} = \{\sqrt{2^3 \times 5^8 + 2^3 \times 5^8}, \sqrt{(-5)^2}, -\frac{\sqrt{49}}{7}, 5, 6814\}$$
$$A \cap Q = \left\{ \sqrt{2^3 \times 5^8 + 2^3 \times 5^8}, \sqrt{(-5)^2}, 2, \underline{3456}, -\frac{\sqrt{49}}{2}, 5, 6814 \right\}$$

تمرین عدد 5

$$0 = -\sqrt{\frac{28}{7}} - (n - \sqrt{\frac{49}{9}}) + (-\frac{7}{3} + \sqrt{5}) = \sqrt{4} - (n - \frac{7}{3}) - \frac{7}{3} + \sqrt{5} = 2 - n + \frac{7}{3} - \frac{7}{3} + \sqrt{5} = 2 - n + \sqrt{5} \quad (1)$$

$$b \leq -(-(1-\pi)) - \sqrt{(-6)^2} + 2 \cdot (\sqrt{5} - \pi) = 1 - \pi - 6 + 2\sqrt{5} + \pi = -3 + 2\sqrt{5}$$


$$C = \sqrt{7} - (-4 + \sqrt{\frac{91}{13}}) - (-\pi + 3) = \sqrt{7} + 4 - \sqrt{7} + \pi - 3 = \pi + 1$$

$$(a+c)+b = (2-\pi+\sqrt{5}+\pi+1)+(-3-\sqrt{5}) = 3+\sqrt{5}-3-\sqrt{5} = 0$$

عازن $(a+c)$ و b متقابلاً

$$E = 2 - 0 + C - \sqrt{5} = 2 - \pi + \sqrt{5} + 3 + \sqrt{5} + \pi + 1 - \sqrt{5} = \sqrt{5} + 6$$

قمرین عدد 6



35

(4) أ) $E(-1, -2)$ و B مناظرة E بالنسبة إلى (OJ) مآذن $B(1, 2)$.

C مناظرة E بالنسبة إلى $I(4, 0)$ مآذن $x_C = 2x_I - x_E = 2 \times 1 - (-1) = 3$

$$y_C = 2y_I - y_E = 2 \times 0 - (-2) = 2$$

$C(3, 2)$

$$\frac{x_B + x_C}{2} = \frac{1+3}{2} = 2 = x_N$$

ب) لدينا $N(2, 0)$

$$\frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-2+2}{2} = 0 = y_N$$

مآذن N منتصف $[BC]$

(5) أ) $AB = AC = 5$ و N منتصف $[BC]$ مآذن ABC متقايس الضلعين قمت الرئيسة

A و (AN) هو الارتفاع الصادر من A . وبما أن $(AB) \perp (HC)$ فإن

(HC) هو الارتفاع الصادر من C ومنه $H = (AN) \cap (HC)$ هو المركز القائم

للمثلث ABC

ب) $I(1, 0)$ و $B(1, -2)$ و $(OI) \perp (BI)$ مآذن و لنا $A(-2, 2)$

و $C(3, 2)$ مآذن $(AC) \parallel (OI)$ ومنه $(BI) \perp (AC)$ وبالتالي (BI) هو الارتفاع

الصادر من B مآذن $HE(BI)$

$$y_M = y_A = 2$$

(3) أ) $M = (AC) \cap (BH)$ مآذن $x_M = x_B = 1$ و

ومنه $M(1, 2)$

ب) $P = (OJ) \cap (AC)$ و $Q = (BE) \cap (OJ)$ مآذن $(PQ) \parallel (MB)$ و $(PM) \parallel (QB)$

مآذن $PQBM$ مستطيل حيث $PQ = BM$ و $OP = 2$ و $OQ = 2$

مآذن $BM = 4$ قيس طول ارتفاع ABC ومنه $S_{ABC} = \frac{AC \times BM}{2} = \frac{5 \times 4}{2} = 10$

تمرين عدد 7

(1) $A(-3, 5)$; $C(-2, 3)$; $B(3, 8)$

(2) أ) D مناظرة A بالنسبة إلى C مآذن C منتصف $[AD]$

$$x_D = 2x_C - x_A = 2 \times (-2) - (-3) = -4 + 3 = -1$$

$$y_D = 2y_C - y_A = 2 \times 3 - 5 = 6 - 5 = 1$$


مآذن $D(-1, 1)$

$$\frac{x_D + x_R}{2} = \frac{-1+5}{2} = -3 = x_A \quad \text{و} \quad \frac{y_D + y_R}{2} = \frac{1+9}{2} = 5 = y_A$$

ب)

مآذن A منتصف $[DR]$.

8-3-32


$$J(-1,0), C(2,1), D(2,0), I(1,0)$$

22 740 480 عمارة الرحمة نهج الطاهر كميون - صفاقس
مكتبة 18 جانفي

$[C_n] \sim \theta \times (1, \frac{1}{2})$

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480