



شعير عدد 7:

الرسم التالي يمثل مبدأ متعامدا (O, I, J) في المستوى والتقطعتين B و A .1- ابدأ الشكل ماضي إحداثيات A و B وب-عين النقطتين $K(2,5)$ و $C(3,3)$ ج-عين R منتصف $[AK]$ د-عين P منتصف $[AC]$ عين $N(2,1)$ 2- عين $N(2,1)$ عين $O(0,0)$ ب-عين $BP = BK$ ج-منتصف $CP = CK$ 3- لكن M متطابقة C بنفسية إلى K .عين $N(-1,7)$ ب-عين N و B و M على استقامة واحدة

تعيين عدد 8:

الرسم المجاني يمثل شبه منحرف بحيث $AB = 2$ و $DC = 4$ 1- (أ) عين I منتصف B على (DC) وقتا لمضي (AD) ب- عين I إحداثيات I في المصفوف (D, C, A) هي $(\frac{1}{2}, 0)$ ثم استنتج إحداثيات B 2- (أ) عين النقطة $K(1, -1)$ في المصفوف (D, C, A) ب- عين N أن $CK = AD$ 3- لكن L متطابقة B بنفسية إلى C أ- جد إحداثيات L ب- عين النقطة $N(-\frac{1}{2}, 1)$ ثم عين N ج- عين N على (DC) وقتا لمضي (BC) د- لكن P نقطة تقاطع (ND) و (KL) ماضي إحداثيات P ع- عين $N(2,1)$ عين G في (PC) عين N في (BK) $G \in (BK)$ الأمتحان الأول في المضي
2017/2018مادة تعليمية عدد 4
المضي 9الإحصائية التفاضلية
تعليماتتعيين عدد 1:
أجب بصواب و خطأ.1- إذا كان a و b عددين حقيقيين متطابقين فإن $(\sqrt{a-b})^2 = (7-b)$ متطابقين2- إذا كان $b = \frac{49}{25}$ و $a = -1$ متطابقين فإن $(a - \frac{1}{5})$ و $(b - \frac{1}{5})$ متطابقين3- $ACIB$ متوازي الأضلاع و I منتصف $[AC]$ عين $N(1, -2)$ في المصفوف (A, I, J) 4- $O(0,1,1)$ عين في المستوى و A و B نقطتين بحيث $OA = OB$ عين $N(-1, -2)$ في المصفوف (A, I, J) 5- $O(0,1,1)$ عين في المستوى و A و B نقطتين بحيث $OA = OB$ عين $N(-1, -2)$ في المصفوف (A, I, J)

تعيين عدد 2:

تلك إلى جاهد عوامل ماضي : $a = \sqrt{7} + 7$ ، $b = \pi\sqrt{5} + 5$ ، $c = 9 + 4\sqrt{3}$ ، $d = 2\pi\sqrt{5} + 10 + \sqrt{5}$ ، $e = 3(1 - \sqrt{2}) + \sqrt{2} - 2$ ، $f = 3 - 2\sqrt{3} + 4(\sqrt{3} - 2)$

تعيين عدد 3:

لكن الحدان $a = \sqrt{2} - 1$ و $b = 5\sqrt{2} + 7$ و $c = \sqrt{2}(9 - 4\sqrt{2}) - 4(2\sqrt{2} - 7)$ و $d = 3 \times | -2\sqrt{2} | - (\sqrt{2} - 10)$

تعيين عدد 4:

ب- عين N أن $5a - 2 = 5\sqrt{2} - 7$ و $b = 5\sqrt{2} + 7$ و $c = \sqrt{2}(9 - 4\sqrt{2}) - 4(2\sqrt{2} - 7)$ و $d = 3 \times | -2\sqrt{2} | - (\sqrt{2} - 10)$

تعيين عدد 5:

أشتر و انقص ماضي : $a = \sqrt{11} \times (3 - \sqrt{11}) - 2 \times (\sqrt{11} - 4)$ و $b = (1 - 2\sqrt{2})(3\sqrt{2} - 1) - \sqrt{2}(3 - 4\sqrt{2})$ و $c = (\sqrt{5} - 2)(1 + 2\sqrt{5}) - (2\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 1)$ و $d = (3\sqrt{5} + 2\sqrt{6})(3\sqrt{5} - 2\sqrt{6}) - \sqrt{3}(7\sqrt{3} + 2)$

تعيين عدد 6:

نشر $a = 2 - 2\sqrt{5} - 5(\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{7}{5})$ و $b = \frac{3\sqrt{5} - 7}{4}$ 1- عين N أن $a - 2 = -3\sqrt{5} + 7$ و $b = 2 - 2\sqrt{5} - 5(\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{7}{5})$ 2- عين N أن $a - 2 = -3\sqrt{5} + 7$ و $b = 2 - 2\sqrt{5} - 5(\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{7}{5})$

تعيين عدد 7:

بأحد القامات يوجد 4 كراسي مكثرت عليها الأعداد 2 و 5 و $\sqrt{2}$ و $\sqrt{3}$ عدل 3 أشخاص للتغاضي كم يوجد من طريقة للكراسي بحيث تكون الكرسي المكثرت عليها أعداد متماثلة ليست أقلية

(39)

و أساسي

الاعداد دية النموذجية بمفاتيح

سلسلة تعاريف عدد 4تمرين عدد 1

(1) خطأ (2) صواب (3) خطأ (4) خطأ (5) صواب (A+B)

تمرين عدد 2

$$a = \sqrt{7}, 7 = \sqrt{7} \times 1 + \sqrt{7} \times \sqrt{7} = \sqrt{7}(1 + \sqrt{7})$$

$$b = \pi\sqrt{5} + 5 = \pi\sqrt{5} + \sqrt{5} \times \sqrt{5} = \sqrt{5}(\pi + \sqrt{5})$$

$$c = 9 + 4\sqrt{3} = 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 4\sqrt{3} = \sqrt{3}(3\sqrt{3} + 4)$$

$$d = 2\pi\sqrt{5} + 10 + \sqrt{5} = 2\pi\sqrt{5} + 2\sqrt{5} \times \sqrt{5} + \sqrt{5} = \sqrt{5}(2\pi + 2\sqrt{5} + 1)$$

$$e = 3(1 - \sqrt{2}) + \sqrt{2} - 2 = 3(1 - \sqrt{2}) + \sqrt{2}(1 - \sqrt{2}) = (1 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2})$$

$$f = 3 - 2\sqrt{3} + 4(\sqrt{3} - 2) = \sqrt{3}(\sqrt{3} - 2) + 4(\sqrt{3} - 2) = (\sqrt{3} - 2)(\sqrt{3} + 4)$$

تمرين عدد 3

$$a = \sqrt{2}(9 - 4\sqrt{2}) - 4(2\sqrt{2} - \frac{7}{4}) = \sqrt{2} \times 9 - 4\sqrt{2}^2 - 8\sqrt{2} + 7 = 9\sqrt{2} - 8 - 8\sqrt{2} + 7 = \sqrt{2} - 1$$

$$b = 3|1 - 2\sqrt{2}| - (\sqrt{2} - 10) = 3(2\sqrt{2} - 1) - \sqrt{2} + 10 = 6\sqrt{2} - 3 - \sqrt{2} + 10 = 5\sqrt{2} + 7$$

$$5a - 2 = 5(\sqrt{2} - 1) - 2 = 5\sqrt{2} - 5 - 2 = 5\sqrt{2} - 7$$

$$(5a - 2) \cdot b = (5\sqrt{2} - 7)(5\sqrt{2} + 7) = (5\sqrt{2})^2 - 7^2 = 50 - 49 = 1$$

اذن b و (5a-2) مقلوبان

$$(6 + 5a) + (6 - b) = 6 + 5(\sqrt{2} - 1) + 6 - (5\sqrt{2} + 7) = 6 + 5\sqrt{2} - 5 + 6 - 5\sqrt{2} - 7 = 0$$

اذن (6-b) و (6+5a) متقابلان

$$6 + 5a + 6 - b = 0 \text{ و } 5a = 2 + \frac{1}{b} \text{ اذن } 5a - 2 = \frac{1}{b} \text{ يعني } 12 + 2 + \frac{1}{b} - b = 0$$

$$14b + 1 - b^2 = 0 \text{ يعني } 14 + \frac{1}{b} - b = 0$$

$$12 + 2 + \frac{1}{b} - b = 0$$

$$14b - b^2 = -1$$

تمرين عدد 4

$$a = \sqrt{11}(3 - \sqrt{11}) - 2(\sqrt{11} - 4) = 3\sqrt{11} - 11 - 2\sqrt{11} + 8 = \sqrt{11} - 3$$

$$b = (1 - 2\sqrt{2})(3\sqrt{2} - 1) - \sqrt{2}(3 - 4\sqrt{2}) = 3\sqrt{2} - 1 - 6\sqrt{2}^2 + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2}^2 = 2\sqrt{2} - 1 - 12 + 8 = 2\sqrt{2} - 5$$

$$c = (\sqrt{5} - 2)(1 + 2\sqrt{5}) - (2\sqrt{5} - 3)(\sqrt{5} + 1) = \sqrt{5} + 2\sqrt{5}^2 - 2 - 4\sqrt{5} - 2\sqrt{5}^2 - 2\sqrt{5} + 3\sqrt{5} + 3 = -2\sqrt{5} + 1$$

$$l = (3\sqrt{5} + 2\sqrt{6})(3\sqrt{5} - 2\sqrt{6}) - \sqrt{3}(7\sqrt{3} + 2) = (3\sqrt{5})^2 - (2\sqrt{6})^2 - 7\sqrt{3}^2 - 2\sqrt{3} = 45 - 24 - 21 - 2\sqrt{3} = -2\sqrt{3}$$

(40)

تمرين عدد 5

$$a-2 = 2 - 2\sqrt{5} - 5\left(\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{7}{5}\right) - 2 = -2\sqrt{5} - \frac{5}{\sqrt{5}} - 7 = -2\sqrt{5} - \sqrt{5} - 7 = -3\sqrt{5} - 7 = -(3\sqrt{5} + 7) \quad (1)$$

$$(a-2)b = -(3\sqrt{5} + 7) \times \frac{(3\sqrt{5} - 7)}{4} = -\frac{(3\sqrt{5})^2 - 7^2}{4} = -\frac{45 - 49}{4} = -\frac{-4}{4} = 1 \quad (2)$$

عاذن b و $(a-2)$ مقلوبان

$$a+12 = a-2+14 = -3\sqrt{5}-7+14 = 7-3\sqrt{5}; -4b = -4 \times \frac{3\sqrt{5}-7}{4} = -(3\sqrt{5}-7) = 7-3\sqrt{5} \quad (3)$$

$$a+12 = -4b \quad \text{عاذن}$$

$$a(b+1) - 2b + 11 = ab + a - 2b + 11 = (a-2)b + a + 11 = 1 + a + 11 = a + 12 = -4b \quad (4)$$

$$\frac{a(b+1) - 2b + 11}{b} = -4 \in \mathbb{Z} \quad \text{عاذن}$$

تمرين عدد 6

كم الطرق هو 12 (باستعمال شجرة الاختيار)

تمرين عدد 7

$$(4) \quad A(-1, -1) \text{ و } B(1, 3)$$

$$(ج) \quad C(5, 3) \text{ و } K(2, 5)$$

$$\text{عاذن } B \text{ منتصف } [JK]$$

$$(د) \quad P \text{ منتصف } [AC] \quad \text{عاذن}$$

$$P(2, 1)$$

$$\frac{x_J + x_K}{2} = \frac{0+2}{2} = 1 = x_B \quad \text{و} \quad \frac{y_J + y_K}{2} = \frac{1+5}{2} = 3 = y_B$$

$$x_P = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{-1+5}{2} = 2$$

$$y_P = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{-1+3}{2} = 1$$

$$(2) \quad (1) \quad K(2, 5) \text{ و } P(2, 1) \text{ عاذن } x_P = x_K \text{ ومنه } (PK) // (OJ)$$

$$(ب) \quad B \text{ منتصف } [JK] \quad y_J = y_P = 1 \text{ عاذن } (JP) // (OI) \text{ و } (OJ) \perp (OI) \text{ و } (PK) // (OJ)$$

$$\text{عاذن } (JP) \perp (PK) \text{ القثلث } PKJ \text{ قائم في } P \text{ عاذن } BP = BK$$

$$(ج) \quad y_B = y_C = 3 \text{ عاذن } (BC) // (OI) \text{ ومنه } (PK) \perp (BC) \text{ و } B \text{ نقطة من المتوسط العمودي لـ } [PK] \text{ عاذن } CP = CK$$

$$(3) \quad (1) \quad M \text{ منقطة } C \text{ بالنسبة الى } K \text{ عاذن}$$

$$x_M = 2x_K - x_C = 2 \times 2 - 5 = -1$$

$$y_M = 2y_K - y_C = 2 \times 5 - 3 = 7$$

$$M(-1, 7)$$

$$(ب) \quad [AB] \text{ منتصف } [JK] \text{ لأن } \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-1+1}{2} = 0 = x_J \text{ و } \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{3+(-1)}{2} = 1 = y_J$$

$$\text{و } B \text{ منتصف } [JK] \text{ و } K \text{ منتصف } [MC] \text{ عاذن } B \text{ هو مركز ثقل القثلث}$$

$$ACM \text{ و بما أن } P \text{ منتصف } [AC] \text{ عاذن } B \in (PM) \text{ ومنه } P \text{ و } B \text{ و } M \text{ على استقامة واحدة}$$

واحدة

$$x.p = 2xI - xB = 2x\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$


$$y_p = 2y_I - y_B = 2 \times 0 - 1 = -1$$

$$P\left(\frac{1}{2}, -2\right)$$

(د) في الثالث
١٩٨٦ لدينا مصنف [٨٧] و [٨٨] مصنف
[٨٩] والوكلاء سلطان (٢٤)

و (٤٢) يتقاطعان في مركز نقل القلث BP_L ومقت $GE(BK)$ لها K مستقيم

$$\left(\frac{x^p + x^L}{2} = \frac{x^p + x^L}{2} = -1 + 1 \right) \frac{2}{2} = 1 = y_k$$



$(AD) \parallel (BI)$ ووفقاً لنقطة (Dc) على B على I (نقطة B على AD) لأن $BE \in (DC)$ و

(AB) و (CD) کا ذن (DI) و (BI)

موازي متوازي $AD \parallel BC$ و $DI = AB = 2$ و $DC = 4$ و I منتصف $[DC]$

في المعين (D, C, A) ، ومنه $I(\frac{1}{2}, 0)$ و $B(\frac{1}{2}, 1)$

(D, C, A) في المعين $K(1, -1)$ $\frac{f}{f'}$

$$I(\frac{1}{2}, 0), A(0, 1), (DA) // (CK), \text{ و } (DA) \cap (CK) = K(1, -1), C(1, 0)$$

$$\frac{x_A + x_K}{2} = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2} = x_I, \quad \frac{y_A + y_K}{2} = \frac{1+(-1)}{2} = 0 = y_I$$

ADK متوازي
حلج و صنف
CK=AD

$$x_B = 2 \times 1 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$-y_B = 2x_0 - 1 = -1$$

$$[BN] \text{ carbon A} \leftarrow N \left(\frac{1}{2} \right) \text{ A}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 = y_A$$

د ډاډه وړه کړه

$$\frac{(\partial \bar{\epsilon})}{(\partial T)} = -\frac{(\partial \bar{\epsilon})}{(\partial V)}$$

المسألة الأولى : $\frac{x}{2} = \frac{1}{2} x_1$

0 1 2

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفافس 22 740 480

مكتبة 18 جاتفي عمارة الرحمة نهج الظاه كمان - صيفيقب 22-740 480