


GARDNERELLA



Escola Proz
Curso técnico de enfermagem

01 DE SETEMBRO DE 2022

GARDNERELLA E
SEUS SINTOMAS; TRATAMENTO;
CONTAGIO; TESTE E DIAGNÓSTICO.

GEOVANNA GARCIA DE OLIVEIRA 223

FRANCISCA GENICLEIDE 223

THAYNARA GREGÓRIO 224

CRISTIANE DUARTE 223

CINTHIA STEFANENCO 223

Sumário:

Introdução	3
Como essa doença é transmitida?	4
Quais são os sintomas da Gardnerella?	5
Qual é o procedimento realizado?.....	6
Qual é o diagnóstico?	7
Como tratar?.....	8
Conclusão	9
Bibliografia	10

Introdução:

Nesse trabalho abordaremos questões sobre a infecção *gardnerella* como: meios de transmissão da doença, sintomas, diagnóstico e tratamento.



Como essa doença é transmitida?

Não existe uma causa específica para este tipo de infecção, A *Gardnerella vaginalis* e a *Gardnerella mobiluncus* são duas bactérias que normalmente vivem na vagina sem causar qualquer tipo de sintoma.

A infecção em si, se da, pela multiplicação acelerada dessas bactérias (conhecida popularmente como vaginose bacteriana), além disso, fatores de risco como vários parceiros sexuais, uso de cigarro, prática irregular



de lavagem vaginal ou uso de DIU como método contraceptivo, podem agravar as chances da mulher de desenvolver a gardnerella. por esses motivos, essa infecção é mais comum em mulheres do que em homens. No entanto se o homem se relacionar sexualmente com uma mulher infectada além de contrair a

infecção para si, ele pode transmitir para outras parceiras sexuais também.

Quais são os sintomas da Gardnerella?

Os sintomas mais comuns são:



1. Corrimento amarelado ou acinzentado.
2. Odor forte, semelhante a peixe podre.
3. Coceira, ou sensação de queimação na região da vagina.
4. Dor durante a relação sexual.
5. Sangramento principalmente após a relação sexual especialmente quando é realizado sem preservativo. (nesses casos o odor pode ficar ainda mais intenso)

O recomendado é que mulheres que apresentem tais sintomas devem procurar um médico para realizar um diagnóstico correto, geralmente exames como o Papanicolau é requerido nesses casos, que ajudam a descartar outras infecções como a gonorreia.

No homem essa bactéria pode causar:


1. Inchaço
2. Vermelhidão na glândula
3. Dor no momento de urinar
4. Coceira no pênis

As recomendações para os homens são semelhantes as recomendações para mulheres, ideal que procure um médico para realizar o tratamento de forma correta e realizar um diagnóstico seguro.




Qual é o procedimento realizado?

A bactéria *Gardnerella* normalmente é identificada no exame de Papanicolau, também conhecido como exame de colo citologia, aonde é feita uma pequena raspagem do útero que é enviada ao laboratório para análise, sendo assim possível confirmar presença das bactérias




desta infecção e as lesões causadas pela mesma. Na presença de infecção por essa bactéria, geralmente é descrito no exame “presença de bacilos supra citoplasmáticos sugestivos de *Gardnerella mobiluncus*”.



No caso dos homens, o teste é feito a partir da análise da secreção uretral, e swabs uretral (No Sêmen). E também pelo isolamento bacteriano, que pode ser realizado em amostras de urina.

Qual é o diagnóstico?

O diagnóstico inicial na mulher é feito durante uma consulta ginecológica de rotina, em que são verificados sintomas indicativos da infecção, principalmente corrimento e cheiro característico, a confirmação é obtida após a coleta de exames. A *Gardnerella vaginalis* é uma bactéria que faz parte da microbiota vaginal normal da mulher. Nos casos da infecção eles aumentam e apresentam-se em número superior ao do *Lactobacillus* SPP,



causando um desequilíbrio. O *Lactobacillus* Spp é a espécie encontrada em maior quantidade, sendo responsável pelo PH da vagina. Por ter um desequilíbrio da população de bactéria, a infecção não é classificada como DST.

No caso dos homens, o diagnóstico deve ser feito pelo urologista por meio da análise dos sintomas e avaliação da secreção peniana.

Como tratar?



A infecção gardnerella é fácil de ser curada o seu tratamento é feito com antibióticos como comprimidos ou pomada, o tratamento pode durar em cerca de 7 dias em caso de comprimidos e se for em pomada é em cerca de 5 dias. Durante esse

tempo deve manter higiene íntima, lavando somente a região externa com sabonete neutro ou algum apropriado para a região na gravidez o tratamento deve ser apenas por Antibióticos em comprimidos recomendo pelo ginecologista (G.O)

Após o período de tratamento os sintomas não tiverem desaparecido deve informar seu médico pois pode levar ao surgimentos de complicação mais graves como infecção do útero, vias urinárias e até das trompas.

Conclusão:

Concluimos que a *Gardnerella* é uma infecção muito comum principalmente nas mulheres popularmente conhecida como vaginose bacteriana, se dá pela multiplicação exagerada de bactérias naturais da vagina, seus sintomas mais comuns são: odor muito forte, corrimento acinzentado e etc... no entanto homens também podem ser contaminados se eles se relacionarem com mulheres que carregam essa infecção, seus sintomas mais comuns são: inchaço, vermelhidão na glândula e etc., o recomendado é sempre procurar um médico para realizar o diagnóstico correto através de exames que possam confirmar se o paciente realmente é portador da doença como o Papanicolaou no caso das mulheres e coleta de secreção pela uretra no caso dos homens.

Bibliografia:

<https://brasilecola.uol.com.br/doencas/gardnella.htm>

<https://www.tuasaude.com/gardnerella/>

<https://www.tuasaude.com/tratamento-para-gardnerella/>