

## Machine Learning

## Übungsblatt 3

20 Punkte

**Aufgabe 1.** Mehrdimensionale Normalverteilung – Teil II

16 P.

Die  $d$ -dimensionale standard Normalverteilung  $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$  ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung für Zufallsvektoren  $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)$ , wobei alle Komponenten voneinander unabhängig sind und einer eindimensionalen standard Normalverteilung folgen, d.h.,  $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ .

- (a) Bestimmen Sie die Dichtefunktion  $f(x_1, \dots, x_d)$  von  $\mathbf{X}$ .  
Erinnerung: Es gilt  $\mathbb{P}[X_1 < t_1, \dots, X_d < t_d] = \int_{-\infty}^{t_d} \dots \int_{-\infty}^{t_1} f(x_1, \dots, x_d) dx_1 \dots dx_d$ .
- (b) Bestimmen Sie die Niveaumenge der Dichtefunktion zum Niveau  $(2\pi)^{-d/2} \exp(1/2)$ , d.h., die Menge  $\{(x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d : f(x_1, \dots, x_d) = (2\pi)^{-d/2} \exp(-1/2)\}$ . Welchem geometrischen Objekt entspricht sie?

Es sei nun  $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  mit  $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^d$ . Erinnerung. Wir können annehmen, dass  $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \boldsymbol{\mu}$  mit  $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top = \boldsymbol{\Sigma}$ . Außerdem nehmen wir an, dass  $\ker(\boldsymbol{\Sigma}) = \{\mathbf{0}\}$  (d.h. falls  $\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ , dann ist  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ).

In diesem Fall ist die Dichte von  $\mathbf{Y}$  gegeben durch

$$g(\mathbf{y}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \det(\boldsymbol{\Sigma})}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})\right).$$


- (c) Zeigen Sie, dass  $\boldsymbol{\Sigma}$  positiv definit ist, also, dass für alle  $\mathbf{0} \neq \mathbf{v} \in \mathbb{R}^d$  gilt  $\mathbf{v}^\top \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{v} > 0$ .

Wir betrachten nun die Niveaumengen der Dichtefunktion von  $\mathbf{Y}$ . Da  $\boldsymbol{\Sigma}$  positiv definit ist existiert eine orthogonale Matrix  $\mathbf{O}$  und eine diagonale Matrix  $\boldsymbol{\Lambda}$  so, dass  $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{O}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{O}^\top$ .

- (d) Drücken Sie  $\boldsymbol{\Sigma}$  durch die Spaltenvektoren  $\mathbf{v}_i$  der Matrix  $\mathbf{O} = (\mathbf{v}_1 \dots \mathbf{v}_d)$  und der Diagonaleinträge der Matrix  $\boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)$  aus. Begründen Sie außerdem, wieso alle  $\lambda_i$  positiv sind.
- (e) Bestimmen Sie ausgehend von dieser Darstellung die inverse Matrix  $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$ .  
Hinweis. Da  $\mathbf{O}$  orthogonal ist, ist  $\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_2^\top \mathbf{v}_2 = 1$  und  $\mathbf{v}_1^\top \mathbf{v}_2 = 0$ .
- (f) Bestimmen Sie für  $c > 0$  die Menge  $\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d : (\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu}) = c\}$ . Wählen Sie dazu den Ansatz  $\mathbf{y} - \boldsymbol{\mu} = \sum_{i=1}^d a_i \mathbf{v}_i$ .
- (g) Wie lassen sich für einen gegebenen Vektor  $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^d$  die Koeffizienten  $a_i$  bestimmen?

Es sei nun  $d = 2$ ,  $\boldsymbol{\Sigma} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$  und  $\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

- (h) Bestimmen Sie die Niveaumenge  $\{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 : g(\mathbf{y}) = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{4\pi}\}$ . Zeichnen Sie die Niveaumenge handschriftlich in ein Koordinatensystem ein, beschreiben Sie ihre Form und markieren Sie wesentliche Punkte und Vektoren.
- (i) Ergänzen Sie ihre Zeichnung mit einer (typischen) Stichprobe mit Umfang  $\geq 20$  der Zufallsvariable  $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ .



Die folgende Abbildung zeigt die Niveaumenge der Dichtefunktion einer Zufallsvariable  $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  zum Niveau  $\frac{1}{\pi} \exp(-\frac{1}{2})$ .

- (j) Bestimmen Sie  $\boldsymbol{\mu}$  und  $\boldsymbol{\Sigma}$  unter der Annahme, dass  $\det(\boldsymbol{\Sigma}) = 4$ .  
Hinweis. Wenn Sie das Übungsblatt (in Originalgröße) ausdrucken haben die Gitterlinien Abstand 1cm und Sie können Entfernungen abmessen.

**Aufgabe 2.** *Mehrdimensionale Normalverteilung*

4 P.

Es seien  $Y_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$  und  $Y_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$  zwei voneinander unabhängige univariat-normalverteilte Zufallsvariablen. Bestimmen Sie die Verteilung von  $Z = a_1 Y_1 + a_2 Y_2$ . Gehen Sie dabei folgendermaßen vor.

- (a) Welcher Verteilung folgt  $\mathbf{Y} = (Y_1 \ Y_2)^\top$ ?  
(b) Wie lässt sich  $Z$  direkt durch den Vektor  $\mathbf{Y}$  ausdrücken?  
(c) Schließen Sie auf die Verteilung von  $Z$ .

Erinnerung.  $\mathbf{Y} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  bedeutet, dass  $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \boldsymbol{\mu}$  mit  $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top = \boldsymbol{\Sigma}$  mit  $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ ,  $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^d$  und  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{d \times k}$ .