12 주 고강도 기능성 인터벌 트레이닝에 따른 대학 태권도 겨루기 선수의 최대산소섭취량과 기능적 움직임 변화

【국문 성명】[1] · 【국문 성명】[2*] · 【국문 성명】[3] · 【국문 성명】[4] · 【국문 성명】[5]

Han-Kyung Lee[1] · Ki-Seung Ham[2*] · Yong-Yeon Park[3] · Sang-Kun Hwang[4] · Jun-Seok Lee[5]

[1]용인대학교 【학과, 직위】 · Yongin University, 【Department, Position】

[2]【소속, 직위】 · 【Affiliation, Position】

[3]【소속】 박사과정 · 【Affiliation】, Doctoral Student

[4]【소속】 박사과정 · 【Affiliation】, Doctoral Student

[5]【소속】 석사과정 · 【Affiliation】, Master's Student

국문요약

목적 이 연구는 12 주간의 고강도 기능성 인터벌 트레이닝(H-IFIT)에 따른 대학 태권도 겨루기 선수의 최대산소섭취량(VO_2max)과 기능적 움직임의 변화를 규명하는 데 목적이 있다.

방법 대학 태권도 겨루기 선수 25 명을 실험군(n = 13)과 통제군(n = 12)으로 나누어, 실험군은 12 주간 주 3 회, 회당 60 분의 H-IFIT 를 실시하고 통제군은 정규훈련을 실시하였다. VO_2max 는 트레드밀 점증부하검사로, 기능적 움직임은 기능적 움직임 검사(FMS)로 측정하였으며, 반복측정 분산분석과 대응표본 t 검정으로 분석하였다.

결과 실험군의 VO_2max 는 【사전 M±SD】에서 【사후 M±SD】 mL/kg/min 으로, FMS 총점은 【사전 M±SD】점에서 【사후 M±SD】점으로 【변화 방향】하였다. 집단과 시기 간 상호작용은 VO_2max 에서 【유의/비유의(p)】, FMS 총점에서 【유의/비유의(p)】하였으며, 통제군은 【결과】. FMS 하위항목에서는 【유의한 변화를 보인 항목】.

결론 【재분석 결과에 맞춰 기재. 예: H-IFIT 는 대학 태권도 겨루기 선수의 유산소성 체력과 기본 움직임 수행을 향상시키는 훈련 방법으로 활용될 수 있다.】

주제어: 고강도 기능성 인터벌 트레이닝, 태권도 겨루기, 최대산소섭취량, 기능적 움직임 검사, 대학 선수

---

* 교신저자: 【국문 성명】(Ki-Seung Ham), 【소속】, 【이메일】

이 논문은 【연도】년 8 월 국기원 국제학술대회(【공식 행사명】)에서 포스터로 발표한 연구의 자료를 재분석하여 작성한 것임. 【연구비 지원 기관·과제번호(해당 시)】

I. 서론

태권도 겨루기는 짧은 시간 동안 폭발적인 발차기와 스텝이 반복되고, 그 사이에 상대적으로 낮은 강도의 이동과 회복이 이어지는 간헐적 고강도 종목이다. 모의 경기에서 에너지 기여도를 분석한 Campos 등(2012)은 고강도 공격 동작에는 무산소성 비젖산 시스템이 크게 기여하지만, 경기 전체로 보면 유산소성 대사의 기여가 상당하다고 보고하였다. 국제 수준 태권도 선수의 신체적·생리적 특성을 정리한 Bridge 등(2014)도 선수 간 최대산소섭취량(VO_2max)에 차이가 있으나, 경기의 대사적 요구를 감당하고 연속되는 경기 사이의 회복을 돕기 위해서는 중등도 이상의 심폐체력이 필요하다고 하였다. 따라서 겨루기 선수의 체력 훈련은 고강도 동작의 반복 수행 능력과 함께 유산소성 체력을 효율적으로 향상시키는 방향으로 구성될 필요가 있다.

고강도 인터벌 트레이닝(high-intensity interval training, HIIT)은 짧은 고강도 운동과 회복을 반복하는 훈련 방식으로, 건강한 성인을 대상으로 한 메타분석에서 지속적 지구성 훈련과 함께 VO_2max 를 크게 향상시키는 방법으로 보고되었다(Milanović et

al., 2015). 태권도 선수를 대상으로 한 중재연구에서도 인터벌 훈련을 고강도 지속 달리기와 비교한 연구(Monks et al., 2017), 반복 질주 훈련과 발차기 기반 반복 기술 훈련을 정규훈련에 추가하여 비교한 연구(Ouergui et al., 2020), 짧은 질주 인터벌과 기술 특이적 인터벌을 비교한 연구(Song & Sheykhlouvand, 2024)가 수행되어, 인터벌 형식의 훈련이 태권도 선수의 체력 향상에 활용될 수 있음이 제시되었다. 그러나 이들 연구는 주로 달리기나 발차기 위주의 인터벌을 4–6 주간 적용하였으며, 다양한 기능적 동작을 결합한 장기 프로그램의 효과는 상대적으로 덜 검토되었다.

고강도 기능성 훈련(high-intensity functional training, HIFT)은 다관절의 기능적 동작을 다양한 형태로 구성하여 높은 강도로 수행하는 훈련으로, 정해진 운동 형태를 반복하는 HIIT와 구별되는 체력 향상 방법으로 정의되었다(Feito et al., 2018). 이 연구에서 적용한 고강도 기능성 인터벌 트레이닝(high-intensity functional interval training, H-IFIT)은 점프·런지와 같은 하지 동작, 몸통 안정화 동작, 방향 전환 및 발차기 동작을 인터벌 구조로 조합한 프로그램이다. 이러한 구성은 심폐계에 대한 고강도 자극과 함께 기본 움직임 패턴의 수행에도 영향을 줄 수 있다.

기능적 움직임 검사(Functional Movement Screen, FMS)는 일곱 가지 기본 동작을 0–3점으로 평가하여 움직임 패턴의 제한과 좌우 비대칭을 확인하는 도구이다(Cook et al., 2014a, 2014b). 프로 미식축구 선수에서 FMS 총점 14점 이하가 심각한 부상 위험의 증가와 관련되었다는 보고(Kiesel et al., 2007) 이후 선수 현장에서 널리 사용되고 있으나, 체계적 문헌고찰에서는 총점만으로 부상을 예측하는 근거가 충분하지 않다고 하였다(Moran et al., 2017). 한편 FMS 점수는 훈련을 통해 변화할 수 있으며(Kiesel et al., 2011), 선수 대상 운동중재 연구를 종합한 메타분석에서는 코어 안정성, 저항, 기능성 훈련 등 여러 형태의 훈련이 FMS 총점을 향상시키는 것으로 나타났다(Maleki et al., 2025). 태권도 분야에서도 태권도 전공자에게 12주간 HIIT를 적용하여 FMS 변화를 분석한 연구가 보고되었다(김현륜, 이상일, 2026).

그러나 대학 태권도 겨루기 선수에게 기능적 동작 기반의 인터벌 프로그램을 적용하고, 심폐체력(VO_2max)과 기능적 움직임(FMS)의 변화를 정규훈련 집단과 함께 비교한 연구는 부족하다. 이에 이 연구는 12주간의 H-IFIT에 따른 대학 태권도 겨루기 선수의 VO_2max와 FMS 총점 및 하위항목의 변화를 정규훈련 집단과 비교하여 규명하고, 겨루기 선수의 체력 훈련 프로그램 구성을 위한 기초자료를 제공하는 데 목적이 있다.

II. 연구방법

1. 연구대상

이 연구의 대상자는 【지역】 소재 【대학교】 태권도부에 소속된 대학 태권도 겨루기 선수 25명이었다. 대상자는 실험군 13명과 통제군 12명으로 【배정 방법: 무작위 배정(방법 기재) 또는 소속·훈련 일정에 따른 배정】하였다. 선정 기준은 【예: 선수 경력 5년 이상, 최근 6개월 이내 근골격계 부상이 없는 자】였으며, 【제외 기준】에 해당하는 자는 제외하였다. 표본 크기는 【G*Power 산출 근거(효과크기, α, 검정력) 또는 '사전 산출 없음'】.

모든 대상자에게 연구의 목적과 절차, 예상되는 위험 및 참여 철회의 권리를 설명하고 서면 동의를 받았다. 이 연구는 【기관명】 기관생명윤리위원회의 승인(승인번호: 【 】)을 받아 수행하였다. 대상자의 일반적 특성은 <표 1>과 같다.

표 1. 대상자의 일반적 특성

변인	실험군 (*n* = 13)	통제군 (*n* = 12)
연령 (세)	【 】	【 】
신장 (cm)	【 】	【 】
체중 (kg)	【 】	【 】
선수 경력 (년)	【 】	【 】
성별 (남/여)	【 】	【 】

값은 평균±표준편차.

2. 운동 프로그램

실험군은 12 주간 주 3 회, 회당 60 분의 H-IFIT 에 참여하였다. 각 회기는 준비운동 10 분, 본운동 40 분, 정리운동 10 분으로 구성하였다(표 2). 본운동은 하지 폭발력·이동 동작(스쿼트 점프, 점핑 런지, 버피, 스텝업), 몸통 안정화·회전 동작(플랭크, 사이드 플랭크, 밴드 회전, 메디신볼 슬램), 태권도 특이 이동·발차기 동작(셔틀런, 방향 전환, 스텝과 발차기, 교대 돌려차기) 가운데 회기마다 6–10 종목을 선택하여 서킷 형태로 실시하였다. 종목당 운동 시간은 30–40 초, 세트 수는 3–4 세트였으며, 운동 대 휴식 비율은 1:1 에서 2:1 로 점진적으로 높였다【주차별 진행 기준 기재】.

운동 강도는 최대심박수(HRmax)의 85–95%와 자각운동강도(RPE) 15–18 을 목표로 하였으며, 【심박수 측정 장비와 HRmax 산출 방법】. 프로그램은 【지도자 자격·경력】이 지도하였고, 실험군의 프로그램 출석률은 【 】%였다. 통제군은 같은 기간 동안 【정규훈련 내용, 주당 횟수·시간】의 정규훈련을 실시하였으며, 실험군은 【정규훈련에 H-IFIT 를 추가하였다 / 정규훈련 일부를 H-IFIT 로 대체하였다】.

표 2. 고강도 기능성 인터벌 트레이닝(H-IFIT) 구성

구분	운동 내용	시간·운동량 / 강도
준비운동	가벼운 조깅, 동적 스트레칭, 고관절·발목 가동성 운동	10 분 RPE 7–10
본운동	A: 스쿼트 점프, 점핑 런지, 버피, 스텝업 B: 플랭크, 사이드 플랭크, 밴드 회전, 메디신볼 슬램 C: 셔틀런, 방향 전환, 스텝과 발차기, 교대 돌려차기	40 분: 회기당 6–10 종목, 종목당 30–40 초, 3–4 세트, 운동:휴식 1:1→2:1 HRmax 85–95%, RPE 15–18
정리운동	저강도 걷기, 정적 스트레칭	10 분 RPE 6–9

A–C 는 동작 유형에 따른 묶음이며 실시 순서가 아님. HRmax, 최대심박수; RPE, 자각운동강도(【척도: Borg 6–20】).

3. 측정 항목 및 방법

1) 최대산소섭취량

VO_2max 는 트레드밀(【제조사, 모델, 국가】)과 호흡가스 분석기(【제조사, 모델, 국가】)를 이용한 점증부하검사로 측정하였다. 검사는 【프로토콜: 예) Bruce 프로토콜】로 실시하였고, 호흡가스는 【산출 방식: 예) 30 초 평균】으로 분석하였다. 대상자가 더 이상 운동을 지속할 수 없을 때 검사를 종료하였으며, 【판정 기준: 예) 호흡교환율 1.10 이상, 연령 예측 최대심박수의 95% 이상, RPE 17 이상 중 2 개 이상 충족】한 경우 최대 수준에 도달한 것으로 판단하였다(Midgley et al., 2007). 사전·사후 검사는 동일한 시간대와 조건에서 실시하였고, 사후 검사는 마지막 훈련 후 【 】시간이 지난 뒤 실시하였다.

2) 기능적 움직임 검사

FMS 는 Cook 등(2014a, 2014b)이 제시한 절차에 따라 Deep Squat, Hurdle Step, In-line Lunge, Shoulder Mobility, Active Straight Leg Raise, Trunk Stability Push-up, Rotary Stability 의 7 개 항목으로 평가하였다. 각 항목은 0–3 점으로 채점하였고, 좌우를 평가하는

항목은 낮은 쪽 점수를 항목 점수로 하였으며, 어깨 충돌·척추 신전·척추 굴곡 배제 검사(clearing test)에서 통증이 나타나면 해당 항목을 0 점으로 처리하였다. 총점은 7 개 항목의 합(0–21 점)으로 산출하였다. 평가는 【FMS 자격을 갖춘 평가자 n 명】이 【집단 배정을 모르는 상태에서】 실시하였으며, 각 항목은 【3 회 시도 중 최고 점수】를 기록하였다【평가자 간 신뢰도(ICC 또는 kappa) 기재】.

4. 자료처리

자료는 SPSS 25.0(IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 이용하여 분석하였으며, 모든 측정값은 평균과 표준편차로 제시하였다. 집단과 측정 시기에 따른 VO_2max 와 FMS 총점의 변화는 2(집단)×2(시기) 반복측정 분산분석으로 분석하였고, 집단별 사전·사후 차이는 대응표본 t 검정으로 확인하였다. 효과크기는 부분 에타제곱(η_p^2)으로 제시하였다(Lakens, 2013). FMS 하위항목은 【검정 방법: 예) Wilcoxon 부호순위검정, 다중비교 보정 방법】으로 분석하였다. 통계적 유의수준은 $\alpha = .05$ 로 설정하였다

III. 연구결과

1. 최대산소섭취량

VO_2max 의 변화는 <표 3>과 같다. 실험군의 VO_2max 는 사전 【M±SD】 mL/kg/min 에서 사후 【M±SD】 mL/kg/min 으로 【변화량】 mL/kg/min(【변화율】%) 【증가/감소】하였으며(t = 【 】, p 【 】), 통제군은 사전 【M±SD】 mL/kg/min 에서 사후 【M±SD】 mL/kg/min 으로 【변화 기술】 (t = 【 】, p 【 】). 집단과 시기 간 상호작용 효과는 【유의하였다/유의하지 않았다】(F(1, 【df】) = 【 】, p 【 】, η_p^2 = 【 】, p 【 】, η_p^2 = 【 】).

2. FMS 총점

FMS 총점의 변화는 <표 3>과 같다. 실험군의 FMS 총점은 사전 【M±SD】 점에서 사후 【M±SD】 점으로 【변화량】 점 【증가/감소】하였으며(t = 【 】, p 【 】), 통제군은 사전 【M±SD】 점에서 사후 【M±SD】 점으로 【변화 기술】(t = 【 】, p 【 】). 집단과 시기 간 상호작용 효과는 【유의하였다/유의하지 않았다】(F(1, 【df】) = 【 】, p 【 】, η_p^2 = 【 】).

표 3. 집단별 최대산소섭취량과 FMS 총점의 변화

변인	집단	사전	사후	t (p)	F (p)
VO_2max (mL/kg/min)	실험군	【 】	【 】	【 】	【 】
	통제군	【 】	【 】	【 】	
FMS 총점 (점)	실험군	【 】	【 】	【 】	【 】
	통제군	【 】	【 】	【 】	

값은 평균±표준편차. t, 집단별 대응표본 t 검정(사전–사후); F, 집단×시기 상호작용(자유도 1, 【df】).

3. FMS 하위항목

FMS 하위항목의 변화는 <표 4>와 같다. 실험군에서는 【유의하게 변화한 항목과 검정값】, 통제군에서는 【결과 기재】.

표 4. 집단별 FMS 하위항목 점수의 변화

항목	실험군 사전	실험군 사후	통제군 사전	통제군 사후
Deep Squat	【 】	【 】	【 】	【 】
Hurdle Step	【 】	【 】	【 】	【 】
In-line Lunge	【 】	【 】	【 】	【 】
Shoulder Mobility	【 】	【 】	【 】	【 】
Active Straight Leg Raise	【 】	【 】	【 】	【 】
Trunk Stability Push-up	【 】	【 】	【 】	【 】
Rotary Stability	【 】	【 】	【 】	【 】

값은 평균±표준편차(점). 【유의한 항목 표시 기호와 검정 방법 기재】.

IV. 논의

이 연구는 12 주간의 H-IFIT 에 따른 대학 태권도 겨루기 선수의 VO_2max 와 기능적 움직임의 변화를 정규훈련 집단과 비교하였다. 그 결과 【재분석 결과 요약: 예) 실험군에서 VO_2max 와 FMS 총점이 유의하게 증가하였고, 두 변인 모두 집단과 시기 간 상호작용이 유의하였다】.

실험군의 VO_2max 는 【변화량】 mL/kg/min(【변화율】%) 【증가/감소】하였다. 실험군의 사전 VO_2max(【 】 mL/kg/min)는 태권도 선수에서 보고된 값과 비교할 때 【 】 수준이었다(Bridge et al., 2014). 인터벌 훈련은 VO_2max 향상에 효과적인 방법으로 보고되었으며(Milanović et al., 2015), 태권도 선수에게 인터벌 훈련을 적용한 선행연구에서도 유산소성 체력의 향상이 보고되었다(Monks et al., 2017; Song & Sheykhlouvand, 2024). 이 연구의 결과는 이러한 선행연구와 【같은/다른】 방향이다. 다만 선행연구는 4–6 주간의 달리기 또는 기술 기반 인터벌을 적용하였으므로, 운동 형태와 기간, 비교 조건이 다른 이 연구와 효과의 크기를 직접 비교하기는 어렵다.

H-IFIT 는 전신 동작을 짧은 휴식과 함께 반복하는 구조로, 운동 중 심박수를 높은 수준으로 유지하게 하여 심폐계에 반복적인 고강도 자극을 준다. 이러한 자극은 일회박출량 증가와 같은 중추적 적응과 골격근의 산소 이용 능력 향상과 같은 말초적 적응을 통해 VO_2max 를 높일 수 있으나, 이 연구에서는 이러한 생리적 변인을 직접 측정하지 않았으므로 기전은 추후 검증이 필요하다. 또한 이 연구의 VO_2max 는 체중당 상대값이므로 체중 변화도 결과에 영향을 줄 수 있다【사전·사후 체중 및 절대 VO_2max 결과 기재】. 한편 실험군은 【정규훈련에 H-IFIT 를 추가로 수행하였으므로】 실험군의 변화에는 프로그램 구성뿐 아니라 총 훈련량의 차이가 함께 작용했을 수 있으며, 이 결과는 정규훈련에 H-IFIT 를 【추가】하였을 때의 효과로 해석하는 것이 적절하다.

실험군의 FMS 총점은 【변화량】점 【증가/감소】하였다. 사전 총점(【 】점)은 대학 선수의 평균으로 보고된 14.8 점(Pollen et al., 2021)과 비교할 때 【 】 수준이었다. 선수 대상 운동중재 연구를 종합한 메타분석에서 기능성 훈련은 1.74 점, 코어 안정성 훈련은 2.89 점의 FMS 총점 향상을 보였으며(Maleki et al., 2025), 이 연구의 변화량은 【이 범위와 비교하여 기재】. 태권도 전공자에게 12 주간 HIIT 를 적용한 김현륜과 이상일(2026)도 FMS 의 향상을 보고하였다. 또한 FMS 총점의 최소탐지변화량은 평가자 간 2.1 점, 평가자 내 2.5 점으로 보고되어(Teyhen et al., 2012), 집단 평균의 변화를 개별 선수의 의미 있는 변화로 해석할 때에는 측정오차를 함께 고려해야 한다.

하위항목에서는 【유의하게 변화한 항목】이 【향상】되었다. H-IFIT 에는 하지의 가동성과 안정성,

한 발 지지 균형을 요구하는 스쿼트 점프, 점핑 런지, 스텝업(Deep Squat, Hurdle Step, In-line Lunge 와 관련)과 몸통 안정화·회전 동작인 플랭크, 사이드 플랭크, 밴드 회전(Trunk Stability Push-up, Rotary Stability 와 관련)이 포함되었으나, 어깨와 햄스트링의 유연성(Shoulder Mobility, Active Straight Leg Raise)을 직접 겨냥한 운동은 포함되지 않았다. 【재분석에서 변화한 항목과 이 프로그램 구성의 대응 관계를 비교하여 해석 기재】. 태권도 전공자에게 12 주간 HIIT 를 적용한 김현륜과 이상일(2026)은 Deep Squat, Hurdle Step, In-line Lunge 등에서 실험군의 유의한 변화를 보고하였으며【원문에서 유의한 하위항목 전체 확인】, 이 연구 결과와는 【일치 여부와 그 이유(프로그램 구성, 대상자 특성 등) 기재】.

FMS 총점 14 점 이하가 부상 위험 증가와 관련된다는 보고가 있으나(Kiesel et al., 2007), 체계적 문헌고찰에서는 총점만으로 부상을 예측하는 근거가 제한적이었다(Moran et al., 2017). 이 연구는 부상 발생을 추적하지 않았으므로, FMS 점수의 변화를 부상 예방이나 경기력 향상으로 직접 연결하여 해석하는 데에는 신중해야 한다.

이 연구의 제한점은 다음과 같다. 첫째, 대상자 수가 적고 【무작위 배정을 하지 않아】 결과를 일반화하는 데 한계가 있다. 둘째, 두 집단의 총 훈련량을 동일하게 통제하지 못하였다【확인】. 셋째 【FMS 평가자의 눈가림 또는 신뢰도에 관한 제한점】. 넷째, 중재 종료 후 효과의 지속성과 실제 경기력 및 부상 발생과의 관련성을 확인하지 못하였다. 후속 연구에서는 훈련량을 통제한 무작위 대조 설계와 추적 관찰을 통해 이를 보완할 필요가 있다.

V. 결론

【재분석 결과에 맞춰 기재. 예: 이 연구에서 12 주간의 H-IFIT 에 참여한 대학 태권도 겨루기 선수는 정규훈련 집단에 비해 VO_2max 와 FMS 총점에서 더 큰 향상을 보였으며, FMS 하위항목 중 ○○가 향상되었다.】

【결과에 따른 현장 적용 제언 기재】. 후속 연구에서는 훈련량을 통제한 무작위 대조 설계로 효과를 검증하고, 경기력 및 부상 발생과의 관련성을 확인할 필요가 있다.

【AI 활용 고지: 사용한 도구명·버전과 사용 범위(예: 원고 구조화·문장 다듬기·문헌 검색·통계 검산), 저자의 최종 검증 사실을 기재(국기원 연구윤리지침)】

참고문헌

김현륜, 이상일 (2026). 12 주간 고강도 인터벌 트레이닝(HIIT)이 태권도 전공자의 기능적 움직임 평가(FMS)에 미치는 영향. *대한무도학회지*, *28*(1), 123-134.

Bridge, C. A., Ferreira da Silva Santos, J., Chaabène, H., Pieter, W., & Franchini, E. (2014). Physical and physiological profiles of taekwondo athletes. *Sports Medicine*, *44*(6), 713-733. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0159-9

Campos, F. A. D., Bertuzzi, R., Dourado, A. C., Santos, V. G. F., & Franchini, E. (2012). Energy demands in taekwondo athletes during combat simulation. *European Journal of Applied Physiology*, *112*(4), 1221-1228. https://doi.org/10.1007/s00421-011-2071-4

Cook, G., Burton, L., Hoogenboom, B. J., & Voight, M. (2014a). Functional movement screening: The use of fundamental movements as an assessment of function - Part 1. *International Journal of Sports Physical Therapy*, *9*(3), 396-409.

Cook, G., Burton, L., Hoogenboom, B. J., & Voight, M. (2014b). Functional movement screening: The use of fundamental movements as an assessment of function - Part

2. *International Journal of Sports Physical Therapy, 9*(4), 549-563.

Feito, Y., Heinrich, K. M., Butcher, S. J., & Poston, W. S. C. (2018). High-intensity functional training (HIFT): Definition and research implications for improved fitness. *Sports, 6*(3), 76. https://doi.org/10.3390/sports6030076

Kiesel, K., Plisky, P., & Butler, R. (2011). Functional movement test scores improve following a standardized off-season intervention program in professional football players. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 21*(2), 287-292. https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2009.01038.x

Kiesel, K., Plisky, P. J., & Voight, M. L. (2007). Can serious injury in professional football be predicted by a preseason functional movement screen? *North American Journal of Sports Physical Therapy, 2*(3), 147-158.

Lakens, D. (2013). Calculating and reporting effect sizes to facilitate cumulative science: A practical primer for t-tests and ANOVAs. *Frontiers in Psychology, 4*, 863. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00863

Maleki, A. A., Mousavi, S. H., Biabangard, M. A., & Minoonejad, H. (2025). Influence of exercise interventions on functional movement screen scores in athletes: A systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports, 15*, 26335. https://doi.org/10.1038/s41598-025-12371-2

Midgley, A. W., McNaughton, L. R., Polman, R., & Marchant, D. (2007). Criteria for determination of maximal oxygen uptake: A brief critique and recommendations for future research. *Sports Medicine, 37*(12), 1019-1028.

Milanović, Z., Sporiš, G., & Weston, M. (2015). Effectiveness of high-intensity interval training (HIT) and continuous endurance training for VO_2max improvements: A systematic review and meta-analysis of controlled trials. *Sports Medicine, 45*(10), 1469-1481. https://doi.org/10.1007/s40279-015-0365-0

Monks, L., Seo, M.-W., Kim, H.-B., Jung, H. C., & Song, J. K. (2017). High-intensity interval training and athletic performance in Taekwondo athletes. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57*(10), 1252-1260. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.17.06853-0

Moran, R. W., Schneiders, A. G., Mason, J., & Sullivan, S. J. (2017). Do Functional Movement Screen (FMS) composite scores predict subsequent injury? A systematic review with meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine, 51*(23), 1661-1669. https://doi.org/10.1136/bjsports-2016-096938

Ouergui, I., Messaoudi, H., Chtourou, H., Wagner, M. O., Bouassida, A., Bouhlel, E., . . . Engel, F. A. (2020). Repeated sprint training vs. repeated high-intensity technique training in adolescent taekwondo athletes: A randomized controlled trial. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 17*(12), 4506. https://doi.org/10.3390/ijerph17124506

Pollen, T. R., Keitt, F., & Trojian, T. H. (2021). Do normative composite scores on the Functional Movement Screen differ across high school, collegiate, and professional athletes? A critical review. *Clinical Journal of Sport Medicine, 31*(1), 91-102.

Song, Y., & Sheykhlouvand, M. (2024). A comparative analysis of high-intensity technique-specific intervals and short sprint interval training in taekwondo athletes: Effects on cardiorespiratory fitness and anaerobic power. *Journal of Sports Science and Medicine, 23*(3), 672-683. https://doi.org/10.52082/jssm.2024.672

Teyhen, D. S., Shaffer, S. W., Lorenson, C. L., Halfpap, J. P., Donofry, D. F., Walker, M. J., . . . Childs, J. D. (2012). The Functional Movement Screen: A reliability study. *Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 42*(6), 530-540. https://doi.org/10.2519/jospt.2012.3838

Changes in Maximal Oxygen Uptake and Functional Movement Following 12 Weeks of High-Intensity Functional Interval Training in Collegiate Taekwondo Sparring Athletes

Han-Kyung Lee[1] · Ki-Seung Ham[2*] · Yong-Yeon Park[3] · Sang-Kun Hwang[4] · Jun-Seok Lee[5]

[1]Yongin University · [2–5]【Affiliations】

ABSTRACT

Purpose: This study examined changes in maximal oxygen uptake (VO_2max) and functional movement following 12 weeks of high-intensity functional interval training (H-IFIT) in collegiate taekwondo sparring athletes.

Methods: Twenty-five collegiate taekwondo sparring athletes were assigned to an experimental group (n = 13) or a control group (n = 12). The experimental group performed H-IFIT three times per week, 60 minutes per session, for 12 weeks, whereas the control group continued regular training. VO_2max was measured with a graded treadmill exercise test, and functional movement was assessed with the Functional Movement Screen (FMS). Data were analyzed with two-way repeated-measures ANOVA and paired t-tests.

Results: In the experimental group, VO_2max changed from 【pre M ± SD】 to 【post M ± SD】 mL/kg/min, and the FMS composite score changed from 【pre M ± SD】 to 【post M ± SD】 points. The group × time interaction was 【significant/non-significant】 for VO_2max (【F, p】) and 【significant/non-significant】 for the FMS composite score (【F, p】). The control group 【results】. Among the FMS subtests, 【subtests with significant changes】.

Conclusion: 【Write according to the re-analysis, e.g., H-IFIT may be used as a training method to improve aerobic fitness and fundamental movement patterns in collegiate taekwondo sparring athletes.】

Keywords: high-intensity functional interval training, taekwondo sparring, maximal oxygen uptake, Functional Movement Screen, collegiate athletes