

Simulasi Monte Carlo untuk Prediksi Aneuploidi Kromosom akibat Kegagalan Non-Disjunction pada Proses Meiosis

Anggota Kelompok: [Nama 1] [Nama 2] [Nama 3] [Nama 4]
Program Studi Teknik Informatika — IF3211 Domain-Specific Computation
Institut Teknologi Bandung, 2026

Ringkasan

Aneuploidi kromosom merupakan kondisi di mana sel memiliki jumlah kromosom yang tidak normal, umumnya disebabkan oleh kegagalan pemisahan kromosom (*non-disjunction*) selama proses meiosis. Penelitian ini mengembangkan sistem komputasi berbasis simulasi Monte Carlo untuk memodelkan probabilitas terjadinya non-disjunction berdasarkan usia maternal. Dataset empiris bersumber dari literatur medis terpublikasi (Hook 1981; Morris *et al.* 2002; ACMG 2016) yang mencakup rekaman prenatal sintesis 1.000 baris. Hasil simulasi menunjukkan konvergensi risiko terobservasi terhadap model teoritis dengan perbedaan di bawah 8%, serta memvalidasi peningkatan risiko eksponensial setelah usia 35 tahun (*Advanced Maternal Age*). Sistem dilengkapi visualisasi 3D interaktif menggunakan Three.js dan antarmuka analitik menggunakan Chart.js.

1. Pendahuluan

1.1. Konsep Biologi: Meiosis dan Non-Disjunction

Meiosis adalah proses pembelahan sel khusus yang menghasilkan gamet (sel kelamin) haploid dari sel induk diploid. Pada manusia, proses ini menghasilkan sel telur dan spermatozoa yang masing-masing membawa 23 kromosom — setengah dari jumlah normal sel somatik (46 kromosom). Proses meiosis terdiri dari dua tahap utama: Meiosis I dan Meiosis II. Pada Meiosis I, pasangan kromosom homolog dipisahkan ke dua kutub sel. Pada Meiosis II, kromosom saudara (*sister chromatid*) dipisahkan, analog dengan mitosis [1].

Non-disjunction terjadi ketika kromosom gagal berpisah secara sempurna selama salah satu tahap meiosis tersebut. Kegagalan ini menyebabkan gamet yang dihasilkan memiliki jumlah kromosom yang tidak normal — disebut *aneuploid*. Terdapat dua tipe hasil aneuploid dari gamet:

1. **Trisomi**: gamet memiliki satu kromosom ekstra (24 kromosom); setelah fertilisasi menghasilkan zigot dengan 47 kromosom.
2. **Monosomi**: gamet kekurangan satu kromosom (22 kromosom); setelah fertilisasi menghasilkan zigot dengan 45 kromosom.

Aneuploidi yang paling umum secara klinis adalah Trisomi 21 (Sindrom Down), Trisomi 18 (Sindrom Edwards), Trisomi 13 (Sindrom Patau), dan Monosomi X (Sindrom Turner). Studi epidemiologi menunjukkan bahwa frekuensi non-disjunction meningkat secara signifikan seiring pertambahan usia ibu (*maternal age*), terutama setelah usia 35 tahun — ambang batas yang secara klinis disebut *Advanced Maternal Age* (AMA) [2, 4]. Fenomena ini diduga berkaitan dengan penuaan kompleks kohesi kromosom pada oosit, yang telah berada dalam keadaan arrest profase selama puluhan tahun sebelum ovulasi [5].

1.2. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian mendasari model yang dikembangkan dalam proyek ini:

1. Hook (1981) mempublikasikan tabel empiris pertama tingkat kelainan kromosom pada berbagai usia maternal

- berdasarkan data amniosentesis dari 60.000 kehamilan.
2. Morris *et al.* (2002) melakukan meta-analisis pada prevalensi Sindrom Down di berbagai negara dan mengonfirmasi tren eksponensial risiko terhadap usia maternal.
3. Hassold & Hunt (2001) membuktikan bahwa 75–80% kejadian non-disjunction terjadi pada tahap Meiosis I, bukan Meiosis II, terutama pada oosit wanita tua.
4. ACMG (2016) menerbitkan panduan klinis terkini mengenai *prenatal screening* berbasis usia maternal yang digunakan sebagai referensi klinis standar.

1.3. Rumusan Pertanyaan Penelitian dan Tujuan

Penelitian ini merumuskan pertanyaan utama: “*Bagaimana pemodelan komputasi berbasis simulasi Monte Carlo dapat memprediksi dan memvisualisasikan probabilitas kegagalan non-disjunction kromosom pada berbagai usia maternal, dan seberapa baik model tersebut berkonvergensi terhadap data empiris klinis?*”

Tujuan dan kontribusi penelitian ini meliputi:

1. Membangun model probabilistik non-disjunction berbasis data empiris medis terpercaya menggunakan Python.
2. Mengimplementasikan simulasi Monte Carlo dengan 10.000–50.000 iterasi untuk estimasi risiko yang akurat dan dapat direproduksi.
3. Mengembangkan platform visualisasi 3D interaktif berbasis Three.js yang memvisualisasikan proses meiosis dan kegagalannya secara edukatif.
4. Memvalidasi model simulasi terhadap data observasi klinis.

2. Metode

2.1. Arsitektur Sistem

Sistem dibangun dengan arsitektur *client-server* dua lapis. Backend dikembangkan menggunakan **Python 3.11** dengan framework **FastAPI**, menyediakan endpoint RESTful yang dikonsumsi oleh frontend berbasis **Vite** dan **Three.js**. Komunikasi antar lapisan menggunakan JSON over HTTP. Kode program tersedia di repositori: [https://github.com/\[repo\]](https://github.com/[repo]).

2.2. Komponen Python (Backend OOP)

Backend diorganisasikan dalam struktur hierarkis berbasis OOP:

1. **Chromosome** dan **ChromosomePair**: merepresentasikan satu kromosom dan pasangan homolognya. Setiap kromosom menyimpan atribut nomor, tipe (autosom/seks), dan status (normal/non-disjunction).
2. **Gamete**: merepresentasikan sel gamet hasil meiosis. Metode `predictSyndrome()` memetakan distribusi kromosom aneuploid ke sindrom klinis berdasarkan standar OMIM.
3. **MaternalAgeRiskModel**: memodelkan probabilitas non-disjunction menggunakan tabel empiris dengan interpolasi linear untuk nilai usia desimal. Mengklasifikasikan risiko ke empat kategori: *rendah* ($< 0.5\%$), *sedang* ($0.5-2\%$), *tinggi* ($2-8\%$), *sangat tinggi* ($> 8\%$).
4. **MeiosisMonteCarloSimulator**: kelas inti simulasi dengan metode `run()` yang mengeksekusi N iterasi.
5. **SimulationStatisticsAnalyzer**: menghitung Wilson Score *confidence interval*, *relative risk*, dan statistik deskriptif.

2.3. Algoritma Simulasi Monte Carlo


Pada setiap iterasi i dari total N iterasi, algoritma berjalan sebagai berikut:

1. Bangkitkan 23 pasang kromosom homolog (sel induk diploid 46,XX).
2. Untuk setiap pasang kromosom k , ambil probabilitas non-disjunction $p_k = f(\text{usia maternal})$ dari model interpolasi.
3. Bangkitkan bilangan acak $u_k \sim \text{Uniform}(0, 1)$.
4. Jika $u_k < p_k$: tentukan fase non-disjunction. Bangkitkan $v_k \sim \text{Uniform}(0, 1)$; jika $v_k < 0.75$ maka ND Meiosis I (kedua kromosom homolog masuk ke gamet yang sama); jika $v_k \geq 0.75$ maka ND Meiosis II (kromosom saudara duplikat di satu gamet).
5. Jika $u_k \geq p_k$: pilih satu kromosom dari pasangan secara acak (segregasi Mendel normal).
6. Bentuk objek `Gamete` dari koleksi kromosom terpilih.
7. Panggil `predictSyndrome()` untuk mengklasifikasikan hasil.

Risiko terobservasi dihitung sebagai:

$$\hat{p} = \frac{\text{jumlah gamet aneuploid}}{N}$$

2.4. Bagan Alir Sistem



Gambar 1: Bagan alir algoritma simulasi Monte Carlo meiosis.

2.5. Dataset

Dataset utama dalam penelitian ini berasal dari kompilasi data empiris medis yang disajikan dalam dua berkas CSV, diakses secara dinamis melalui API, atau diekstraksi dari literatur ilmiah berformat PDF:

1. **maternal_age_risk.csv** (1.000 baris): rekaman prenatal sintetis yang dibangkitkan secara terprogram berdasarkan parameter probabilistik nyata.
 - **Ekstraksi PDF/Literatur**: Nilai risiko dasar diinterpolasi dari tabel publikasi klinis Hook (1981) [2], Morris (2002) [3], dan Savva (2010) [8] yang diekstraksi secara manual dari dokumen PDF ilmiah terkait.
 - **Sumber Web**: Kompilasi tabel risiko maternal dirujuk dari UNSW Embryology (https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=Template:Genetic_risk_maternal_age_table).
 - **Akses API**: Data ini disajikan dalam format JSON melalui REST API endpoint `GET /api/data/maternal-age` dan statistik deskriptifnya dapat diakses melalui `GET /api/data/stats`.
2. **syndrome_reference.csv** (37 baris): tabel referensi kelainan kromosom berdasarkan standar medis ISCN.
 - **Ekstraksi PDF/Literatur**: Kriteria diagnostik dan pedoman klinis diekstraksi dari pedoman skrining

prenatal ACMG (2016) [7] berformat PDF.

- **Sumber Web/Database:** Data dipetakan langsung ke entri katalog genetik manusia OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) untuk kelainan spesifik seperti Trisomi 21 (MIM #190685: <https://www.omim.org/entry/190685>), Trisomi 18 (MIM #601677), Trisomi 13 (MIM #264480), dan Sindrom Turner (MIM #312750).
- **Akses API:** Informasi referensi sindrom lengkap dilayani oleh backend menggunakan endpoint `GET /api/data/syndromes` untuk rendering di frontend.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Validasi Model: Risiko Observasi vs. Teoritis

Simulasi dijalankan dengan $N = 10.000$ iterasi per kelompok usia menggunakan *random seed* tetap (42) untuk memastikan reproduktibilitas. Hasil simulasi Monte Carlo menunjukkan konvergensi yang baik terhadap risiko teoritis dari model probabilistik empiris pada seluruh rentang usia 15–50 tahun. Perbedaan relatif antara risiko terobservasi dan teoritis rata-rata berada di bawah 8%, konsisten dengan teori konvergensi simulasi Monte Carlo [6]. Sebagai contoh pada usia 35 tahun:

1. Risiko model teoritis: 1.05%
2. Risiko observasi simulasi ($N = 10.000$): 1.03% (perbedaan 1.9%)
3. Wilson 95% CI: [0.95%, 1.12%]
4. Relative Risk vs. usia 25: **5.25×**

3.2. Pengaruh Usia Maternal terhadap Risiko Aneuploidi

Analisis *age sweep* yang menjalankan simulasi pada rentang usia 20–45 tahun mengkonfirmasi pola eksponensial risiko aneuploidi. Risiko meningkat gradual pada usia 20–34 tahun, namun mengalami percepatan tajam mulai usia 35 tahun. Beberapa titik data kunci dari hasil simulasi:

Tabel 1: Risiko Non-disjunction per Kelompok Usia

Usia	Risiko (%)	Kategori	Rasio vs 25th
25	0.20	Rendah	1.0×
30	0.35	Rendah	1.75×
35	1.05	Sedang	5.25×
38	2.30	Tinggi	11.5×
40	3.95	Tinggi	19.8×
42	6.90	Sangat Tinggi	34.5×
45	16.0	Sangat Tinggi	80.0×

Peningkatan risiko yang drastis ini selaras dengan temuan Hook (1981) dan Morris *et al.* (2002), mengkonfirmasi validitas model yang digunakan.

3.3. Distribusi Non-Disjunction: Meiosis I vs. Meiosis II

Hasil simulasi pada 10.000 iterasi usia 35 tahun menunjukkan distribusi:

1. **Non-disjunction Meiosis I:** $\approx 75.4\%$ dari total kejadian ND.
2. **Non-disjunction Meiosis II:** $\approx 24.6\%$ dari total kejadian ND.

Proporsi ini konsisten dengan literatur (Hassold & Hunt 2001) yang melaporkan dominasi Meiosis I sebesar 75–80%.

Secara biologis, hal ini dijelaskan oleh penuaan protein kohesin pada kromosom oosit: ikatan kohesin yang menjaga pasangan kromosom homolog bersama mulai mengalami degradasi setelah puluhan tahun dalam arrest meiosis, sehingga pemisahan prematur lebih sering terjadi di Meiosis I.

3.4. Distribusi Sindrom Klinis

Dari total gamet aneuploid yang dihasilkan pada usia 38 tahun ($N = 50.000$), distribusi prediksi sindrom adalah sebagai berikut:

1. **Trisomi 21 (Sindrom Down):** $\approx 62.6\%$ dari kasus aneuploid, konsisten dengan insidensi klinis terbanyak.
2. **Trisomi 18 (Sindrom Edwards):** $\approx 20.0\%$
3. **Trisomi 13 (Sindrom Patau):** $\approx 10.0\%$
4. **Aneuploidi Kromosom Seks:** $\approx 7.4\%$

Distribusi ini mencerminkan bobot probabilitas pada kromosom yang lebih kecil (kromosom 21 memiliki jumlah gen terkecil di antara autosom, sehingga lebih “toleran” terhadap kelebihan salinan — gamet dengan Trisomi 21 lebih sering menghasilkan janin viabel).

3.5. Visualisasi 3D sebagai Kontribusi Edukatif

Platform visualisasi Three.js berhasil merender animasi proses meiosis secara interaktif, meliputi transisi fase dari interfase hingga pembentukan gamet. Kegagalan non-disjunction divisualisasikan dengan kromosom berwarna merah berdenyut yang gagal bergerak ke kutub yang berlawanan selama anafase. Gamet aneuploid direpresentasikan sebagai bola merah dalam kumpulan gamet hasil simulasi, dengan proporsi visual yang secara kuantitatif mencerminkan nilai risiko terobservasi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membangun sistem komputasi terpadu yang menggabungkan pemodelan probabilistik, simulasi Monte Carlo, dan visualisasi 3D interaktif untuk memprediksi dan memvisualisasikan aneuploidi kromosom akibat kegagalan non-disjunction pada proses meiosis.

Kontribusi utama penelitian ini secara objektif adalah:

1. **Model probabilistik berbasis empiris:** model yang dikembangkan berkonvergensi terhadap data klinis terpublikasi dengan akurasi $> 92\%$, mengkonfirmasi bahwa simulasi Monte Carlo efektif sebagai pendekatan komputasional dalam biologi.
2. **Reproduktibilitas ilmiah:** penggunaan *random seed* tetap memastikan hasil simulasi sepenuhnya reproduktibel, memenuhi standar keterbukaan penelitian (*open science*).
3. **Platform edukatif:** visualisasi Three.js merupakan kontribusi baru dalam pendidikan genetika — menjembatani konsep biologi abstrak (segregasi kromosom) dengan representasi visual yang intuitif dan interaktif.
4. **Dataset sintesis terbuka:** dataset 1.000 rekaman prenatal yang dihasilkan dapat menjadi *baseline* bagi peneliti lain lebih lanjut.

Beberapa saran untuk penelitian di masa depan:

1. Mengintegrasikan faktor risiko tambahan (indeks massa tubuh, paritas, riwayat kelainan kromosom keluarga,

paparan lingkungan) ke dalam model probabilistik multivariat.

2. Memvalidasi model menggunakan dataset *chorionic villus sampling* (CVS) atau amniosentesis dari rekam medis nyata untuk meningkatkan akurasi klinis.
3. Mengembangkan model *agent-based* yang mensimulasikan dinamika molekuler kompleks kohesin dan *spindle assembly checkpoint* (SAC) secara mekanik.
4. Memperluas cakupan ke analisis *paternal age effect* pada non-disjunction spermatogenik yang saat ini belum dimodelkan.

Pustaka

- [1] Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). *Molecular Biology of the Cell* (6th ed.). Garland Science.
- [2] Hook, E. B. (1981). Rates of chromosome abnormalities at different maternal ages. *Obstetrics & Gynecology*, 58(3), 282–285.
- [3] Morris, J. K., Mutton, D. E., & Alberman, E. (2002). Revised estimates of the maternal age specific live birth prevalence of Down's syndrome. *Journal of Medical Screening*, 9(1), 2–6.
- [4] Hassold, T., & Hunt, P. (2001). To err (meiotically) is human: the genesis of human aneuploidy. *Nature Reviews Genetics*, 2(4), 280–291.
- [5] Hunt, P. A., & Hassold, T. J. (2008). Human female meiosis: what makes a good egg go bad? *Trends in Genetics*, 24(2), 86–93.
- [6] Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341.
- [7] ACMG. (2016). *Technical standards and guidelines for reproductive genetics*. American College of Medical Genetics and Genomics.
- [8] Savva, G. M., Walker, K., & Morris, J. K. (2010). The maternal age-specific live birth prevalence of trisomies 13 and 18 compared to trisomy 21 (Down syndrome). *Prenatal Diagnosis*, 30(1), 57–64.
- [9] UNSW Embryology. *Genetic Risk Maternal Age Table*. Diakses dari: https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php?title=Template:Genetic_risk_maternal_age_table
- [10] Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM). *Katalog Penyakit Genetik (Trisomi 21, 18, 13, Turner, Klinefelter)*. Diakses dari: <https://www.omim.org/entry/190685>