EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ADERBAL MAGNO CAMINADA SABRA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ALBERTO SCHANAIDER

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ALEXANDRE SICILIANO COLAFRANCESCHI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANDRE KIVES BERGER

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANIBAL GIL LOPES

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANTONIO EGIDIO NARDI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ARNO VON BUETTNERRISTOW

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO BASILIO DE OLIVEIRA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO DE BARROS FRANCO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO MANDARIM-DE-LACERDA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ANTONIO MASCIA GOTTSCHALL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS EDUARDO BRANDAO MELLO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS GIESTA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ROBERTO TELLES RIBEIRO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CELSO FERREIRA RAMOS FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CELSO MARQUES PORTELA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLAUDIO BUARQUE BENCHIMOL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLAUDIO CARDOSO DE CASTRO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLAUDIO TADEU DANIEL-RIBEIRO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
DANIEL GOLDBERG TABAK

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
DELTA MADUREIRA FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO BENCHIMOL SAAD

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO LOPES PONTES

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO MOACYR KRIEGER

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
ELIETE BOUSKELA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
ELOISA SILVA DUTRA DE OLIVEIRA BONFA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
FABIO BISCEGLI JATENE

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
FERNANDA FREIRE TOVAR-MOLL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
FERNANDO PIRES VAZ

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
FLAVIO PEREIRA KAPCZINSKI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
FRANCISCO NICANOR ARARUNA MACEDO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
FRANCISCO SAMPAIO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
GERSON CANEDO DE MAGALHAES

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
GILBERTO DE NUCCI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
GILBERTO SCHWARTSMANN

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
GIOVANNI GUIDO CERRI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
HENRIQUE MURAD

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JACOB KLIGERMAN

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JAIR DE CARVALHO E CASTRO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JAYME BRANDAO DEMARSILLAC

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JERSON LIMA DA SILVA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE ALBERTO COSTA ESILVA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE ELIAS KALIL FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE FONTE DE REZENDE FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE AUGUSTO DA SILVA MESSIAS

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE BARBOSA DE MEDEIROS GOMES FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE CARLOS DO VALLE

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE DE JESUS PEIXOTO CAMARGO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE GALVAO-ALVES

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE GOMES TEMPORAO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE HERMOGENES ROCCO SUASSUNA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE HORACIO COSTA ABOUDIBJUNIOR

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE LUIZ GOMES DO AMARAL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSE OSMAR MEDINA DE ABREU PESTANA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
KARLOS CELSO DEMESQUITA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
LUIZ FELIPPE DE QUEIROS MATTOSO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MANASSES CLAUDINO FONTELES

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELLO ANDRE BARCINSKI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELO MARCOS MORALES

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELO ZUGAIB

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCUS TULIO BASSUL HADDAD

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
MARGARETH MARIA PRETTI DALCOLMO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARIO BARRETO CORREA LIMA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO AUGUSTO SILVA MAGALHAES COSTA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO GOMES PEREIRA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO ROCHA E SILVA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO YOUNES IBRAHIM

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
MIGUEL CARLOS RIELLA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
MONICA ROBERTO GADELHA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
NATALINO SALGADO FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
OCTAVIO PIRES VAZ

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
OMAR LUPI DA ROSA SANTOS

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
OSVALDO JOSE MOREIRA DO NASCIMENTO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
OSWALDO MOURA BRASIL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
PATRICIA RIEKEN MACEDO ROCCO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO COUTO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO HILARIO NASCIMENTO SALDIVA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO MARCELO GEHM HOFF

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO MARCHIORI BUSS

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO NIEMEYER SOARES FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
PIETRO NOVELLINO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
RAUL CUTAIT

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROLF GEMPERLI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
RONALDO DAMIAO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUBEM DE ANDRADE ARRUDA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUBENS BELFORT JR.

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUI HADDAD

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
SAMIR RASSLAN

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
SERGIO PAULO BYDLOWSKI

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
SILVANO MARIO ATILIO RAIA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMA. SENHORA ACADEMICA
PROFESSORA DOUTORA
TALITA ROMERO FRANCO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
TARCISIO ELOY PESSOA DE BARROS FILHO

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
WALDEMAR NAVES DO AMARAL

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
WALTER ARAUJO ZIN

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br

EXMO. SENHOR ACADEMICO
PROFESSOR DOUTOR
WANDERLEY DE SOUZA

LINFOMAS CUTÂNEOS PRIMÁRIOS DE CÉLULAS T (LCPT/CTCL) - MICOSE FUNGÓIDE

Os linfomas cutâneos primários de células T (LCPT/CTCL), particularmente a Micose Fungóide, constituem neoplasias definidas pela proliferação de linfócitos T CD4+ malignos com tropismo epidérmico.

No presente estudo, examinou-se o efeito imunomodulador da fotoquimioterapia (PUVA) sobre o infiltrado cutâneo, mediante avaliação imunohistoquímica de biópsias colhidas antes e após a intervenção terapêutica.

Evidenciou-se desaparecimento das lesões cutâneas, acompanhado de redução das populações celulares expansivas; contudo, persistiu infiltrado mononuclear de memória-CD45RO+, indicativo de atividade residual da enfermidade.

De tais achados depreende-se que a suspensão do tratamento deve subordinar-se à negativação imunohistológica para linfócitos de memória, como critério mais seguro de controle evolutivo.

O estudo, anexado, oferece contribuição substantiva à compreensão da dinâmica imunomolecular da PUVA sobre células neoplásicas em atividade proliferativa e do efeito eficaz da terapia, tendo sido publicado em seção de especial relevo "Hotline".

Com estima,

Luiz Werber-Bandeira

Rua Santa Luzia 50, Castelo - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep: 20030-042
Tel: +55 21 2266-3540 - 2286-9914
werberbandeira@imunoderm.com.br