

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ADERBAL MAGNO CAMINADA SABRÁ**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ALBERTO SCHANAIDER**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ALEXANDRE SICILIANO COLAFRANCESCHI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANDRÉ KIVES BERGER**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANÍBAL GIL LOPES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ANTONIO EGIDIO NARDI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ARNO VON BUETTNER RISTOW**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO BASÍLIO DE OLIVEIRA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO DE BARROS FRANCO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ALBERTO MANDARIM-DE-LACERDA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ANTONIO MASCIA GOTTSCHALL**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS EDUARDO BRANDÃO MELLO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS GUESTA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CARLOS ROBERTO TELLES RIBEIRO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CELSO FERREIRA RAMOS FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CELSO MARQUES PORTELA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLÁUDIO BUARQUE BENCHIMOL**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLÁUDIO CARDOSO DE CASTRO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
CLÁUDIO TADEU DANIEL-RIBEIRO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
DANIEL GOLDBERG TABAK**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
DELTA MADUREIRA FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO BENCHIMOL SAAD**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO LOPES PONTES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
EDUARDO MOACYR KRIEGER**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
ELIETE BOUSKELA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
ELOISA SILVA DUTRA DE OLIVEIRA BONFÁ**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FABIO BISCEGLI JATENE**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
FERNANDA FREIRE TOVAR-MOLL**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FERNANDO PIRES VAZ**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FLÁVIO PEREIRA KAPCZINSKI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FRANCISCO NICANOR ARARUNA MACEDO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
FRANCISCO SAMPAIO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GERSON CANEDO DE MAGALHÃES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GILBERTO DE NUCCI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GILBERTO SCHWARTSMANN**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
GIOVANNI GUIDO CERRI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
HENRIQUE MURAD**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JACOB KLIGERMAN**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JAIR DE CARVALHO E CASTRO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JAYME BRANDÃO DE MARSILLAC**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JERSON LIMA DA SILVA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE ALBERTO COSTA E SILVA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE ELIAS KALIL FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JORGE FONTE DE REZENDE FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA MESSIAS**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS GOMES FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ CARLOS DO VALLE**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ DE JESUS PEIXOTO CAMARGO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ GALVÃO-ALVES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ GOMES TEMPORÃO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ HERMÓGENES ROCCO SUASSUNA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ HORÁCIO COSTA ABOUDIB JUNIOR**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ LUIZ GOMES DO AMARAL**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
JOSÉ OSMAR MEDINA DE ABREU PESTANA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
KARLOS CELSO DE MESQUITA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
LUIZ FELIPPE DE QUEIROS MATTOSO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MANASSÉS CLAUDINO FONTELES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELLO ANDRÉ BARCINSKI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELO MARCOS MORALES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCELO ZUGAIB**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MARCUS TÚLIO BASSUL HADDAD**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
MARGARETH MARIA PRETTI DALCOLMO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MÁRIO BARRETO CORRÊA LIMA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURÍCIO AUGUSTO SILVA MAGALHÃES COSTA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO GOMES PEREIRA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURÍCIO ROCHA E SILVA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MAURICIO YOUNES IBRAHIM**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MIGUEL CARLOS RIELLA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
MILTON ARY MEIER**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
MÔNICA ROBERTO GADELHA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
NATALINO SALGADO FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OCTAVIO PIRES VAZ**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OMAR LUPI DA ROSA SANTOS**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OSVALDO JOSÉ MOREIRA DO NASCIMENTO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
OSWALDO MOURA BRASILDOAMARALFILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
PATRICIA RIEKEN MACÊDO ROCCO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO COUTO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO HILÁRIO NASCIMENTO SALDIVA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO MARCELO GEHM HOFF**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO MARCHIORI BUSS**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PAULO NIEMEYER SOARES FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
PIETRO NOVELLINO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RAUL CUTAIT**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROBERTO DE ANDRADE MEDRONHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROLF GEMPERLI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RONALDO DAMIÃO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ROSSANO KEPLER ALVIM FIORELLI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUBEM DE ANDRADE ARRUDA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUBENS BELFORT JR.**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUI HADDAD**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
RUY GARCIA MARQUES**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
SAMIR RASSLAN**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
SÉRGIO PAULO BYDLOWSKI**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
SILVANO MARIO ATÍLIO RAIA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMA. SENHORA ACADÊMICA
PROFESSORA DOUTORA
TALITA ROMERO FRANCO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
TARCÍSIO ELOY PESSOA DE BARROS FILHO**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
WALDEMAR NAVES DO AMARAL**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
WALTER ARAUJO ZIN**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
WANDERLEY DE SOUZA**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira