

**EXMO. SENHOR ACADÊMICO
PROFESSOR DOUTOR
ADERBAL MAGNO CAMINADA SABRÁ**

ALERGIA AO PEG DA VACINA

Casos de anafilaxia após a vacinação com a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech contra a COVID-19 têm sido relatados desde o início de seu uso.

Embora os excipientes sejam ingredientes inertes, na maioria das vezes sem atividade farmacológica, a molécula de PEG, por ser um dos excipientes utilizados inicialmente em vacinas de mRNA, foi considerada um possível alérgeno e até mesmo confirmada como a causa dessas reações em alguns casos.

Relatamos o caso de um paciente que desenvolveu anafilaxia-síndrome urticariformes após receber a vacina de mRNA da Pfizer/BioNTech, na qual uma reação ao PEG 6000 foi detectada pela realização do teste epicutâneo-puntura.

No caso relatado, a importância do teste cutâneo de punção (SPT) positivo para PEG foi evidenciada e deve ser indicado quando um paciente vacinado com a vacina de mRNA apresentar uma reação alérgica imediata. Se o resultado do teste for positivo, o paciente deve ser instruído a considerar essa informação em seu histórico médico para orientar possíveis intervenções medicamentosas futuras, bem como evitar quaisquer produtos cosméticos, industriais ou alimentícios que contenham PEG ou mesmo vacinas que contenham PEG ou Polissorbato.

Até onde sabemos, este é o primeiro relato de caso de alergia ao (PEG), com teste cutâneo positivo para PEG no Brasil, causando reação mediada por IgE à vacina contra COVID-19 da Pfizer/BioNTech.

Com estima, Luiz Werber-Bandeira