


MANUAL (SOP) KONSELING APOTEKER “HYPOGLYRISK”



**Medication Related Hypoglycemia
Risk Score Assessment Tools**

4 LANGKAH DASAR



Perkenalan
(Pasien sesuai
kriteria)



Gali informasi
(*Screening* dengan
HYPOGLY-RISK)



Beri informasi
(Edukasi)



Penutup
(Dokumentasi)

OPEN ENDED QUESTION



PERKENALAN



PERKENALAN

✓ **Nama**

✓ **Konfirmasi**

✓ **Ketersediaan diedukasi
(Informed Consent)**





**GALI INFORMASI ITEM
HYPOGLYRISK**



GALI INFORMASI

✓ Pasien

- Usia
- Hamil / Menyusui
- Merokok
- Alkohol
- Alergi
- Kepatuhan Terapi
- Memiliki riwayat hipoglikemia berat/tidak.
- Durasi DM (tahun).

✓ Penyakit

- Keluhan subjektif yang masih dirasakan
- Komplikasi DM (CKD dan Neuropati)
- Hasil LAB terakhir (kontrol glikemik)

✓ Obat

- 8 Item HYPOGLYRISK Part B
 - Mengenali item obat yang dibawa pulang.
 - Tanda, gejala, risiko hipoglikemia.
 - Cara menggunakan obat.
 - Pengobatan alternatif?
 - PMR
 - Insulin dan SU bias stop jika hipo.
 - Faskes terdekat saat kejadian gawatdarurat.



**BERIKAN INFORMASI
ITEM HYPOGLYRISK**



BERIKAN INFORMASI

✓ Terapi farmakologi

- Nama obat
- Jumlah obat
- Dosis
- Indikasi
- Kerja Obat
- Efek samping
- Durasi pemakaian
- Self Monitoring Diseases

✓ Terapi non-farmakologi

- Pola Diet
- Olahraga
- Penurunan Berat Badan
- Life Style : Stop merokok, alcohol, tidur larut malam.

✓ Informasi Obat

- Booklet Hipoglikemia
- Kadaluarsa / BUD
- DAGUSIBU :
Mendapatkan,
Menggunakan,
Menyimpan, Membuang
Obat.
- Peningkatan Kepatuhan
Terapi / *Medicine
Reminder*
- Kontak Dokter / Apoteker



HIPOGLIKEMIA PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS

MENGELOLA GULA DARAH RENDAH PADA PENDERITA DM

- Setiap orang yang menggunakan insulin untuk terapi diabetes (baik tipe 1 atau tipe 2) berisiko mengalami gula darah rendah (hipoglikemia).
- Anda juga mungkin berisiko mengalami gula darah rendah jika mengonsumsi obat diabetes tertentu lainnya seperti sulfonilurea.
- Mari pelajari gejala gula darah rendah, cara mengobatinya, dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat.

HIPOGLIKEMIA

Kadar gula darah rendah (Hipoglikemia) didefinisikan sebagai kadar gula dalam darah bawah 70 mg/dL pada alat pengukur atau sensor glukosa. Kondisi ini dapat membahayakan jika Anda mengonsumsi beberapa obat diabetes, terutama insulin dan sulfonilurea.

KAPAN HARUS WASPADA HIPOGLIKEMIA?

- Sebagian besar orang yang mengalami hipoglikemia akan merasakan tanda dan gejala khas.
- Akan tetapi beberapa orang yang mengalami gula darah rendah juga tidak memiliki gejala apa pun. Itulah mengapa sangat penting untuk memeriksa gula darah secara teratur — dan segera mengobatinya saat kadarnya rendah.
- Tanda dan gejala yang umum terjadi pada penderita hipoglikemia adalah sebagai berikut. Yuk kita kenali!.

PENGENALAN

TANDA DAN GEJALA HIPOGLIKEMIA



1



BADAN BERGETAR

2



JANTUNG BERDEBAR

3



BERKERINGAT

4



GELISAH

5



**RASA LAPAR
BERLEBIH**

6



PANDANGAN KABUR

7



KELELAHAN

8



**PUSING / NYERI
KEPALA**



HYPOGLYRISK

HYPOGLYCEMIA
ASSESSMENT
TOOLS

Pertolongan Pertama

HIPOGLIKEMIA DI RUMAH

Pilih salah satu yang paling
mudah dan cepat didapatkan



01. Madu

Satu sendok makan madu (15 mL)



02. Gula Pasir

1 Sendok makan (15 mL) gula pasir yang dilarutkan dalam 150mL air.



03. Permen

2-3 butir permen.
(kandungan karbohidrat total 15 gram)



04. Jus Buah

2/3 gelas (150mL) jus buah. Jus dapat dalam bentuk jus kemasan maupun jus buah segar.



04. Soda Reguler

2/3 gelas (150mL) soda reguler. Bukan soda diet.

**TUNGGU 15 MENIT LALU
PERIKSA GDS**

**GDS
 ≥ 70 mg/dl**

Apakah waktu makan besar
selanjutnya kurang dari 1
jam?

TIDAK

Anda membutuhkan
asupan snack seperti:
1 potong roti / 7 keping
biskuit ukuran kecil ATAU
Protein: Telur/Keju/sosis

YA

Apakah anda
berencana untuk
mengemudi?

YA

TIDAK

Anda dapat
melanjutkan
aktivitas

- Tunggu 40 menit sebelum mengemudi
- Pastikan kadar gula darah anda 90 mg/dL atau lebih sebelum mengemudi.

**GDS
 ≤ 70 mg/dl**

Ulangi kembali
"Pertolongan Pertama
Hipoglikemia di Rumah"





PENUTUP



PENUTUP

✓ Minta pasien mengulang informasi yang anda berikan. Catat pada kartu konseling.

✓ Menuliskan dan Memberikan PMR.

✓ Mendoakan pasien



CATATAN KONSELING

KARTU KONSELING

NAMA PASIEN :

UMUR :

DIAGNOSA :

NO. REGISTRASI :

ALAMAT / TELP :

RIWAYAT ALERGI :

Tgl Kunjungan	R. Inap/ R. Jalan	Nama Obat	Aturan Pakai	Pemahaman Pasien (B/C/K)*	Materi Konseling	Apoteker
				Nama Obat  Indikasi  Aturan Pakai  Efek Samping 		
				Nama Obat  Indikasi  Aturan Pakai  Efek Samping 		
				Nama Obat  Indikasi  Aturan Pakai  Efek Samping 		

Keterangan : (B/C/K)* = Baik/Cukup/Kurang

CONTOH FORM PATIENT MEDICATION RECORD

PATIENT MEDICATION RECORD (PMR)

Nama Pasien :

No RM :

Umur Pasien :

Alamat / No Tlp :

Diagnosa ;

[illegible]