

Centro de Estatística Aplicada

Gustavo Kanno¹
Rodrigo Marcel Araujo²
Victor Ribeiro Baião Decanini³

Julho de 2021

Sumário

Análise das séries temporais mensais	4
Análise Descritiva	4
Funções de Autocorrelações	30
Análise Correlação Cruzada	36
Selecionado as variáveis de interesse do estudo	42
Modelo da Bovinocultura	43
Regressão classifica no contexto de Séries Temporais	43
Regressão com erros autocorrelacionais	45
Modelo da Avicultura de Corte	51
Regressão classica no contexto de Séries Temporais	52
Modelo da Pescados	55
Regressão classifica no contexto de Séries Temporais	56
Regressão com erros autocorrelacionais	58
Modelo da Avicultura de postura	68
Regressão classifica no contexto de Séries Temporais	69
Regressão com erros autocorrelacionais	70
Modelo do Lácteos	75
Regressão classifica no contexto de Séries Temporais	76
Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor	77
Modelo do Suinocultura	79
Estruturando a base	79
Regressão classifica no contexto de Séries Temporais	80
Análise das séries temporais anuais	85
Análise Descritiva	85
Regressão Lasso para Bovinocultura	87
Regressão Lasso para o Pescado	89
Regressão Lasso para a Avicultura de Corte	91
Regressão Lasso para Avicultura de Postura	93
Regressão Lasso para o Lácteos	95
Regressão Lasso para Suinocultura	97

¹Número USP: 9795810

²Número USP: 9299208

³Número USP: 9790502

```
library(randtests)
```

```
##  
## Attaching package: 'randtests'  
  
## The following object is masked from 'package:tseries':  
##  
## runs.test
```

```
library(zoo)  
library(TSA)
```

```
## Registered S3 methods overwritten by 'TSA':  
## method from  
## fitted.Arima forecast  
## plot.Arima forecast  
  
##  
## Attaching package: 'TSA'  
  
## The following object is masked from 'package:GeneCycle':  
##  
## periodogram  
  
## The following object is masked from 'package:readr':  
##  
## spec  
  
## The following objects are masked from 'package:stats':  
##  
## acf, arima  
  
## The following object is masked from 'package:utils':  
##  
## tar
```

```
library(gridExtra)  
library(FitAR)
```

```
## Loading required package: lattice  
  
##  
## Attaching package: 'lattice'  
  
## The following object is masked from 'package:faraway':  
##  
## melanoma
```

```
## Loading required package: leaps

## Loading required package: ltsa

## Loading required package: bestglm

##
## Attaching package: 'FitAR'

## The following object is masked from 'package:forecast':
##
##      BoxCox

## The following object is masked from 'package:car':
##
##      Boot
```

```
library(glmnet)
```

```
## Loading required package: Matrix

##
## Attaching package: 'Matrix'

## The following objects are masked from 'package:tidyr':
##
##      expand, pack, unpack

## Loaded glmnet 4.1-1
```

```
library(astsa)
```

```
##
## Attaching package: 'astsa'

## The following objects are masked from 'package:fma':
##
##      chicken, sales

## The following object is masked from 'package:forecast':
##
##      gas

## The following object is masked from 'package:fpp2':
##
##      oil
```

```
## The following object is masked from 'package:faraway':
##
##      star
```

```
library(lmtest)
```

Análise das séries temporais mensais

Análise Descritiva

```
data$Data <- as.Date(data$Data)
head(data)
```

```
## # A tibble: 6 x 24
##   Data      Arroz 'Avicultura de ~ 'Avicultura de ~ Banana Batata
##   <date>      <dbl>      <dbl>      <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2007-01-01  0.01      0.295      3.43 -2.86  0.75
## 2 2007-02-01 -0.68      1.71      2.82 -1.62 -3.83
## 3 2007-03-01 -0.635    2.26     10.1  1.05  7.61
## 4 2007-04-01 -0.635   -0.56      1.31 -2.65 36.4
## 5 2007-05-01  0.13     -0.13     -1.11 -1.46 11.6
## 6 2007-06-01  0.230     0.27      4.93 -1.07 -5.17
## # ... with 18 more variables: Bovinocultura <dbl>, 'Cacau e produtos' <dbl>,
## #   Café <dbl>, Cebola <dbl>, 'Complexo soja' <dbl>, 'Complexo
## #   sucroalc.' <dbl>, Feijão <dbl>, Frutas <dbl>, Hortícolas <dbl>,
## #   Indefinido <dbl>, 'Laranja e citros' <dbl>, Lácteos <dbl>, Mandioca <dbl>,
## #   Milho <dbl>, Pescado <dbl>, Suinocultura <dbl>, Tomate <dbl>, Trigo <dbl>
```

```
zt2 <- ts(data[,2], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt3 <- ts(data[,3], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt4 <- ts(data[,4], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt5 <- ts(data[,5], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt6 <- ts(data[,6], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt7 <- ts(data[,7], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt8 <- ts(data[,8], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt9 <- ts(data[,9], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt10 <- ts(data[,10], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt11 <- ts(data[,11], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)

zt12 <- ts(data[,12], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt13 <- ts(data[,13], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt14 <- ts(data[,14], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt15 <- ts(data[,15], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt16 <- ts(data[,16], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt17 <- ts(data[,17], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt18 <- ts(data[,18], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt19 <- ts(data[,19], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt20 <- ts(data[,20], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt21 <- ts(data[,21], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
```

```


zt22 <- ts(data[,22], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt23 <- ts(data[,23], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt24 <- ts(data[,24], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)

```

```

plot(zt2,main="Série Temporal do Arroz", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

```




```

#par(mfrow = c(2, 2))
plot(zt3,main="Série Temporal de Avicultura de Corte", xlab= "Anos", ylab="IPCA")


```

Série Temporal de Avicultura de Corte




```
plot(zt4,main="Série Temporal de Avicultura de Postura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal de Avicultura de Postura




```
plot(zt5,main="Série Temporal da Banana", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal da Banana



```
plot(zt6,main="Série Temporal da Batata", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```



Série Temporal da Batata



```
#par(mfrow = c(3, 2))
```


```
plot(zt7,main="Série Temporal da Bovinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal da Bovinocultura




```
plot(zt8,main="Série Temporal do Cacau e Produtos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Cacau e Produtos




```
plot(zt9,main="Série Temporal do Café", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Café




```
plot(zt10,main="Série Temporal da Cebola", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal da Cebola




```
plot(zt11,main="Série Temporal do Complexo Soja", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Complexo Soja




```
plot(zt12,main="Série Temporal do Complexo Sucroalc.", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Complexo Sucoalc.




```
#par(mfrow = c(3, 2))  
  
plot(zt13,main="Série Temporal do Feijão", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Feijão




```
plot(zt14,main="Série Temporal das Frutas", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```


Série Temporal das Frutas




```
plot(zt15,main="Série Temporal das Hortículas", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal das Hortículas




```
plot(zt16,main="Série Temporal de Indefinido", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal de Indefinido




```
plot(zt17,main="Série Temporal do Laranja e Citrus", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Laranja e Citrus



```
plot(zt18,main="Série Temporal da Lácteos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```


Série Temporal da Lácteos



```
#par(mfrow = c(3, 2))
```


```
plot(zt19,main="Série Temporal da Mandioca", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal da Mandioca




```
plot(zt20,main="Série Temporal do Milho", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Milho




```
plot(zt21,main="Série Temporal do Pescado", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Pescado




```
plot(zt22,main="Série Temporal da Suínocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```


Série Temporal da Suínocultura




```
plot(zt23,main="Série Temporal do Tomate", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Tomate




```
plot(zt24,main="Série Temporal do Trigo", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Trigo




```
par(mfrow = c(2, 1))
plot(zt21,main="Série Temporal do Pescado", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt18,main="Série Temporal do Lácteos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal do Pescado




Série Temporal do Lácteos




#900#650

```
par(mfrow = c(2, 1))
plot(zt7,main="Série Temporal da Bovinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt22,main="Série Temporal da Suínocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal da Bovinocultura




Série Temporal da Suínocultura




```
par(mfrow = c(2, 1))
plot(zt3,main="Série Temporal de Avicultura de Corte", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt4,main="Série Temporal de Avicultura de Postura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```

Série Temporal de Avicultura de Corte




Série Temporal de Avicultura de Postura



Funções de Autocorrelações

Funções de Autocorrelações para Avicultura de Corte


```
#Funções de Autocorrelações para Avicultura de Corte  
par(mfrow = c(1, 2))  
acf(zt3, main="ACF Avicultura de Corte")  
pacf(zt3, main="PACF Avicultura de Corte")
```




Funções de Autocorrelações para Avicultura de Postura

```
#Funções de Autocorrelações para Avicultura de Postura
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt4, main="ACF Avicultura de Postura")
pacf(zt4, main="PACF Avicultura de Postura")
```

ACF Avicultura de Postura




PACF Avicultura de Postura




Funções de Autocorrelações para Suinocultura

```
#Funções de Autocorrelações para Suinocultura  
par(mfrow = c(1, 2))  
acf(zt22, main="ACF Suinocultura")  
pacf(zt22, main="PACF Suinocultura")
```


Funções de Autocorrelações para Pescado

```
#Funções de Autocorrelações para Pescado
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt21, main="ACF Pescado", lag.max = 36)
pacf(zt21, main="PACF Pescado", lag.max = 36)
```




Funções de Autocorrelações para Lácteos

```
#Funções de Autocorrelações para Lácteos
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt18, main="ACF Lácteos", lag.max = 48)
pacf(zt18, main="PACF Lácteos", lag.max = 48)
```



Funções de Autocorrelações para Bovinocultura


```
#Funções de Autocorrelações para Bovinocultura
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt7, main="ACF Bovinocultura")
pacf(zt7, main="PACF Bovinocultura")
```



Análise Correlação Cruzada


Correlações cruzadas da Bovinocultura

```
#Correlações cruzadas da Bovinocultura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt7,zt3,main="Bovinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(zt7,zt4,main="Bovinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(zt7,zt18,main="Bovinocultura e Lâcteos")
ccf(zt7,zt21,main="Bovinocultura e Pescados")
ccf(zt7,zt22,main="Bovinocultura e Suinocultura")
```




Correlações cruzadas da Avicultura de Corte

```
#Correlações cruzadas da Avicultura de Corte
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt3,zt4,main="Avicultura de Corte e Avicultura de Postura")
ccf(zt3,zt7,main="Avicultura de Corte e Bovinocultura")
ccf(zt3,zt18,main="Avicultura de Corte e Lácteos")
ccf(zt3,zt21,main="Avicultura de Corte e Pescados")
ccf(zt3,zt22,main="Avicultura de Corte e Suinocultura")
```




Correlações cruzadas da Avicultura de Postura

```
#Correlações cruzadas da Avicultura de Postura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt4,zt3,main="Avicultura de Postura e Avicultura de Corte")
ccf(zt4,zt7,main="Avicultura de Postura e Bovinocultura")
ccf(zt4,zt18,main="Avicultura de Postura e Lácteos")
ccf(zt4,zt21,main="Avicultura de Postura e Pescados")
ccf(zt4,zt22,main="Avicultura de Postura e Suinocultura")
```




Correlações cruzadas dos Lácteos

```
#Correlações cruzadas dos Lácteos
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt18,zt3,main="Lácteos e Avicultura de Corte")
ccf(zt18,zt4,main="Lácteos e Avicultura de Postura ")
ccf(zt18,zt7,main="Lácteos e Bovinocultura")
ccf(zt18,zt21,main="Lácteos e Pescados")
ccf(zt18,zt22,main="Lácteos e Suinocultura")
```




Correlações cruzadas dos Pescados

```
# Correlações cruzadas dos Pescados
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt21,zt3,main="Pescados e Avicultura de Corte")
ccf(zt21,zt4,main="Pescados e Avicultura de Postura")
ccf(zt21,zt7,main="Pescados e Bovinocultura")
ccf(zt21,zt18,main="Pescados e Lácteos")
ccf(zt21,zt22,main="Pescados e Suinocultura")
```

Correlações cruzadas da Suinocultura

```
#Correlações cruzadas da Suinocultura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt22,zt3,main="Suinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(zt22,zt4,main="Suinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(zt22,zt7,main="Suinocultura e Bovinocultura")
ccf(zt22,zt18,main="Suinocultura e Lacteos")
ccf(zt22,zt21,main="Suinocultura e Pescados")
```



Selecionado as variáveis de interesse do estudo

Essa função retorna a coluna com a lag a ser considerada na análise

#Essa função retorna a coluna com a lag a ser considerada na análise

```
funcao_lags = function(df,coluna,nome,lag){
  n = nrow(df)
  pre = rep(NA,lag)
  newcol = c(pre,coluna)
  for (k in 1:lag){
    df = rbind(df,rep(NA,ncol(df)))
  }
  df[nome] = newcol
  return (df)
}
```

A função a baixo retira as variáveis do modelo em função do p-valor

#A função a baixo retira as variáveis do modelo em função do p-valor

```
tirar_variaveis = function(p,d,q,x,y){
  v = p + q + 1
  max = 0.06
  while (max > 0.05){
    model = Arima(y,order=c(p,d,q),xreg = x)
    ct = coeftest(model)
```

```

pvalues = ct[(v+1):nrow(ct),4]
maxi = which.max(pvalues)
max = ct[v + maxi,4]
if (max > 0.05) {
  x = x[,-maxi]
}
}
lista = list(ct, x)
return (lista)
}

```

A seguir vamos selecionar apenas as variáveis de interesse para análise

```

#A seguir vamos selecionar apenas as variáveis de interesse para análise
data_cut = data[,c("Bovinocultura", "Avicultura de Corte", "Avicultura de Postura", "Pescado", "Lácteos", "S

```

Modelo da Bovinocultura

Estruturando a base

```

#Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$'Avicultura de Postura', 'avp9', 9)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'p3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'p10', 10)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'b1', 1)

df2 <- na.omit(df1)

```

Separando variável preditora e as covariáveis

```

#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Bovinocultura~.,df2)[,-1]
y = df2$Bovinocultura

```

Regressão classifica no contexto de Séries Temporais

Criando o modelo de Regressão Simples

```

#Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

```

```


##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:

```

```
##      Min      1Q  Median      3Q      Max
## -3.5314 -0.9189 -0.0157  0.5586  8.5757
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      0.28536    0.20364   1.401 0.163405
## x'Avicultura de Corte'  0.41328    0.11349   3.642 0.000384 ***
## x'Avicultura de Postura' 0.04542    0.06035   0.753 0.452982
## xPescado         -0.26037    0.11194  -2.326 0.021498 *
## xLácteos         -0.20785    0.12322  -1.687 0.093939 .
## xSuinocultura     0.28048    0.21162   1.325 0.187266
## xavp9            0.17980    0.05358   3.356 0.001026 **
## xp3              -0.02202    0.10186  -0.216 0.829147
## xp10             0.07166    0.10163   0.705 0.481954
## xb1              0.37950    0.09758   3.889 0.000157 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.636 on 136 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.4224, Adjusted R-squared:  0.3841
## F-statistic: 11.05 on 9 and 136 DF, p-value: 8.134e-13
```

Análise dos Resíduos

```
#Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.18 -0.04 -0.12 -0.08 0.05 0.06 0.02 0.01 -0.01 -0.05 -0.03 0.05 0.04
## PACF 0.18 -0.07 -0.11 -0.04 0.07 0.02 0.00 0.02 0.00 -0.05 -0.01 0.06 0.01
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF  -0.05 -0.08 -0.07 0.03 0.07 0.00 -0.04 -0.09 0.03 0.02
## PACF -0.07 -0.05 -0.04 0.03 0.03 -0.03 -0.03 -0.06 0.07 -0.01
```

Regressão com erros autocorrelacionais

Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

#Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

```
fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)
fit2[[1]]
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept          0.288306   0.153111  1.8830 0.0597017 .
## 'Avicultura de Corte' 0.442471   0.105529  4.1929 2.754e-05 ***
## Pescado             -0.200620   0.097816 -2.0510 0.0402669 *
## avp9                 0.179147   0.052350  3.4221 0.0006214 ***
## b1                   0.442780   0.088166  5.0221 5.110e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]
```

```
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx)
fit3
```


```
## Series: y
## Regression with ARIMA(0,0,0) errors
##
## Coefficients:
##      intercept  'Avicultura de Corte'  Pescado    avp9      b1
##           0.2883                0.4425 -0.2006  0.1791  0.4428
## s.e.        0.1531                0.1055   0.0978  0.0523  0.0882
##
## sigma^2 estimated as 2.693: log likelihood=-276.95
## AIC=565.9   AICc=566.51   BIC=583.81
```

```
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
```

```
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept      0.288306   0.153111  1.8830 0.0597017 .
## 'Avicultura de Corte' 0.442471   0.105529  4.1929 2.754e-05 ***
## Pescado        -0.200620   0.097816 -2.0510 0.0402669 *
## avp9           0.179147   0.052350  3.4221 0.0006214 ***
## b1             0.442780   0.088166  5.0221 5.110e-07 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
acf2(fit3$residuals)
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.18 -0.04 -0.11 -0.08 0.05 0.05 0.04  0 -0.02 -0.04 -0.01  0.04  0.04
## PACF 0.18 -0.07 -0.10 -0.04 0.07 0.01 0.02  0 -0.01 -0.03  0.00  0.04  0.01
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF  -0.06 -0.08 -0.07 -0.01  0.04 -0.02 -0.05 -0.10  0.03  0.02
## PACF -0.07 -0.05 -0.04  0.00  0.01 -0.04 -0.04 -0.08  0.07 -0.01
```

```
fit4 = Arima(y,order=c(1,0,0),xreg=xx)
fit4
```


```
## Series: y
## Regression with ARIMA(1,0,0) errors
##
```

```
## Coefficients:
##          ar1 intercept 'Avicultura de Corte' Pescado avp9 b1
##          0.4823    0.5436                0.5648 -0.1257 0.1491 0.1027
## s.e.    0.1250    0.2797                0.1101  0.0892 0.0492 0.1226
##
## sigma^2 estimated as 2.485: log likelihood=-270.68
## AIC=555.36 AICc=556.17 BIC=576.24
```

```
coeftest(fit4)
```


```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## ar1            0.482252   0.124956  3.8594 0.0001137 ***
## intercept      0.543622   0.279737  1.9433 0.0519760 .
## 'Avicultura de Corte' 0.564759   0.110114  5.1289 2.915e-07 ***
## Pescado        -0.125731   0.089156 -1.4102 0.1584680
## avp9            0.149073   0.049215  3.0290 0.0024534 **
## b1              0.102674   0.122567  0.8377 0.4022023
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
checkresiduals(fit4)
```



```
##
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(1,0,0) errors
## Q* = 3.2481, df = 4, p-value = 0.5172
##
## Model df: 6. Total lags used: 10
```

```
acf2(fit4$residuals)
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.02 -0.01 -0.1 -0.04 0.07 0.02 0.05 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 0.02 0.06
## PACF 0.02 -0.01 -0.1 -0.04 0.07 0.01 0.04 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.01 0.05
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF  -0.08 -0.05 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.10 0.06 0.03
## PACF -0.09 -0.04 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01 -0.03 -0.09 0.07 0.02
```

```
fit5 <- tirar_variaveis(1, 0, 0, xx, y)
fit5[[1]]
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
```



```
## ar1                0.547259    0.087657    6.2432 4.288e-10 ***
## intercept          0.584360    0.293969    1.9878  0.04683 *
## 'Avicultura de Corte' 0.560426    0.106041    5.2850 1.257e-07 ***
## avp9               0.132716    0.047193    2.8122  0.00492 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


```
xx <- fit5[2]
xx<- xx[[1]]
```

```
fit6 = Arima(y,order=c(1,0,0),xreg=xx,fixed=c(NA,NA, NA, NA))
cof.fit6 = coeftest(fit6)
cof.fit6
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## ar1            0.547259    0.087657    6.2432 4.288e-10 ***
## intercept      0.584360    0.293969    1.9878  0.04683 *
## 'Avicultura de Corte' 0.560426    0.106041    5.2850 1.257e-07 ***
## avp9           0.132716    0.047193    2.8122  0.00492 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


```
checkresiduals(fit6)
```

Residuals from Regression with ARIMA(1,0,0) errors



```
##
##  Ljung-Box test
##
## data:  Residuals from Regression with ARIMA(1,0,0) errors
## Q* = 4.357, df = 6, p-value = 0.6285
##
## Model df: 4.   Total lags used: 10
```

```
acf2(fit6$residuals, main = "")
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.04 -0.03 -0.11 -0.04 0.05 0.04 0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01  0.03  0.08
## PACF 0.04 -0.03 -0.11 -0.03 0.05 0.03 0.07 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02  0.01  0.07
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF  -0.09 -0.05 -0.04 -0.04  0.01  0.01 -0.05 -0.09  0.06  0.03
## PACF -0.10 -0.03 -0.02 -0.06 -0.01  0.01 -0.07 -0.07  0.07  0.01
```

Modelo da Avicultura de Corte

Estruturando a base

```
#Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$'Avicultura de Corte', 'cort1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'pos12', 12)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes4', 4)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes9', 9)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Suinocultura, 'sui1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Suinocultura, 'sui6', 6)

df2 <- na.omit(df1)
```

Separando variável preditora e as covariáveis

```
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix('Avicultura de Corte'~.,df2)[,-1]
y = df2$'Avicultura de Corte'
```

Regressão classica no contexto de Séries Temporais


Criando o modelo de Regressão Simples

```
#Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.8583 -0.5435 -0.0324  0.5123  3.4823
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    -0.01212     0.13955  -0.087 0.930894
## xBovinocultura    0.22080     0.05196   4.249 4.05e-05 ***
## x'Avicultura de Postura' 0.12991     0.03793   3.425 0.000822 ***
## xPescado         0.07105     0.06226   1.141 0.255841
## xLácteos         0.24253     0.07549   3.213 0.001655 **
## xSuinocultura    0.19667     0.13949   1.410 0.160939
## xcort1           0.33941     0.07225   4.698 6.56e-06 ***
## xpos12          -0.10059     0.03611  -2.785 0.006139 **
## xbov1            0.07239     0.06584   1.099 0.273628
## xpes4           -0.06147     0.06412  -0.959 0.339505
## xpes9            0.15784     0.06198   2.547 0.012035 *
## xsui1           -0.01789     0.13031  -0.137 0.891035
## xsui6           -0.44583     0.11305  -3.944 0.000130 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.9766 on 131 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5835, Adjusted R-squared:  0.5454
## F-statistic: 15.3 on 12 and 131 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Análise dos Resíduos

```
#Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF   0.1 0.01 -0.13 -0.03 -0.04  0.00 0.12  0.01 0.06 -0.02 -0.09 -0.05 -0.04
## PACF  0.1 0.00 -0.13 -0.01 -0.03 -0.01 0.12 -0.02 0.06  0.00 -0.09 -0.01 -0.04
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
## ACF  -0.03  0.01 -0.04  0.04  0.04  0.04 -0.09 -0.06  0.03
## PACF -0.05  0.01 -0.07  0.04  0.05  0.03 -0.07 -0.03  0.04
```

Seleção de variáveis

```
#Seleção de variáveis
fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)
xx <- fit2[2]
xx <- xx[[1]]

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), include.mean = FALSE, xreg=xx)
fit3
```

```
## Series: y
## Regression with ARIMA(0,0,0) errors
##
## Coefficients:
##      Bovinocultura  'Avicultura de Postura'  Lácteos   cort1   pos12   pes9
##              0.2870                0.1343   0.2003  0.4368  -0.0781  0.195
## s.e.              0.0401                0.0350   0.0681  0.0561  0.0329  0.053
##              sui6
##             -0.4269
```


```
## s.e.    0.0992
##
## sigma^2 estimated as 0.9627:  log likelihood=-198
## AIC=412   AICc=413.07   BIC=435.76
```

```
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)
## Bovinocultura      0.286983   0.040122   7.1527 8.509e-13 ***
## 'Avicultura de Postura' 0.134314   0.035007   3.8368 0.0001247 ***
## Lácteos              0.200323   0.068070   2.9429 0.0032516 **
## cort1                0.436756   0.056084   7.7875 6.833e-15 ***
## pos12               -0.078065   0.032944  -2.3696 0.0178072 *
## pes9                 0.195018   0.053005   3.6793 0.0002339 ***
## sui6                -0.426896   0.099200  -4.3034 1.682e-05 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
checkresiduals(fit3)
```


Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors



```
##
```

```
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors
## Q* = 4.3146, df = 3, p-value = 0.2294
##
## Model df: 7. Total lags used: 10
```

```
acf2(fit3$residuals, main = "")
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.02 0.01 -0.1 0.01 -0.02 -0.04 0.10 0.02 0.06 0.01 -0.08 -0.07 -0.03
## PACF 0.02 0.01 -0.1 0.01 -0.02 -0.05 0.11 0.01 0.05 0.03 -0.08 -0.06 -0.01
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
## ACF  -0.06 0.02 -0.05 0.02 0.02 0.03 -0.07 -0.05 0.04
## PACF -0.08 0.02 -0.07 0.00 0.04 0.02 -0.06 -0.01 0.04
```

Modelo da Pescados

Estruturando a base

```
# Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$Pescado, 'pes1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes5', 5)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes12', 12)
```

```

df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'cort3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'cort8', 8)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'pos2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'pos9', 9)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov7', 7)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Lácteos, 'lact2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Lácteos, 'lact8', 8)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Suinocultura, 'sui3', 3)

df2 <- na.omit(df1)

```

Separando variável preditora e as covariáveis

```

#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Pescado~.,df2)[,-1]
y = df2$Pescado

```

Regressão classifica no contexto de Séries Temporais

Criando o modelo de Regressão Simples

```

# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -2.8416 -0.7307 -0.0757  0.6792  3.1091
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      0.19703    0.16044   1.228 0.221743
## xBovinocultura  -0.03365    0.06031  -0.558 0.577890
## x'Avicultura de Corte'  0.01262    0.08765   0.144 0.885759


```



```
## x'Avicultura de Postura'  0.14380    0.04089    3.517 0.000609 ***
## xLácteos                 -0.11286    0.09287   -1.215 0.226550
## xSuinocultura            0.11153    0.14706    0.758 0.449621
## xpes1                    -0.03033    0.06781   -0.447 0.655479
## xpes5                    -0.08437    0.07483   -1.128 0.261683
## xpes12                   0.30991    0.07164    4.326 3.08e-05 ***
## xcort3                   0.07747    0.07984    0.970 0.333785
## xcort8                   -0.14097    0.07260   -1.942 0.054438 .
## xpos2                    -0.03105    0.04007   -0.775 0.439934
## xpos9                    0.09715    0.03980    2.441 0.016048 *
## xbov1                    0.16976    0.07257    2.339 0.020910 *
## xbov3                    -0.05010    0.06816   -0.735 0.463668
## xbov7                    -0.12174    0.05980   -2.036 0.043905 *
## xlact2                   0.02538    0.09274    0.274 0.784790
## xlact8                   0.05811    0.08427    0.690 0.491745
## xsui3                    0.37341    0.15003    2.489 0.014128 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1.098 on 125 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5513, Adjusted R-squared:  0.4867
## F-statistic: 8.534 on 18 and 125 DF,  p-value: 1.673e-14
```

Análise dos Resíduos

```
# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  -0.07 0.09 0.09 -0.14 0.08 -0.06 -0.04 0.03 0.00  0.06 -0.01 -0.18 -0.09
## PACF -0.07 0.09 0.10 -0.14 0.04 -0.04 -0.03 0.01 0.03  0.05 -0.01 -0.20 -0.13
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
## ACF  -0.09 -0.02  0.08 -0.04  0.03  0.03  0.01 -0.01 -0.01
## PACF -0.06  0.02  0.09 -0.01 -0.03 -0.01  0.02 -0.02  0.03
```

Regressão com erros autocorrelacionais

Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

```
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
y = ts(y, frequency=12)

x = x[, -1]
fit3 = Arima(y, order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0), xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1         -0.386944   0.091562 -4.2261 2.378e-05 ***
## intercept      0.080072   0.119976  0.6674 0.5045201
## 'Avicultura de Corte' 0.021593   0.070335  0.3070 0.7588441
```

```
## 'Avicultura de Postura' 0.116637 0.033488 3.4830 0.0004959 ***
## Lácteos -0.062973 0.080753 -0.7798 0.4354975
## Suinocultura 0.155301 0.120650 1.2872 0.1980220
## pes1 -0.037597 0.052277 -0.7192 0.4720305
## pes5 -0.095328 0.059900 -1.5915 0.1115067
## pes12 0.507059 0.069068 7.3415 2.112e-13 ***
## cort3 0.077964 0.068351 1.1406 0.2540252
## cort8 -0.099856 0.067674 -1.4755 0.1400699
## pos2 -0.012863 0.032304 -0.3982 0.6905015
## pos9 0.065823 0.031207 2.1092 0.0349240 *
## bov1 0.095679 0.063358 1.5101 0.1310108
## bov3 -0.025267 0.056244 -0.4492 0.6532543
## bov7 -0.103807 0.050848 -2.0415 0.0411989 *
## lact2 0.003111 0.079860 0.0390 0.9689257
## lact8 0.033576 0.077945 0.4308 0.6666430
## sui3 0.345969 0.120310 2.8757 0.0040319 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-15]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
## Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1 -0.387179 0.091333 -4.2392 2.243e-05 ***
## intercept 0.081189 0.116486 0.6970 0.4858110
## 'Avicultura de Corte' 0.021848 0.070023 0.3120 0.7550344
## 'Avicultura de Postura' 0.116206 0.031601 3.6772 0.0002358 ***
## Lácteos -0.061895 0.075859 -0.8159 0.4145439
## Suinocultura 0.155191 0.120610 1.2867 0.1981900
## pes1 -0.038027 0.051090 -0.7443 0.4566819
## pes5 -0.095203 0.059810 -1.5917 0.1114423
## pes12 0.507119 0.069034 7.3459 2.044e-13 ***
## cort3 0.077986 0.068345 1.1411 0.2538471
## cort8 -0.099416 0.066727 -1.4899 0.1362542
## pos2 -0.012825 0.032287 -0.3972 0.6912055
## pos9 0.065767 0.031172 2.1098 0.0348757 *
## bov1 0.095336 0.062735 1.5197 0.1285958
## bov3 -0.025241 0.056236 -0.4488 0.6535506
## bov7 -0.103724 0.050801 -2.0418 0.0411723 *
## lact8 0.033821 0.077687 0.4354 0.6633040
## sui3 0.346308 0.119977 2.8865 0.0038960 **
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-1]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
```

```
## z test of coefficients:
##
##
##           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.384320   0.091107 -4.2184 2.461e-05 ***
## intercept       0.087499   0.114897  0.7615 0.4463318
## 'Avicultura de Postura' 0.117141  0.031538  3.7142 0.0002038 ***
## Lácteos         -0.058925   0.075323 -0.7823 0.4340391
## Suinocultura     0.160818   0.119384  1.3471 0.1779589
## pes1            -0.040538   0.050535 -0.8022 0.4224562
## pes5            -0.096844   0.059644 -1.6237 0.1044420
## pes12           0.505835   0.069119  7.3183 2.511e-13 ***
## cort3           0.074506   0.067497  1.1038 0.2696650
## cort8          -0.100503   0.066625 -1.5085 0.1314272
## pos2           -0.013420   0.032278 -0.4158 0.6775852
## pos9           0.067293   0.030822  2.1833 0.0290167 *
## bov1           0.103928   0.056423  1.8419 0.0654843 .
## bov3           -0.025070   0.056307 -0.4452 0.6561505
## bov7           -0.109781   0.046989 -2.3363 0.0194757 *
## lact8          0.029144   0.076293  0.3820 0.7024574
## sui3           0.356336   0.115786  3.0775 0.0020872 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-14]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##
##           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.388147   0.090164 -4.3049 1.671e-05 ***
## intercept       0.095826   0.112606  0.8510 0.394777
## 'Avicultura de Postura' 0.118704  0.031256  3.7978 0.000146 ***
## Lácteos         -0.058338   0.075318 -0.7746 0.438605
## Suinocultura     0.157438   0.118989  1.3231 0.185792
## pes1            -0.036520   0.049362 -0.7398 0.459399
## pes5            -0.097461   0.059586 -1.6356 0.101919
## pes12           0.513113   0.066348  7.7336 1.045e-14 ***
## cort3           0.073818   0.067452  1.0944 0.273796
## cort8          -0.096605   0.065857 -1.4669 0.142403
## pos2           -0.011675   0.031917 -0.3658 0.714510
## pos9           0.070328   0.029759  2.3633 0.018114 *
## bov1           0.103383   0.056372  1.8340 0.066660 .
## bov3           -0.022418   0.055839 -0.4015 0.688067
## bov7           -0.112367   0.046468 -2.4182 0.015598 *
## sui3           0.351878   0.115074  3.0578 0.002229 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-9]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.390935   0.089362 -4.3747 1.216e-05 ***
## intercept      0.096283   0.112406  0.8566 0.391686
## 'Avicultura de Postura' 0.120786   0.030699  3.9345 8.338e-05 ***
## Lácteos        -0.063597   0.073916 -0.8604 0.389575
## Suinocultura    0.154805   0.118734  1.3038 0.192303
## pes1          -0.040696   0.047980 -0.8482 0.396326
## pes5          -0.104471   0.056397 -1.8524 0.063964 .
## pes12          0.517458   0.064975  7.9639 1.667e-15 ***
## cort3          0.072869   0.067380  1.0815 0.279492
## cort8         -0.097380   0.065850 -1.4788 0.139192
## pos9           0.070694   0.029732  2.3777 0.017421 *
## bov1           0.104262   0.056282  1.8525 0.063952 .
## bov3          -0.021411   0.055754 -0.3840 0.700960
## bov7          -0.112548   0.046456 -2.4227 0.015406 *
## sui3           0.349353   0.114804  3.0430 0.002342 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-11]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.392673   0.088904 -4.4168 1.002e-05 ***
## intercept      0.092348   0.111873  0.8255 0.409104
## 'Avicultura de Postura' 0.117943   0.029764  3.9625 7.415e-05 ***
## Lácteos        -0.060075   0.073328 -0.8193 0.412638
## Suinocultura    0.156577   0.118658  1.3196 0.186979
## pes1          -0.042151   0.047810 -0.8816 0.377972
## pes5          -0.102738   0.056211 -1.8277 0.067592 .
## pes12          0.519187   0.064688  8.0260 1.007e-15 ***
## cort3          0.063206   0.062513  1.0111 0.311977
## cort8         -0.098137   0.065817 -1.4911 0.135945
## pos9           0.070944   0.029689  2.3895 0.016869 *
## bov1           0.101801   0.055946  1.8196 0.068815 .
## bov7          -0.112213   0.046453 -2.4156 0.015708 *
## sui3           0.335663   0.109074  3.0774 0.002088 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-2]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
```

```
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.400868   0.087551 -4.5787 4.679e-06 ***
## intercept      0.071346   0.108529  0.6574 0.5109328
## 'Avicultura de Postura' 0.112130  0.028898  3.8802 0.0001044 ***
## Suinocultura    0.147507   0.118103  1.2490 0.2116763
## pes1          -0.041784   0.047712 -0.8758 0.3811637
## pes5          -0.110446   0.055348 -1.9955 0.0459902 *
## pes12          0.526696   0.063928  8.2389 < 2.2e-16 ***
## cort3          0.062889   0.062508  1.0061 0.3143661
## cort8         -0.098307   0.065984 -1.4899 0.1362606
## pos9           0.071948   0.029595  2.4311 0.0150537 *
## bov1           0.106356   0.055664  1.9107 0.0560455 .
## bov7          -0.119520   0.045542 -2.6244 0.0086805 **
## sui3           0.334402   0.108969  3.0688 0.0021494 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-3]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.398561   0.088489 -4.5041 6.667e-06 ***
## intercept      0.053521   0.106943  0.5005 0.6167476
## 'Avicultura de Postura' 0.108768  0.028746  3.7837 0.0001545 ***
## Suinocultura    0.151192   0.118435  1.2766 0.2017491
## pes5          -0.102299   0.054775 -1.8676 0.0618157 .
## pes12          0.522676   0.064592  8.0920 5.869e-16 ***
## cort3          0.059915   0.062636  0.9566 0.3387898
## cort8         -0.095019   0.066096 -1.4376 0.1505515
## pos9           0.071221   0.029727  2.3958 0.0165836 *
## bov1           0.102061   0.055734  1.8312 0.0670717 .
## bov7          -0.120174   0.045699 -2.6297 0.0085467 **
## sui3           0.317169   0.107541  2.9493 0.0031851 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-5]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          -0.398172   0.088518 -4.4982 6.854e-06 ***
## intercept      0.060722   0.107058  0.5672 0.5705875
```


```
## 'Avicultura de Postura' 0.112567 0.028586 3.9378 8.223e-05 ***
## Suinocultura          0.163490 0.118145 1.3838 0.1664180
## pes5                  -0.106665 0.054751 -1.9482 0.0513943 .
## pes12                 0.535268 0.063461 8.4345 < 2.2e-16 ***
## cort8                -0.102429 0.065732 -1.5583 0.1191654
## pos9                  0.072864 0.029770 2.4475 0.0143834 *
## bov1                  0.091020 0.054774 1.6617 0.0965686 .
## bov7                 -0.119608 0.045864 -2.6079 0.0091094 **
## sui3                  0.348003 0.103094 3.3756 0.0007366 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-4]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          0.2469874 0.1061663 2.3264 0.0199962 *
## intercept     0.4025207 0.1625312 2.4766 0.0132650 *
## 'Avicultura de Postura' 0.1477883 0.0400297 3.6920 0.0002225 ***
## Suinocultura  -0.0079504 0.1475616 -0.0539 0.9570319
## pes5          -0.1227962 0.0783012 -1.5683 0.1168216
## cort8         -0.1584009 0.0703558 -2.2514 0.0243585 *
## pos9           0.1308314 0.0400853 3.2638 0.0010992 **
## bov1           0.1896427 0.0636054 2.9816 0.0028679 **
## bov7          -0.1488028 0.0572052 -2.6012 0.0092895 **
## sui3           0.3490096 0.1297387 2.6901 0.0071431 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```



```
checkresiduals(fit3)
```

Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0)(1,0,0)[12] errors



```
##
##  Ljung-Box test
##
## data:  Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0)(1,0,0)[12] errors
## Q* = 21.828, df = 14, p-value = 0.08222
##
## Model df: 10.   Total lags used: 24
```

```
acf2(fit3$residuals, main = "")
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  -0.02 0.13 0.08 -0.14 0.07 -0.12 -0.10 -0.04 0.00  0.08 -0.03 -0.04 -0.05
## PACF  -0.02 0.13 0.09 -0.16 0.04 -0.09 -0.09 -0.05 0.06  0.08 -0.05 -0.09 -0.07
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25]
## ACF  -0.08  0.00 -0.03 -0.11  0.00    0 -0.03  0.03  0.01 -0.06  0.17  0.09
## PACF  -0.07  0.01  0.01 -0.10 -0.03    0 -0.05 -0.01  0.04 -0.08  0.13  0.11
##      [,26] [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37]
## ACF   0.06  0.06  0.03 -0.03  0.02 -0.02 -0.13  0.09 -0.06  0.09  0.13  0.04
## PACF   0.04 -0.01  0.05 -0.06  0.02  0.02 -0.09  0.11 -0.05  0.07  0.14  0.10
##      [,38] [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48]
## ACF   0.00 -0.05 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07  0.02  0.06 -0.05  0.06
## PACF  -0.06 -0.04 -0.07  0.01  0.01 -0.06 -0.04  0.03  0.00 -0.06  0.04
```

```
x = x[,-2]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## sar1          0.245630   0.103130  2.3818 0.0172305 *
## intercept     0.400724   0.158954  2.5210 0.0117018 *
## 'Avicultura de Postura' 0.147907   0.039969  3.7005 0.0002151 ***
## pes5         -0.123470   0.077226 -1.5988 0.1098647
## cort8        -0.158979   0.069562 -2.2854 0.0222871 *
```


```
## pos9          0.130901  0.040054  3.2681 0.0010827 **
## bov1          0.187958  0.055461  3.3890 0.0007014 ***
## bov7         -0.148780  0.057202 -2.6010 0.0092965 **
## sui3          0.348588  0.129523  2.6913 0.0071169 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
x = x[,-2]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value  Pr(>|z|)
## sar1          0.309151  0.098927  3.1250 0.0017778 **
## intercept     0.331766  0.161882  2.0494 0.0404197 *
## 'Avicultura de Postura' 0.133601  0.039667  3.3681 0.0007570 ***
## cort8        -0.161858  0.070924 -2.2821 0.0224811 *
## pos9          0.135222  0.041512  3.2574 0.0011243 **
## bov1          0.198338  0.055331  3.5845 0.0003377 ***
## bov7         -0.152063  0.057899 -2.6264 0.0086302 **
## sui3          0.327597  0.130070  2.5186 0.0117818 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```



```
checkresiduals(fit3)
```

Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0)(1,0,0)[12] errors



```
##
##  Ljung-Box test
##
## data:  Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0)(1,0,0)[12] errors
## Q* = 22.744, df = 16, p-value = 0.1208
##
## Model df: 8.   Total lags used: 24
```

```
acf2(fit3$residuals, main = "")
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.02  0.12  0.08 -0.14 -0.06 -0.12 -0.13 -0.05  0.02  0.08 -0.01 -0.06 -0.04
## PACF  0.02  0.12  0.07 -0.16 -0.07 -0.09 -0.09 -0.04  0.05  0.08 -0.05 -0.13 -0.07
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24] [,25]
## ACF -0.07 -0.01 -0.03 -0.12  0.02 -0.02 -0.05  0.03  0.03 -0.04  0.16  0.11
## PACF -0.04  0.02 -0.01 -0.13 -0.02 -0.04 -0.09 -0.01  0.05 -0.07  0.11  0.10
##      [,26] [,27] [,28] [,29] [,30] [,31] [,32] [,33] [,34] [,35] [,36] [,37]
## ACF  0.06  0.07  0.02 -0.05 -0.01 -0.04 -0.13  0.10 -0.06  0.11  0.14  0.07
## PACF  0.02  0.01  0.02 -0.05  0.02  0.02 -0.09  0.12 -0.06  0.09  0.14  0.10
##      [,38] [,39] [,40] [,41] [,42] [,43] [,44] [,45] [,46] [,47] [,48]
## ACF  0.00 -0.04 -0.08 -0.09 -0.08 -0.10 -0.07  0.03  0.09 -0.02  0.07
## PACF -0.03 -0.03 -0.06  0.02  0.02 -0.07 -0.04  0.02  0.04 -0.04  0.04
```

S

```
## function (object, brief, ...)
## {
##     UseMethod("S")
## }
## <bytecode: 0x00000000217682d8>
## <environment: namespace:car>
```

Modelo da Avicultura de postura

Estruturando a base

```
# Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$'Avicultura de Postura', 'avp1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'avp12', 12)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc5', 5)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Lácteos, 'lact11', 11)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes9', 9)

df2 <- na.omit(df1)
```

Separando variável preditora e as covariáveis

```
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix('Avicultura de Postura'~.,df2)[,-1]
y = df2$'Avicultura de Postura'
```

Regressão classifica no contexto de Séries Temporais

Criando o modelo de Regressão Simples


```
# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -4.2151 -1.3755 -0.1872  1.4374  8.2788
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   -0.01295    0.31733  -0.041  0.967509
## xBovinocultura -0.01770    0.10989  -0.161  0.872253
## x'Avicultura de Corte'  0.45460    0.16365   2.778  0.006274 **
## xPescado       0.35251    0.13562   2.599  0.010415 *
## xLácteos       0.16496    0.17453   0.945  0.346327
## xSuinocultura  -0.28456    0.27621  -1.030  0.304802
## xavp1          0.09421    0.07633   1.234  0.219312
## xavp12         0.31398    0.08246   3.808  0.000215 ***
## xavc5          0.31548    0.13972   2.258  0.025600 *
## xbov3          0.07400    0.12114   0.611  0.542366
## xlact11        0.11042    0.16012   0.690  0.491666
## xpes2         -0.02661    0.14349  -0.185  0.853182
## xpes9         -0.36608    0.14250  -2.569  0.011319 *
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
##
## Residual standard error: 2.178 on 131 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3902, Adjusted R-squared:  0.3343
## F-statistic: 6.984 on 12 and 131 DF,  p-value: 1.096e-09
```

Análise dos Resíduos

```
# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.02 -0.12 -0.2  0.00 0.11  0.01 -0.13 -0.02 -0.06  0.05  0.13 -0.10 -0.03
## PACF  0.02 -0.12 -0.2 -0.01 0.06 -0.04 -0.12  0.01 -0.10  0.00  0.12 -0.11 -0.01
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
## ACF  -0.18  0.10  0.02  0.00 -0.10 -0.05 -0.03  0.06 -0.06
## PACF -0.17  0.06 -0.07 -0.02 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.09
```

Regressão com erros autocorrelacionais

Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

```
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
fit2<- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)
fit2[1]
```

```
## [[1]]
##
## z test of coefficients:
##
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept      0.122436   0.232096   0.5275 0.5978295
## 'Avicultura de Corte' 0.430956   0.133305   3.2328 0.0012256 **
## Pescado         0.309973   0.122283   2.5349 0.0112488 *
## avp12           0.357888   0.071081   5.0350 4.779e-07 ***
## avc5            0.341335   0.128150   2.6636 0.0077320 **
## pes9           -0.441287   0.128116  -3.4444 0.0005722 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


```
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]
```

```
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##               Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept      0.122436   0.232096   0.5275 0.5978295
## 'Avicultura de Corte' 0.430956   0.133305   3.2328 0.0012256 **
## Pescado         0.309973   0.122283   2.5349 0.0112488 *
## avp12           0.357888   0.071081   5.0350 4.779e-07 ***
## avc5            0.341335   0.128150   2.6636 0.0077320 **
## pes9           -0.441287   0.128116  -3.4444 0.0005722 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


```
checkresiduals(fit3)
```

Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors



```
##
##  Ljung-Box test
##
## data:  Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors
## Q* = 14.912, df = 4, p-value = 0.004888
##
## Model df: 6.    Total lags used: 10
```

```
acf2(fit3$residuals)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
## ACF   0.1 -0.12 -0.21 -0.03 0.09  0.00 -0.12 -0.02 -0.05  0.08  0.12 -0.11
## PACF  0.1 -0.13 -0.19 -0.01 0.06 -0.06 -0.11  0.02 -0.09  0.04  0.10 -0.14
##      [,13] [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
## ACF  -0.03 -0.14  0.08  0.03    0 -0.08 -0.07 -0.04  0.05 -0.04
## PACF  0.02 -0.13  0.07 -0.05    0 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 -0.07
```

```
fit4 = Arima(y,order=c(3,0,0),xreg=xx,include.mean = FALSE,fixed=c(0,0,NA,NA,0,NA,NA,NA))
fit4
```


```
## Series: y
## Regression with ARIMA(3,0,0) errors
##
## Coefficients:
##      ar1  ar2      ar3  'Avicultura de Corte'  Pescado  avp12  avc5
##      0    0  -0.2280          0.6010          0  0.4380  0.4151
## s.e.    0    0   0.0826          0.1232          0  0.0624  0.1163
##      pes9
##      -0.3460
## s.e.    0.1074
##
## sigma^2 estimated as 4.628:  log likelihood=-312.18
## AIC=636.35   AICc=636.97   BIC=654.17
```

```
coeftest(fit4)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## ar3          -0.227984   0.082567 -2.7612 0.0057588 **
## 'Avicultura de Corte' 0.601047   0.123219  4.8779 1.072e-06 ***
## avp12         0.438035   0.062446  7.0147 2.305e-12 ***
## avc5          0.415126   0.116253  3.5709 0.0003558 ***
## pes9         -0.346032   0.107404 -3.2218 0.0012739 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


```
checkresiduals(fit4)
```

Residuals from Regression with ARIMA(3,0,0) errors



```
##
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(3,0,0) errors
## Q* = 7.5364, df = 3, p-value = 0.05663
##
## Model df: 8. Total lags used: 11
```

```
acf2(fit4$residuals, main = "")
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12]
## ACF  0.08 -0.11 -0.01 -0.03  0.04 -0.06 -0.05  0.00 -0.08  0.08  0.10 -0.14
## PACF  0.08 -0.12  0.01 -0.04  0.05 -0.07 -0.03 -0.01 -0.08  0.09  0.07 -0.14
##      [,13] [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22]
## ACF  -0.03 -0.10  0.07 -0.02 -0.02 -0.04 -0.08 -0.03  0.04 -0.06
## PACF  0.00 -0.13  0.09 -0.08  0.04 -0.08 -0.06 -0.05  0.00 -0.08
```

Modelo do Lácteos

Estruturando a base

```
# Estruturando a base

df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$Lácteos, 'lact1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'avp1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc6', 6)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes4', 4)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes9', 9)

df2 <- na.omit(df1)
```

Separando variável preditora e as covariáveis

```
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Lácteos~.,df2)[,-1]
y = df2$Lácteos
```

Regressão classifica no contexto de Séries Temporais


Criando o modelo de Regressão Simples

```
# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.9889 -0.5093 -0.0365  0.3740  3.7350
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      0.15734     0.11576   1.359   0.1763
## xBovinocultura    -0.03768     0.04196  -0.898   0.3707
## x'Avicultura de Corte' 0.13320     0.06205   2.147   0.0336 *
## x'Avicultura de Postura' 0.03863     0.03119   1.238   0.2177
## xPescado          -0.03187     0.05250  -0.607   0.5449
## xSuinocultura     -0.01598     0.11157  -0.143   0.8863
## xlact1            0.58502     0.06341   9.225 5.09e-16 ***
## xavp1             0.03060     0.03009   1.017   0.3110
## xavc6             0.07371     0.05424   1.359   0.1765
## xbov2             -0.07026     0.04512  -1.557   0.1217
## xpes4             0.08919     0.05472   1.630   0.1055
## xpes9            -0.09059     0.05370  -1.687   0.0939 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.8391 on 135 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.5426, Adjusted R-squared:  0.5053
## F-statistic: 14.56 on 11 and 135 DF, p-value: < 2.2e-16
```

Análise dos Resíduos

```
# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.07 0.04 -0.08 0.00 0.03 0.12 -0.01 0.03 -0.06 0.05 -0.13 0.01 -0.20
## PACF 0.07 0.04 -0.09 0.02 0.04 0.10 -0.02 0.03 -0.04 0.05 -0.14 0.01 -0.19
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF   0.01 0.03 0.01 0.03 -0.02 -0.03 -0.04 -0.01 0.18 0.14
## PACF  0.03 0.05 -0.03 0.07 -0.02 0.02 -0.06 0.01 0.16 0.13
```

Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

```
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)

fit2[1]
```

```
## [[1]]
##
## z test of coefficients:
##
##      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept  0.036024   0.080495  0.4475 0.654489
## lact1      0.604999   0.060150 10.0582 < 2.2e-16 ***
## avc6       0.107164   0.049809  2.1515 0.031436 *
## pes4       0.145117   0.046861  3.0968 0.001956 **
```

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```


```
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]
```

```
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx,include.mean = FALSE)
coeftest(fit3)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## lact1 0.611972   0.058137 10.5265 < 2.2e-16 ***
## avc6  0.112091   0.048610  2.3059 0.0211138 *
## pes4  0.150462   0.045344  3.3182 0.0009059 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
checkresiduals(fit3)
```


Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors



```
##
## Ljung-Box test
```

```
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors
## Q* = 3.8077, df = 7, p-value = 0.8016
##
## Model df: 3. Total lags used: 10
```

```
acf2(fit3$residuals, main = "")
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.05 -0.01 -0.11  0.01  0.03  0.07 -0.04  0.01  0.00  0.05 -0.10  0.02 -0.2
## PACF  0.05 -0.01 -0.11  0.02  0.03  0.06 -0.04  0.02  0.01  0.03 -0.11  0.03 -0.2
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF   0.01  0.01  0.01 -0.01 -0.07 -0.10 -0.12 -0.04  0.17  0.17
## PACF   0.01  0.01 -0.03  0.02 -0.07 -0.07 -0.13 -0.04  0.16  0.17
```

Modelo do Suinocultura

Estruturando a base

```
# Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$Suinocultura, 'su1', 1)
```

```
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc6', 6)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc10', 10)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov1', 1)
df2 <- na.omit(df1)
```

Separando variável preditora e as covariáveis

```
# Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Suinocultura~.,df2)[-1]
y = df2$Suinocultura
```

Regressão classifica no contexto de Séries Temporais


Criando o modelo de Regressão Simples

```
# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ x)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.41583 -0.39128 -0.06148  0.35167  1.67796
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    0.1920512   0.0735974   2.609  0.01009 *
## xBovinocultura  0.0804015   0.0323240   2.487  0.01409 *
## x'Avicultura de Corte' 0.0242656   0.0481760   0.504  0.61530
## x'Avicultura de Postura' 0.0098311   0.0211227   0.465  0.64237
## xPescado      -0.0008281   0.0373895  -0.022  0.98236
## xLácteos       0.0338683   0.0463772   0.730  0.46649
## xsu1           0.2273228   0.0776042   2.929  0.00399 **
## xavc1           0.0865616   0.0462072   1.873  0.06318 .
## xavc6          -0.0686232   0.0384825  -1.783  0.07680 .
## xavc10          0.0625848   0.0364282   1.718  0.08808 .
## xbov1           0.0738746   0.0405940   1.820  0.07100 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.6066 on 135 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.3972, Adjusted R-squared:  0.3526
## F-statistic: 8.896 on 10 and 135 DF,  p-value: 3.949e-11
```

Análise dos Resíduos


```
# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF      0 0.25 -0.06 0.12 0.04 0.05 0.12 -0.07 -0.02 -0.03 0.08 0.06 0.08
## PACF      0 0.25 -0.06 0.07 0.08 -0.01 0.11 -0.09 -0.09 0.02 0.08 0.07 0.06
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF -0.01 0.07 -0.05 0.08 0.00 0.17 -0.04 0.01 -0.04 0.01
## PACF -0.04 0.06 -0.05 0.02 0.01 0.13 -0.03 -0.04 -0.03 -0.01
```

Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

```
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)

fit2[1]
```

```
## [[1]]
##
## z test of coefficients:
##
##              Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept      0.196715   0.062298  3.1576 0.0015905 **
```


```
## Bovinocultura 0.110931 0.024454 4.5363 5.725e-06 ***
## su1          0.293553 0.073307 4.0044 6.217e-05 ***
## avc1         0.134372 0.038667 3.4751 0.0005106 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]
```

```
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx)
coeftest(fit3)
```


```
##
## z test of coefficients:
##
##           Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## intercept    0.196715   0.062298   3.1576 0.0015905 **
## Bovinocultura 0.110931   0.024454   4.5363 5.725e-06 ***
## su1           0.293553   0.073307   4.0044 6.217e-05 ***
## avc1          0.134372   0.038667   3.4751 0.0005106 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
checkresiduals(fit3)
```



```
##
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(0,0,0) errors
## Q* = 13.432, df = 6, p-value = 0.03667
##
## Model df: 4. Total lags used: 10
```

```
acf2(fit3$residuals)
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF -0.07 0.22 -0.08 0.11 0.03 0.02 0.09 -0.08 0.00 -0.02 0.08 0.12 0.14
## PACF -0.07 0.22 -0.05 0.05 0.07 -0.02 0.09 -0.07 -0.05 0.02 0.07 0.14 0.15
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF -0.03 0.06 -0.1 0.05 -0.01 0.18 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01
## PACF -0.07 0.02 -0.1 -0.03 0.02 0.17 0.00 -0.05 -0.01 -0.04
```

```
fit4 = Arima(y,order=c(2,0,0),xreg=xx,fixed =c(0,NA,NA,NA,NA,NA))
fit4
```

```
## Series: y
## Regression with ARIMA(2,0,0) errors
##
## Coefficients:
```


```
##      ar1      ar2 intercept Bovinocultura      su1      avc1
##      0 0.2407      0.2107      0.1116 0.2485 0.1412
## s.e.  0 0.0832      0.0750      0.0235 0.0747 0.0370
##
## sigma^2 estimated as 0.36: log likelihood=-130.1
## AIC=272.2 AICc=272.81 BIC=290.11
```

```
coeftest(fit4)
```

```
##
## z test of coefficients:
##
##      Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
## ar2      0.240708   0.083246  2.8915 0.0038338 **
## intercept 0.210659   0.075006  2.8086 0.0049764 **
## Bovinocultura 0.111554 0.023545  4.7379 2.159e-06 ***
## su1      0.248548   0.074714  3.3267 0.0008789 ***
## avc1      0.141187   0.037044  3.8113 0.0001382 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
checkresiduals(fit4)
```


Residuals from Regression with ARIMA(2,0,0) errors



```
##
```

```
## Ljung-Box test
##
## data: Residuals from Regression with ARIMA(2,0,0) errors
## Q* = 4.7092, df = 4, p-value = 0.3185
##
## Model df: 6. Total lags used: 10
```

```
acf2(fit4$residuals, main = "")
```



```
##      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13]
## ACF  0.01 -0.01 -0.07 0.06 0.04 0.02 0.10 -0.08 -0.05 -0.04 0.06 0.16 0.13
## PACF 0.01 -0.01 -0.07 0.06 0.03 0.02 0.11 -0.08 -0.05 -0.03 0.03 0.16 0.15
##      [,14] [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23]
## ACF -0.03 0.02 -0.10 0.00 0.03 0.19 -0.03 -0.06 -0.04 0.01
## PACF -0.02 0.05 -0.11 -0.04 0.01 0.16 -0.01 0.00 -0.02 -0.01
```

Análise das séries temporais anuais

Análise Descritiva

```
# Análise das séries temporais anuais
head(data_anual)
```

```
## # A tibble: 6 x 7
##   Anos 'Avicultura de ~ 'Avicultura Pos~ 'Bovinocultura ~ Lácteos Pescado
##   <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2007          12.3          26.0          20.5  21.7  1.40
## 2 2008           8.33           8.27          23.7  -2.41  9.89
## 3 2009          -1.25           3.77          -3.75   4.55  7.12
## 4 2010           9.27           5.48          25.9   4.36  8.02
## 5 2011           6.21           9.15           3.67   7.51  6.61
## 6 2012          11.2          18.8           0.792   7.76  14.2
## # ... with 1 more variable: Suinocultura <dbl>
```

Análise Descritiva

```
z_avc = data_anual$'Avicultura de Corte'
z_avc = ts(z_avc)
```

```
z_avp = data_anual$'Avicultura Postura'
z_avp = ts(z_avp)
```

```
z_bov = data_anual$'Bovinocultura de corte'
z_bov = ts(z_bov)
```


```
z_lac = data_anual$'Lácteos'
z_lac = ts(z_lac)
```

```
z_pesc = data_anual$Pescado
z_pesc = ts(z_pesc)
```

```
z_suino = data_anual$Suinocultura
z_suino = ts(z_suino)
```

Análise Descritiva

```
par(mfrow = c(3,2))
plot(z_avc,main="Série Temporal da Avicultura de Corte", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_avp,main="Série Temporal da Avicultura de Postura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_lac,main="Série Temporal do Lácteos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_pesc,main="Série Temporal do Pescado", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_bov,main="Série Temporal da Bovinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_suino,main="Série Temporal da Suinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
```




Definindo variáveis do modelo

```
# Variáveis do modelo
library(glmnet)

colnames(data_anual) = c("ANO", "AVC", "AVP", "BOV", "LAC", "PESC", "SUIN")
data_anual = data_anual[, -1]
```

Regressão Lasso para Bovinocultura

```
#Correlações cruzadas da Bovinocultura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_bov, z_avc, main="Bovinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(z_bov, z_avp, main="Bovinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(z_bov, z_lac, main="Bovinocultura e Látceos")
ccf(z_bov, z_pesc, main="Bovinocultura e Pescado")
ccf(z_bov, z_suino, main="Bovinocultura e Suinocultura")
acf(z_bov, main = "ACF da Bovinocultura")
```




```
# Regressão LASSO
x = model.matrix(BOV~ .,data=data_anual)[-1]
y = data_anual$BOV

cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
```

```
##
## Call: cv.glmnet(x = x, y = y, alpha = 1)
##
## Measure: Mean-Squared Error
##
##      Lambda Index Measure      SE Nonzero
## min  3.099      9  126.5 27.39         1
## 1se  6.522      1  145.1 26.44         0
```

```
par(mfrow=c(1,1))
plot(cv.model)
```


```
coef(cv.model,cv.model$lambda.min)
```

```
## 6 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              1
## (Intercept) 6.6650367
## AVC         0.6375304
## AVP         .
## LAC         .
## PESC        .
## SUIN        .
```

Regressão Lasso para o Pescado

```
# Pescados

par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_pesc,z_avc,main="Pescado e Avicultura de Corte")
ccf(z_pesc,z_avp,main="Pescado e Avicultura de Postura")
ccf(z_pesc,z_bov,main="Pescado e Bovinocultura")
ccf(z_pesc,z_lac,main="Pescado e L cteos")
ccf(z_pesc,z_suino,main="Pescado e Suinocultura")
acf(z_pesc, main = "ACF do Pescado")
```




```
# Regressão Lasso
x = model.matrix(PESC~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$PESC

cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
```

```
##
## Call:  cv.glmnet(x = x, y = y, alpha = 1)
##
## Measure: Mean-Squared Error
##
##      Lambda Index Measure      SE Nonzero
## min  1.389     7    16.6 4.801         1
## 1se  2.427     1    17.6 5.657         0
```

```
par(mfrow=c(1,1))
plot(cv.model)
```




```
coef(cv.model,cv.model$lambda.min)
```

```
## 6 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              1
## (Intercept) 5.6022687
## AVC         .
## AVP         .
## BOV         .
## LAC         .
## SUIN        0.2385289
```

Regressão Lasso para a Avicultura de Corte

```
# Avicultura de Corte

par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_avc,z_avp,main="Avicultura de Corte e Avicultura de Postura")
ccf(z_avc,z_bov,main="Avicultura de Corte e Bovinocultura")
ccf(z_avc,z_lac,main="Avicultura de Corte e Lácteos")
ccf(z_avc,z_pesc,main="Avicultura de Corte e Pescado")
ccf(z_avc,z_suino,main="Avicultura de Corte e Suinocultura")
acf(z_avc, main = "ACF da Avicultura de Corte")
```




```
## Regressão Lasso
```

```
x = model.matrix(AVC~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$AVC
```

```
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
```

```
##
## Call:  cv.glmnet(x = x, y = y, alpha = 1)
##
## Measure: Mean-Squared Error
##
##      Lambda Index Measure      SE Nonzero
## min 0.7812   17   23.92 10.01         3
## 1se 2.6183    4   33.52 15.61         2
```

```
par(mfrow=c(1,1))
plot(cv.model)
```




```
coef(cv.model, cv.model$lambda.min)
```

```
## 6 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              1
## (Intercept) 1.2523230
## AVP         0.2569341
## BOV         0.1416239
## LAC         .
## PESC        .
## SUIN        0.1983630
```

Regressão Lasso para Avicultura de Postura

```
# Avicultura de Postura
```

```
par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_avp, z_avc, main="Avicultura de Postura e Avicultura de Corte")
ccf(z_avp, z_bov, main="Avicultura de Postura e Bovinocultura")
ccf(z_avp, z_lac, main="Avicultura de Postura e L  cteos")
ccf(z_avp, z_pesc, main="Avicultura de Postura e Pescado")
ccf(z_avp, z_suino, main="Avicultura de Postura e Suinocultura")
acf(z_avp, main = "ACF Avicultura de Postura")
```




```
# Regressão Lasso
x = model.matrix(AVP~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$AVP
```

```
par(mfrow=c(1,1))
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
```

```
##
## Call: cv.glmnet(x = x, y = y, alpha = 1)
##
## Measure: Mean-Squared Error
##
##      Lambda Index Measure      SE Nonzero
## min  2.434     9  59.28 22.80         1
## 1se  5.123     1  75.67 27.28         0
```

```
plot(cv.model)
```




```
coef(cv.model, cv.model$lambda.min)
```

```
## 6 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              1
## (Intercept) 6.3392348
## AVC         0.5007544
## BOV         .
## LAC         .
## PESC        .
## SUIN        .
```

Regressão Lasso para o Lácteos

```
# Lacteos
par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_lac, z_avc, main="Lácteos e Avicultura de Corte")
ccf(z_lac, z_avp, main="Lácteos e Avicultura de Postura")
ccf(z_lac, z_bov, main="Lácteos e Bovinocultura")
ccf(z_lac, z_pesc, main="Lácteos e Pescado")
ccf(z_lac, z_suino, main="Lácteos e Suinocultura")
acf(z_lac, main = "ACF do Lácteos")
```




```
# Regressão Lasso
x = model.matrix(LAC~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$LAC
```

```
par(mfrow=c(1,1))
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
```

```
##
## Call: cv.glmnet(x = x, y = y, alpha = 1)
##
## Measure: Mean-Squared Error
##
##      Lambda Index Measure      SE Nonzero
## min  3.015      3  112.6 60.12        1
## 1se  3.631      1  113.6 60.09        0
```

```
plot(cv.model)
```


```
coef(cv.model, cv.model$lambda.min)
```

```
## 6 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              1
## (Intercept) 6.91010603
## AVC         .
## AVP         0.07756301
## BOV         .
## PESC        .
## SUIN        .
```

Regressão Lasso para Suinocultura

```
# Suinocultura
```

```
par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_suino, z_avc, main="Suinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(z_suino, z_avp, main="Suinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(z_suino, z_bov, main="Suinocultura e Bovinocultura")
ccf(z_suino, z_lac, main="Suinocultura e Lacteos")
ccf(z_suino, z_pesc, main="Suinocultura e Pescado")
acf(z_suino, main = "ACF da Suinocultura")
```




```
# Regressão Lasso para
x = model.matrix(SUIN~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$SUIN

par(mfrow=c(1,1))
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
```

```
##
## Call: cv.glmnet(x = x, y = y, alpha = 1)
##
## Measure: Mean-Squared Error
##
##      Lambda Index Measure      SE Nonzero
## min  0.612    17  11.97 5.566         3
## 1se  1.552     7  16.69 7.763         3
```

```
plot(cv.model)
```



```
coef(cv.model, cv.model$lambda.min)
```

```
## 6 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
##              1
## (Intercept) -0.33554640
## AVC         0.21438530
## AVP         .
## BOV         0.08463707
## LAC         .
## PESC        0.55149018
```

```
# paramentros padrao para os plots
knitr::opts_chunk$set(fig.width = '\\textwidth',
  fig.align = 'center',
  out.width = "\\textwidth",
  warning = FALSE, echo = TRUE)
```

```
library(robustbase)
library(knitr)
library(stargazer)
library(tidyverse)
library(car)
library(readxl)
library(MASS)
library(gridExtra)
library(ggplot2)
```

```

library(faraway)
require(BatchGetSymbols)
require(Amelia)
require(reshape2)
require(ggthemes)
require(plyr)
library(ggplot2)

suppressMessages(library(foreign))
suppressMessages(library(dynlm))
suppressMessages(library(car))
suppressMessages(library(lmtest))
suppressMessages(library(sandwich))
suppressMessages(library(fpp2))
suppressMessages(library(tseries))
suppressMessages(library(zoo))
suppressMessages(library(forecast))
library(BETS)
library(quantmod)
library(fpp2)
library(GeneCycle)
library(randtests)
library(zoo)
library(TSA)
library(gridExtra)
library(FitAR)
library(glmnet)
library(aatsa)
library(lmtest)
data = read_xlsx("IPCA_DADOS_AGRUPADOS.xlsx", sheet = 1)
data$Data <- as.Date(data$Data)
head(data)
zt2 <- ts(data[,2], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt3 <- ts(data[,3], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt4 <- ts(data[,4], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt5 <- ts(data[,5], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt6 <- ts(data[,6], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt7 <- ts(data[,7], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt8 <- ts(data[,8], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt9 <- ts(data[,9], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt10 <- ts(data[,10], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt11 <- ts(data[,11], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)

zt12 <- ts(data[,12], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt13 <- ts(data[,13], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt14 <- ts(data[,14], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt15 <- ts(data[,15], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt16 <- ts(data[,16], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt17 <- ts(data[,17], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt18 <- ts(data[,18], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt19 <- ts(data[,19], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt20 <- ts(data[,20], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt21 <- ts(data[,21], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)

```

```

zt22 <- ts(data[,22], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt23 <- ts(data[,23], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)
zt24 <- ts(data[,24], frequency = 12, start = 2007, end = 2019)

plot(zt2,main="Série Temporal do Arroz", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
#par(mfrow = c(2, 2))
plot(zt3,main="Série Temporal de Avicultura de Corte", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt4,main="Série Temporal de Avicultura de Postura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt5,main="Série Temporal da Banana", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt6,main="Série Temporal da Batata", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

#par(mfrow = c(3, 2))

plot(zt7,main="Série Temporal da Bovinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt8,main="Série Temporal do Cacau e Produtos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt9,main="Série Temporal do Café", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt10,main="Série Temporal da Cebola", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt11,main="Série Temporal do Complexo Soja", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt12,main="Série Temporal do Complexo Sucroalc.", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

#par(mfrow = c(3, 2))

plot(zt13,main="Série Temporal do Feijão", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt14,main="Série Temporal das Frutas", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt15,main="Série Temporal das Hortículas", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt16,main="Série Temporal de Indefinido", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt17,main="Série Temporal do Laranja e Citrus", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt18,main="Série Temporal da Lácteos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

#par(mfrow = c(3, 2))

plot(zt19,main="Série Temporal da Mandioca", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt20,main="Série Temporal do Milho", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt21,main="Série Temporal do Pescado", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt22,main="Série Temporal da Suínocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt23,main="Série Temporal do Tomate", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt24,main="Série Temporal do Trigo", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
par(mfrow = c(2, 1))
plot(zt21,main="Série Temporal do Pescado", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt18,main="Série Temporal do Lácteos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
#900#650
par(mfrow = c(2, 1))
plot(zt7,main="Série Temporal da Bovinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt22,main="Série Temporal da Suínocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

par(mfrow = c(2, 1))
plot(zt3,main="Série Temporal de Avicultura de Corte", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(zt4,main="Série Temporal de Avicultura de Postura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

#Funções de Autocorrelações para Avicultura de Corte

```

```

par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt3, main="ACF Avicultura de Corte")
pacf(zt3, main="PACF Avicultura de Corte")
#Funções de Autocorrelações para Avicultura de Postura
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt4, main="ACF Avicultura de Postura")
pacf(zt4, main="PACF Avicultura de Postura")
#Funções de Autocorrelações para Suinocultura
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt22, main="ACF Suinocultura")
pacf(zt22, main="PACF Suinocultura")
#Funções de Autocorrelações para Pescado
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt21, main="ACF Pescado", lag.max = 36)
pacf(zt21, main="PACF Pescado", lag.max = 36)
#Funções de Autocorrelações para Lácteos
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt18, main="ACF Lácteos", lag.max = 48)
pacf(zt18, main="PACF Lácteos", lag.max = 48)
#Funções de Autocorrelações para Bovinocultura
par(mfrow = c(1, 2))
acf(zt7, main="ACF Bovinocultura")
pacf(zt7, main="PACF Bovinocultura")
#Correlações cruzadas da Bovinocultura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt7,zt3,main="Bovinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(zt7,zt4,main="Bovinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(zt7,zt18,main="Bovinocultura e Lácteos")
ccf(zt7,zt21,main="Bovinocultura e Pescados")
ccf(zt7,zt22,main="Bovinocultura e Suinocultura")
#Correlações cruzadas da Avicultura de Corte
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt3,zt4,main="Avicultura de Corte e Avicultura de Postura")
ccf(zt3,zt7,main="Avicultura de Corte e Bovinocultura")
ccf(zt3,zt18,main="Avicultura de Corte e Lácteos")
ccf(zt3,zt21,main="Avicultura de Corte e Pescados")
ccf(zt3,zt22,main="Avicultura de Corte e Suinocultura")

#Correlações cruzadas da Avicultura de Postura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt4,zt3,main="Avicultura de Postura e Avicultura de Corte")
ccf(zt4,zt7,main="Avicultura de Postura e Bovinocultura")
ccf(zt4,zt18,main="Avicultura de Postura e Lácteos")
ccf(zt4,zt21,main="Avicultura de Postura e Pescados")
ccf(zt4,zt22,main="Avicultura de Postura e Suinocultura")
#Correlações cruzadas dos Lácteos
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt18,zt3,main="Lácteos e Avicultura de Corte")
ccf(zt18,zt4,main="Lácteos e Avicultura de Postura ")
ccf(zt18,zt7,main="Lácteos e Bovinocultura")
ccf(zt18,zt21,main="Lácteos e Pescados")
ccf(zt18,zt22,main="Lácteos e Suinocultura")

```

```

# Correlações cruzadas dos Pescados
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt21,zt3,main="Pescados e Avicultura de Corte")
ccf(zt21,zt4,main="Pescados e Avicultura de Postura")
ccf(zt21,zt7,main="Pescados e Bovinocultura")
ccf(zt21,zt18,main="Pescados e Lácteos")
ccf(zt21,zt22,main="Pescados e Suinocultura")

#Correlações cruzadas da Suinocultura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(zt22,zt3,main="Suinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(zt22,zt4,main="Suinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(zt22,zt7,main="Suinocultura e Bovinocultura")
ccf(zt22,zt18,main="Suinocultura e Lacteos")
ccf(zt22,zt21,main="Suinocultura e Pescados")
#Essa função retorna a coluna com a lag a ser considerada na análise

funcao_lags = function(df,coluna,nome,lag){
  n = nrow(df)
  pre = rep(NA,lag)
  newcol = c(pre,coluna)
  for (k in 1:lag){
    df = rbind(df,rep(NA,ncol(df)))
  }
  df[nome] = newcol
  return (df)
}

#A função a baixo retira as variáveis do modelo em função do p-valor
tirar_variaveis = function(p,d,q,x,y){
  v = p + q + 1
  max = 0.06
  while (max > 0.05){
    model = Arima(y,order=c(p,d,q),xreg = x)
    ct = coeftest(model)
    pvalues = ct[(v+1):nrow(ct),4]
    maxi = which.max(pvalues)
    max = ct[v + maxi,4]
    if (max > 0.05) {
      x = x[,-maxi]
    }
  }
  lista = list(ct, x)
  return (lista)
}

#A seguir vamos selecionar apenas as variáveis de interesse para análise
data_cut = data[,c("Bovinocultura","Avicultura de Corte","Avicultura de Postura","Pescado","Lácteos","S
#Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$'Avicultura de Postura', 'avp9', 9)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'p3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'p10', 10)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'b1', 1)

```

```

df2 <- na.omit(df1)
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Bovinocultura~.,df2)[,-1]
y = df2$Bovinocultura
#Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

#Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
#Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)
fit2[[1]]
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx)
fit3
coeftest(fit3)
acf2(fit3$residuals)

fit4 = Arima(y,order=c(1,0,0),xreg=xx)
fit4
coeftest(fit4)
checkresiduals(fit4)
acf2(fit4$residuals)

fit5 <- tirar_variaveis(1, 0, 0, xx, y)
fit5[[1]]
xx <- fit5[2]
xx<- xx[[1]]

fit6 = Arima(y,order=c(1,0,0),xreg=xx,fixed=c(NA,NA, NA, NA))
cof.fit6 = coeftest(fit6)
cof.fit6
checkresiduals(fit6)
acf2(fit6$residuals, main = "")

#Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$'Avicultura de Corte', 'cort1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'pos12', 12)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes4', 4)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes9', 9)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Suinocultura, 'sui1', 1)

```



```

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Suinocultura, 'sui6', 6)

df2 <- na.omit(df1)
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix('Avicultura de Corte~.',df2)[,-1]
y = df2$'Avicultura de Corte'
#Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

#Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
#Seleção de variáveis
fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)
xx <- fit2[2]
xx <- xx[[1]]

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), include.mean = FALSE, xreg=xx)
fit3
coeftest(fit3)
checkresiduals(fit3)
acf2(fit3$residuals, main = "")

# Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$Pescado, 'pes1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes5', 5)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes12', 12)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'cort3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'cort8', 8)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'pos2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'pos9', 9)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov1', 1)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov7', 7)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Lácteos, 'lact2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Lácteos, 'lact8', 8)

df1 <- funcao_lags(df1, df1$Suinocultura, 'sui3', 3)

df2 <- na.omit(df1)
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Pescado~.,df2)[,-1]
y = df2$Pescado

```

```

# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1
# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
y = ts(y, frequency=12)

x = x[,-1]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-15]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-1]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-14]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-9]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-11]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-2]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-3]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-5]

```

```

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-4]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

checkresiduals(fit3)
acf2(fit3$residuals, main = "")

x = x[,-2]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

x = x[,-2]
fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0), seasonal = c(1, 0, 0),xreg=x)
coeftest(fit3)

checkresiduals(fit3)
acf2(fit3$residuals, main = "")
S

# Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$'Avicultura de Postura', 'avp1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'avp12', 12)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc5', 5)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov3', 3)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Lácteos, 'lact11', 11)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes9', 9)

df2 <- na.omit(df1)
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix('Avicultura de Postura'~.,df2)[,-1]
y = df2$'Avicultura de Postura'
# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
fit2<- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)
fit2[1]
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx)
coeftest(fit3)

```

```

checkresiduals(fit3)
acf2(fit3$residuals)

fit4 = Arima(y,order=c(3,0,0),xreg=xx,include.mean = FALSE,fixed=c(0,0,NA,NA,0,NA,NA,NA))
fit4
coeftest(fit4)
checkresiduals(fit4)
acf2(fit4$residuals, main = "")

# Estruturando a base

df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$Lácteos, 'lact1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Postura', 'avp1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc6', 6)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov2', 2)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes4', 4)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Pescado, 'pes9', 9)

df2 <- na.omit(df1)
#Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Lácteos~.,df2)[,-1]
y = df2$Lácteos
# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor
fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)

fit2[1]
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx,include.mean = FALSE)
coeftest(fit3)
checkresiduals(fit3)
acf2(fit3$residuals, main = "")

# Estruturando a base
df1<- funcao_lags(data_cut, data_cut$Suinocultura, 'su1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc1', 1)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc6', 6)
df1<- funcao_lags(df1, df1$'Avicultura de Corte', 'avc10', 10)
df1 <- funcao_lags(df1, df1$Bovinocultura, 'bov1', 1)
df2 <- na.omit(df1)
# Separando variável preditora e as covariáveis
x = model.matrix(Suinocultura~.,df2)[,-1]

```

```

y = df2$Suinocultura
# Criando o modelo de Regressão Simples
fit1 <- summary(fit <- lm(y~x))
fit1

# Análise dos Resíduos
acf2(resid(fit))
# Análise dos resíduos e seleção de variáveis de acordo com p-valor

fit2 <- tirar_variaveis(0, 0, 0, x, y)

fit2[1]
xx <- fit2[2]
xx<- xx[[1]]

fit3 = Arima(y,order=c(0,0,0),xreg=xx)
coeftest(fit3)
checkresiduals(fit3)
acf2(fit3$residuals)

fit4 = Arima(y,order=c(2,0,0),xreg=xx,fixed =c(0,NA,NA,NA,NA,NA))
fit4
coeftest(fit4)
checkresiduals(fit4)
acf2(fit4$residuals, main = "")

library(readxl)
data_anual = read_xlsx("Cadeia-Ano.xlsx")
# Análise das séries temporais anuais
head(data_anual)
# Análise Descritiva
z_avc = data_anual$'Avicultura de Corte'
z_avc = ts(z_avc)

z_avp = data_anual$'Avicultura Postura'
z_avp = ts(z_avp)

z_bov = data_anual$'Bovinocultura de corte'
z_bov = ts(z_bov)

z_lac = data_anual$'Lácteos'
z_lac = ts(z_lac)

z_pesc = data_anual$Pescado
z_pesc = ts(z_pesc)

z_suino = data_anual$Suinocultura
z_suino = ts(z_suino)
# Análise Descritiva
par(mfrow = c(3,2))
plot(z_avc,main="Série Temporal da Avicultura de Corte", xlab= "Anos", ylab="IPCA")

```

```

plot(z_avp,main="Série Temporal da Avicultura de Postura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_lac,main="Série Temporal do Látceos", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_pesc,main="Série Temporal do Pescado", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_bov,main="Série Temporal da Bovinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
plot(z_suino,main="Série Temporal da Suinocultura", xlab= "Anos", ylab="IPCA")
# Variáveis do modelo
library(glmnet)

colnames(data_anual) = c("ANO", "AVC", "AVP", "BOV", "LAC", "PESC", "SUIN")
data_anual = data_anual[,-1]

#Correlações cruzadas da Bovinocultura
par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_bov,z_avc,main="Bovinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(z_bov,z_avp,main="Bovinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(z_bov,z_lac,main="Bovinocultura e Látceos")
ccf(z_bov,z_pesc,main="Bovinocultura e Pescado")
ccf(z_bov,z_suino,main="Bovinocultura e Suinocultura")
acf(z_bov, main = "ACF da Bovinocultura")

# Regressão LASSO
x = model.matrix(BOV~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$BOV

cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
par(mfrow=c(1,1))
plot(cv.model)

coef(cv.model,cv.model$lambda.min)

# Pescados
par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_pesc,z_avc,main="Pescado e Avicultura de Corte")
ccf(z_pesc,z_avp,main="Pescado e Avicultura de Postura")
ccf(z_pesc,z_bov,main="Pescado e Bovinocultura")
ccf(z_pesc,z_lac,main="Pescado e Látceos")
ccf(z_pesc,z_suino,main="Pescado e Suinocultura")
acf(z_pesc, main = "ACF do Pescado")

# Regressão Lasso
x = model.matrix(PESC~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$PESC

cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
par(mfrow=c(1,1))
plot(cv.model)

coef(cv.model,cv.model$lambda.min)

```

```

# Avicultura de Corte

par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_avc,z_avp,main="Avicultura de Corte e Avicultura de Postura")
ccf(z_avc,z_bov,main="Avicultura de Corte e Bovinocultura")
ccf(z_avc,z_lac,main="Avicultura de Corte e Lácteos")
ccf(z_avc,z_pesc,main="Avicultura de Corte e Pescado")
ccf(z_avc,z_suino,main="Avicultura de Corte e Suinocultura")
acf(z_avc, main = "ACF da Avicultura de Corte")

## Regressão Lasso

x = model.matrix(AVC~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$AVC

cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
par(mfrow=c(1,1))
plot(cv.model)

coef(cv.model,cv.model$lambda.min)
# Avicultura de Postura

par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_avp,z_avc,main="Avicultura de Postura e Avicultura de Corte")
ccf(z_avp,z_bov,main="Avicultura de Postura e Bovinocultura")
ccf(z_avp,z_lac,main="Avicultura de Postura e Lácteos")
ccf(z_avp,z_pesc,main="Avicultura de Postura e Pescado")
ccf(z_avp,z_suino,main="Avicultura de Postura e Suinocultura")
acf(z_avp, main = "ACF Avicultura de Postura")

# Regressão Lasso

x = model.matrix(AVP~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$AVP

par(mfrow=c(1,1))
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
plot(cv.model)

coef(cv.model,cv.model$lambda.min)

# Lácteos

par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_lac,z_avc,main="Lácteos e Avicultura de Corte")
ccf(z_lac,z_avp,main="Lácteos e Avicultura de Postura")
ccf(z_lac,z_bov,main="Lácteos e Bovinocultura")
ccf(z_lac,z_pesc,main="Lácteos e Pescado")
ccf(z_lac,z_suino,main="Lácteos e Suinocultura")
acf(z_lac, main = "ACF do Lácteos")

# Regressão Lasso

```

```

x = model.matrix(LAC~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$LAC

par(mfrow=c(1,1))
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
plot(cv.model)

coef(cv.model,cv.model$lambda.min)

# Suinocultura

par(mfrow = c(3,2))
ccf(z_suino,z_avc,main="Suinocultura e Avicultura de Corte")
ccf(z_suino,z_avp,main="Suinocultura e Avicultura de Postura")
ccf(z_suino,z_bov,main="Suinocultura e Bovinocultura")
ccf(z_suino,z_lac,main="Suinocultura e Lacteos")
ccf(z_suino,z_pesc,main="Suinocultura e Pescado")
acf(z_suino, main = "ACF da Suinocultura")

# Regressão Lasso para
x = model.matrix(SUIN~ .,data=data_anual)[,-1]
y = data_anual$SUIN

par(mfrow=c(1,1))
cv.model = cv.glmnet(x,y,alpha = 1)
cv.model
plot(cv.model)

coef(cv.model,cv.model$lambda.min)

```