高等體育統計學

1

林彥光 教授

robbinlin@ntsu.edu.tw

LINE 群



目錄

- 描述資料特徵的統計量及圖表
- 基礎機率及分配、抽樣分配
- 估計及假設檢定
- 單樣本及雙樣本檢定
- 平均數檢定：多組樣本
- 兩個類別變數之檢定
- 相關和迴歸分析（一）
- 相關和迴歸分析（二）
- 多變項迴歸分析

成績計算方式

- 作業 (20%)
- 期中考、期末考 (各 35%)
- 出席 (10%)

第一章
描述資料特徵的統計量及圖表

5

關鍵字 (KEY WORDS)

- 樣本
- 平均數
- 比例
- 總數
- 眾數
- 中位數
- 全距
- 四分位距
- 標準差 (變異數)

- **描述性統計 (descriptive statistics)**：應用統計量或圖表來呈現資料的基本特徵。

- 描述性統計有別於**推論性統計 (inferential statistics)**, **推論性統計**應用有限的**樣本 (sample)** 資料去作推論。

- 例如， 由 500 位運動選手使用新舊藥的結果 (樣本)，去推論是否新的藥是否比舊的藥在治療運動傷害 (是一種**母群體， population**) 方面較有效？

- **描述性統計**則可應用於樣本資料或母群體資料的統計。

描述資料集中趨勢（CENTRAL TENDENCY）的統計量

- 資料特徵值的表達相當重要，它可以整合傳遞母群體或樣本資料所帶來的訊息，讓我們可以從這些特徵值的描述認識所研究族群的特色。

- **下面的例子是教育部體育署針對 109 年時全國各級學校整理之體育統計數據：**

“109 學年度大專院校男女合隊運動代表隊的設立項目，以設立「羽球隊」之學校最多，總計 79 隊，有 79 所學校成立，占全國大專院校學校數的 53.02%”

表一

表3-2-10 大專院校男女合隊運動代表隊設立與執行情形統計表

運動種類	運動代表隊隊數	設有運動代表隊校數	占全國百分比（N=149）	各運動代表隊總人數	平均每週練習次數
羽球	79	79	53.02%	1,660	2.65
田徑	78	78	52.35%	899	3.11
桌球	67	67	44.97%	1,303	2.8
游泳	61	61	40.94%	881	3.02
網球	54	54	36.24%	785	2.73
跆拳道(含品勢競賽)	38	38	25.50%	400	2.66
柔道	26	26	17.45%	331	2.83
空手道	22	22	14.77%	157	2.6
競技啦啦隊	20	20	13.42%	363	3.1
擊劍	19	19	12.75%	182	2.35
木球	19	19	12.75%	206	2.8
射箭	18	18	12.08%	232	3.31
保齡球	17	17	11.41%	275	3.12
撞球	15	15	10.07%	153	2.59
國武術(含長拳、南拳、內家拳、八極拳、螳螂拳、洪拳等各家拳套、散打)	15	15	10.07%	218	2.19
軟式網球	13	13	8.72%	182	2.69
慢速壘球	13	13	8.72%	320	2.82
高爾夫球	12	12	8.05%	151	2.93
橄欖球	11	11	7.38%	285	2.91
拳擊	10	10	6.71%	120	3.35

註 1：占全國百分比 ＝ 設有運動代表隊校數 ÷ 全國大專院校學校總數。

註 2：自 103 學年度起，本表統計乃呈現運動代表隊總數排序前 20 項之運動種類，遇同樣隊數則同時列於表中，其餘各分類運動種類請參閱附錄。

- 這些統計結果陳述了一些特徵值，包括:
  - 比例 (例如羽球代表隊個數為79, 比例為53.02%，拳擊個數為10, **比例**為6.71%)。
  - 平均數 (例如羽球平均練習次數為2.65)。

  - 這些數都是描述性統計方法中經常使用的特徵數。這些統計數除了讓我們很快可以掌握資料的特質外，也可以讓我們比較時使用。例如羽球隊數與拳擊隊數數相比較約為7.9(53.02% ÷ 6.71%) 比1。

以下是以圖形來表達資料的集中特徵。是種**長條圖 (bar chart)**，顯示全台國高中職生的每天感到壓力大的時間集中於




圖 1: 高中職受壓力的時間

圖 1 的資料中，假如要使用一個數值來代表感受壓力時間的話，使用平均年數 (計算方式如下) ：

1.31=(0.5×1525+1.5×527+2.5×242+3.5×109+4.5×196)÷(1525+527+242+109+196);

公式 =(∑xf)/(∑f)

x 代表資料組的中位數
f 是此資料發生的次數

資料來源 :https://health.setn.com/news/118774

- 若資料是像圖 1 的區間資料，則 x 是取區間的 " 中間值 " 是一種理想的做法。

- 使用 " 眾數 (mode)" 也是另一種做法；眾數是資料中出現最多次的數值。

- 以圖 1 來看，雖然我們看不到原始數據，但我們知道感受壓力時間的長度最多在 <1 小時。因此，我通常取 (0-1)/2=0.5 年為眾數，我們的解釋是：最多人受壓力的時間集中於 0-1 小時 (或 0.5 小時附近) 。


中位數 (median) 是統計方法中另一種用來描述資料集中趨勢的統計量。

- 若是我們將資料依大小排序，資料數值在中間的數即是中位數，因此我們知道有 50% 的資料其數值大 (小) 於中位數。
- 數列 1,3,9,13,27 中位數為 9
- 數列 1,3,9,13,27,31 中位數為 (9+13)/2=11

- 表 2 中報告受雇勞工在於 2009-2016 年時薪資的平均數和中位數。

表 2　受雇勞工在於 2009-2016 年時薪資的平均數和中位數

單位：元



近10年總薪資中位數及平均數

年度	中位數		平均數	
	金額(萬元)	年增率(%)	金額(萬元)	年增率(%)
2013	44.4	0.28	55.4	0.14
2014	45.4	2.42	57.4	3.59
2015	46.3	1.84	58.8	2.49
2016	46.4	0.39	59.1	0.49
2017	47.4	2.00	60.6	2.46
2018	49.0	3.52	62.9	3.82
2019	49.7	1.30	64.1	2.00
2020	50.1	0.82	65.0	1.32
2021	50.6	1.00	67.0	3.02
2022	**51.8**	**2.37**	**69.3**	**3.44**

資料來源：主計總處　　製表：記者鄭琪芳

較高

這二種集中趨勢的統計量各有其代表的意義，但我們發現一個有趣的現象：

- 薪資的平均數全部薪資的中位數。這是因為受雇勞工在低薪的人比較多，在高薪的人較少，表示我國薪資水準是有待加強的。

- 若是薪資中位數高於平均數，則表示得高薪的比例相對較高，整體待遇優良。

- 若是所有的資料值都是相同時，則分散程度應為零；若是資料間差異程度越大，則我們分散度應該越大。統計分析上我們用不同的方式來表達資料間的分散程度。
- 全距 (range)： 資料中最大值和最小值的差異量。

- **四分位距 (interquartile rang ， IQR)**： 四分位距是第三個四分位數 (Q_3) 和第一個四分位數 (Q_1) 的差異量 (Q_3- Q_1) ，而第一 (三) 個四分位數則是中位數以下 (上) 所有資料的 " 中位數 " 。全體資料本身的中位數又稱為第二個四分位數 (Q_2) 。 IQR 只表達了中間 50% 資料的 " 全距 " 。

- **標準差(standard deviation) :**

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2}$$

- 標準差的平方稱為**變異數(variance)**，假如我們用平均數$\bar{x}$表示資料的集中趨勢，則任一資料 x 和集中趨勢值 $\bar{x}$ 間變異的平方為$(x-\bar{x})^2$ ，而變異數就是這些變異平方的平均：$\Sigma(x-\bar{x})^2 / \Sigma f$ 。
- 若是資料為母體全部的資料則變異數以 σ^2 表達；若資料僅是樣本資料，則變異數公式中的分母改為 $(\sum f)-1$ ，而(樣本)變異數(標準差)改以 S^2 (S)表達。
- 由於我們經常無法觀察到全體的資料，我們會應用樣本資料去計算 S^2 ，並用 S^2 去代表不知道的 "參數" σ^2 ，且稱 S^2 是參數σ^2的一種"估計"。

- 樣本平均數 $\bar{x}$ 和樣本標準差 S 經常搭配在一起使用，前者表達資料的集中趨勢，後者則表示資料間分散差異的程度。

- 理論顯示, 在”常態” 的母體資料下，我們發現 “約有95%母體資料會落在$\bar{x} \pm 1.96S$ 的範圍內”. 因此, 即使我們沒有母群體的所有資料,我們仍然可以使用$\bar{x}$和S分別來表示母群體資料的集中趨勢及分散程度。

- 由以上的討論來看，在計算三種資料的分散度：全距，四分位距，或標準差時，我們首先必須將資料排序，加總或相減，因此，**量性**的資料較適合 。

- 連續型的量性資料都可以應用於所有分散度的計算，但**通常，$\bar{x}$和S搭檔使用，中位數(Q_2)則和IQR(或全距)搭檔使用**。


特徵值的計算及圖表製作

- 統計量的計算或圖表的製作經常必須借由統計軟體的應用來完成．本書所有的分析和圖表全部使用 SPSS 完成。請參考網址：
- https://www.ibm.com/tw-zh/products/spss-statistics/base。
- 學生需要使用 spss 軟體，請使用 myapp 系統，路徑：資訊中心首頁 - 最下方 / 教學服務 /myapp/ ，依說明作業即可
- 國體首頁 -> 在校學生 ->APP 雲端軟體 ->SPSS 20

在資料檔（sport injury) 上傳到 SPSS 後， 以點選方式選用路徑：” 分析方法 摘要統計”

- **步驟一 檔案開啟**

出現“使用者名稱的 C 槽與 D 槽”



- **步驟二分析 -> 次數分配表**：
  - 選擇變數：AGE(年齡)， SURVIVAL_MONTHS(存活時間)
- **統計量：**平均數、中位數、眾數、變異數、標準差
- **開始分析**

特徵值統計（不包含遺失值）：


統計量

		AGE	SURVIVAL_MONTHS
個數	有效的	478	469
	遺漏值	0	9
平均數		64.44	51.78
中位數		65.00	45.80
眾數		62	40
標準差		10.090	35.771
變異數		101.798	1279.553
總和		30802	24286
百分位數	25	58.00	23.10
	50	65.00	45.80
	75	72.00	73.20

盒鬚圖 (BOX AND WHISKER PLOT)

圖表繪製 盒鬚圖 (Box and Whisker Plot)

- **步驟一** 統計圖（圖表建立器）
- **步驟二** 選擇盒形圖拖拉至預覽區
- **步驟三** 拖拉 SITE 至 X 軸， SURVIVAL_MONTHS 至 Y 軸
- **步驟四 確定**則得以存活時間為分析變數，研究地點為分類變數的盒鬚圖。


簡易盒形圖 / SURVIVAL_MONTHS 依據 SITE
SURVIVAL_MONTHS
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
.00
427
296
338
421
403
A
B
C
D
SITE

- **盒鬚圖**又稱為箱型圖，是一種檢視（比較）資料分散程度時相當實用的一種統計圖。

- 盒鬚圖中會顯示資料的最大值、最小值、中位數、第一四分位以及第三四分位數等統計量。

- 盒子的下界高度為 Q1 ，中線高度為 Q2 ，上界高度為 Q3 ，因此盒子的長為 IQR 。

- 最高實線的高度是資料中小於 (Q3+1.5xIQR) 的最大數值，又稱為上端點值；最低實線的高度是資料中大於 (Q1-1.5xIQR) 的最小數值，又稱為下端點值。

- 連結上下端點的線稱為“鬚線”。在“常態”母群體的資料下 (Q1-1.5xIQR) 和 (Q3+1.5xIQR) 的範圍內包含 99% 以上的資料量，因此鬚線以外的資料通常以“o”表示，稱為界外資料 (outlier)。


- 樣本資料若排除界外資料，則剩餘資料的全距就是鬚線的長度！

直方圖 (HISTOGRAM)

圖表繪製 直方圖依照以下路徑：

- **步驟一 分析 -> 敘述統計**
- **步驟二 選擇變數**：SURVIVAL_MONTHS
- **步驟三 圖表**： 直方圖

直方圖是一種將連續型數值資料分組後，依各組次數分配或相對次數分配數據以長方形矩形連接而成的統計圖，可以了解資料大小分配比例的情形，也可以知道眾數的位置。



直方圖
平均值 = 51.78
標準差= 35.771
N = 469
頻率
50
40
30
20
10
0
.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
SURVIVAL_MONTHS

長條圖

圖表繪製 長條圖 **(Bar Chart)**，依照以下路徑：

- **步驟一** 統計圖（圖表建立器）
- **步驟二** 選擇堆疊長條圖拖拉至預覽區
- **步驟三** 拖拉 SITE 至 X 軸， gender 至色彩
- **步驟四 確定**則得以 Site 為 X 軸， gender 為堆疊類別的直方圖。

長條圖的功能和直方圖類似，用於表現類別資料之次數分佈情形。選定繪製長條圖的變數後，以長條狀圖形表示各組次數分配情形，長條圖表示法中各長方矩形不相連。



堆疊長條圖 計數 / SITE 依據 gender
gender
0
1
200
150
100
50
0
計數
A
B
C
D
SITE

2D 散佈圖

最後是 2D 的散佈圖 (Scatter Plot). 將兩個可能相關之數值變數分別置於座標圖上的 X 與 Y 軸，用圖點標示各資料點的位置，可初步觀察兩變數間的相關性。

圖表繪製 散佈圖 ， 2D 散佈圖之路徑為：

- **步驟一** 統計圖（圖表建立器）
- **步驟二** 選擇組別散佈圖拖拉至預覽區
- **步驟三** 拖拉 Age 至 X 軸， survival month 至 Y 軸， rank 至色彩
- **步驟四 確定**則得以 Age 為 X 軸， survival month 至 Y 軸的散佈圖。


組別散佈圖 / SURVIVAL_MONTHS 依據 AGE 依據 Rank
Rank
0
1
2
SURVIVAL_MONTHS
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
.00
30
40
50
60
70
80
90
AGE

作業

1. Adult income 資料檔中包含 1994 年美國薪資普查資料。

(1) 請計算薪資及年紀的平均數，中位數，變異數及 IQR 。

(2) 接續第 (1) 小題，請分別以男女的結果呈現。

(3) 接續第 (1) 小題，請針對薪資小於平均數以下的民眾，計算他們年紀的平均數，中位數，變異數及 IQR 。

2. 資料總結的五數（five-number summary）通常以極小、極大數、中位數、第一和第三個四分位數來表達。由五數的結構我們通常可以約略的認識資料 " 分佈 " 的狀態。使用 CVD_All 的資料， (1) 計算收縮壓資料的五個總結數； (2) 計算空腹血糖資料的五個總結數；(3) 計算三酸甘油酯資料的五個總結數；(4) 前面五個總結數，以男女分別呈現；

3. 請使用盒鬚圖，探討收縮壓資料男女資料分散程度的差異性。

4. 接續第 2 個題目中的資料，

(1) 請畫出收縮壓資料的直方圖，

(2) 請畫出舒張壓資料的直方圖，

(3) 請比較前面二個直方圖，並列出結論？

5. 接續第 2 個題目中的資料，請針對收縮壓及舒張壓，畫出 2D 的散佈圖，並探討二個變數間的相關性。

參考資料

- 本章節使用之資料檔檔名：
  - sport injury,
  - adult income
  - CVD_all

- 資料下載連結：
  - https://bit.ly/3sBNc9Z
  - https://bit.ly/3ZaIFrj
  - https://bit.ly/3PdcwL8


恭喜完成第一章！