

Se recomienda que las directrices enunciadas en estas instrucciones sean seguidas totalmente por el (los) autor(es), de acuerdo con el siguiente modelo:

**Modelo de formato de trabajo que se remitirá a la RBS:**

(Título resumido) Armazenamento de sementes de açaí

Conservação de sementes de açaí (*Euterpe oleracea* Mart.)<sup>1</sup>

Walnice Maria Oliveira do Nascimento<sup>2\*</sup>, Sílvio Moure Cicero<sup>3</sup>, Ana Dionísia Luz Coelho  
Novembre<sup>3</sup>

RESUMO – texto (200 palavras)

Termos para indexação:

Conservaciones de semillas de *Euterpe oleracea*

Resumen – texto (200 palabras)

Términos de indexación:

-----  
<sup>1</sup> Enviado en \_\_\_\_\_. Aceptado para publicación en \_\_\_\_\_.

<sup>2</sup> Embrapa Amazônia Oriental, Caixa Postal 48, 66095-100 – Belém, PA, Brasil.

<sup>3</sup> Departamento de Produção Vegetal, USP/ESALQ, Caixa Postal 9, 13418-900 – Piracicaba, SP, Brasil.

\* Autor correspondiente <[walnice@cpatu.embrapa.br](mailto:walnice@cpatu.embrapa.br)>

**Introducción**

texto

**Material y Métodos**

texto

**Resultados y Discusión**

texto

**Conclusiones**

texto

**Agradecimientos (opcional)**

texto

**Referências**

(empezar em uma página aparte)

Sigla la ABNT NBR6023 como se menciona en la sección Referencias.

Modelo para la presentación de la tabla

Tabla 1. Relación entre la calidad de la semilla.v.densidad de siembra.en la.emergencia de las plântulas y el índice de tasa de aparición de campo em maíz BRS 201.

Qualidade de semente (%)	Número de sementes.ha <sup>-1</sup> (1000)					
	50		60		70	
	Emergência (%)	IVE	Emergência (%)	IVE	Emergência (%)	IVE
Q1 (95.0)	94.8 a*	13.3 a*	95.1 a*	13.4 a*	97.0 a*	13.6 a*
Q2 (90.0)	95.6 a	13.5 a	95.1 a	13.0 a	96.0 a	13.2 a
Q3 (85.0)	84.2 b	10.9 b	83.7 b	10.6 b	82.0 b	10.7 b
Q4 (75.0)	72.3 c	9.4 c	76.2 c	9.6 c	74.4 c	9.5 c
Média	86.7	11.8	87.5	11.6	87.4	11.8

Promedios dentro de cada columna seguidos por la misma letra no difieren en la prueba de Duncan al 5% de probabilidad.

Modelo para la presentación de la figura




Figura 1. La germinación de las semillas de pimienta extrae de las frutas cosechadas em 40, 50, 60 y 70 DAA y almacenada por 0, 3, 6, 9, 12 y 15 días.