
dipole projected on the full-sample direction
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
count slope x of the W1 bin
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
spectral index α of the W1−W2 bin
x=1.23
x=1.62
x=2.38
kinematic, $\beta_{\rm CMB}$ (M0): χ^2 = 48.5
kinematic, $\vec{\beta}$ free (M1b): χ^2 = 17.3
$\beta_{\rm CMB}$ + hippopede, reference (M2): χ^2 = 19.4
β free + hippopede, reference (M3): χ^2 = 19.4
$\beta_{\rm CMB}$ + constant vector (M4): χ^2 = 17.0
CatWISE subsamples
kinematic, $\beta_{\rm CMB}$ (M0): χ^2 = 87.9
kinematic, $\vec{\beta}$ free (M1b): χ^2 = 54.2
$\beta_{\rm CMB}$ + hippopede, reference (M2): χ^2 = 35.8
β free + hippopede, reference (M3): χ^2 = 33.6
$\beta_{\rm CMB}$ + constant vector (M4): χ^2 = 53.3
CatWISE subsamples