

**Dados de identificação do paciente**

Nome: Pedro Paulo

Data de nascimento: 10/ 01/2006

Idade: 4 anos

Mãe: Maria de Fátima

Procedência: Recife – PE

Informante: a genitora

**Queixa principal e duração:** Diarréia desde os 4 meses de vida.

**HDA:** A genitora informa que desde os 4 meses de idade a criança apresenta episódios de diarréia, com fezes ora líquidas, ora pastosas, cerca de 5 episódios ao dia. Algumas vezes vem acompanhada de sangue vivo, cerca de uma colher de chá, mas sempre tem muco. Fica alguns períodos sem diarréia, geralmente quando faz modificações das fórmulas lácteas, mas após 2 a 3 semanas do consumo da fórmula, volta a apresentar diarréia. No momento, esporadicamente apresenta diarréia, às vezes com raios de sangue, o que deixa a mãe preocupada.

**Doenças anteriores:** resfriados; 3 otites; 5 pneumonias; pele sempre ressecada, necessitando pomadas com frequência.

**Internamentos anteriores:** 3 internamentos por pneumonia.

**Preenchimento no sistema SAE****Cadastro do paciente**

NOME	Pedro Paulo
DATA DE NASCIMENTO	10/01/2005
IDADE	4 anos
MÃE	Maria de Fátima
PROCEDÊNCIA	Recife - PE
INFORMANTE	a genitora

**Admissão/Anamnese**

MOTIVO DA INTERNAÇÃO	Diarréia desde os 4 meses de vida
TRATAMENTOS ANTERIORES	3 internamentos por pneumonia
DOENÇAS DA INFÂNCIA	Resfriados; 3 otites; 5 pneumonias; pele sempre ressecada, necessitando pomadas com frequência
ELIMINAÇÃO INTESTINAL	Diarréia
ALTERAÇÕES	Fezes líquidas e pastosas

**Fenômenos/Intervenções e Metas**

FENÔMENO	Diarréia 1.1.1.1.1.8.1.1.1
JULGAMENTO	(Intensa) Alto

TEMPO	Freqüente (5vezes ao dia) 2.F. -1.7 (regularmente)
LOCALIZAÇÃO	Cavidade abdominal 2.E. -1.1.22.
CLIENTE	Criança 2.B. -2.-4.1.6.
META	Normalizar fezes 2.A. -2.1.2.1.2.1. (equilibrar, normalizar)
INTERVENÇÕES	Motivar (Ingesta hídrica) 2.A.-4.1.3.2 Comunicar (Sobre uso de fórmulas lácteas) 2.A. -4.4.1. Instruir (Quanto a utilização de soro caseiro) 2.A. -5.1.1.

FENÔMENO	Desequilíbrio de líquidos e eletrólitos 1.1.1.1.6. (problemas com hidratação)
JULGAMENTO	Parcial
TEMPO	Freqüente 2.F. -1.7 (regularmente)
LOCALIZAÇÃO	Componente do sistema corporal 2.E.-1. (localização anatômica)
CLIENTE	Criança 2.B. -2.-4.1.6.
META	Equilibrar o Desequilíbrio hidroeletrólítico 2.A. -2.1.2.1.2.1. (equilibrar)
INTERVENÇÕES	Motivar (Quanto ao aumento de ingestão hídrica) 2.A.-4.1.3.2 Instruir (Quanto a utilização de soro caseiro) 2.A. -5.1.1. Observar (e anotar aceitação da dieta) 2.A.-1

FENÔMENO	Desidratação 1.1.1.1.6.1
JULGAMENTO	Parcial
TEMPO	Freqüente 2.F. -1.7 (regularmente)
LOCALIZAÇÃO	Componente do sistema corporal 2.E.-1. (localização anatômica)
CLIENTE	Criança 2.B. -2.-4.1.6.
META	Eliminar Desidratação (2.A. -2.1.2.1.4.2. suprimindo)
INTERVENÇÕES	Verificar (Sinais vitais) 2.A. -1.2.5. Regular (Balanço hídrico) 2.A. -2.1.2.1. Motivar (Quanto ao aumento de ingestão hídrica) 2.A.-4.1.3.2 Registrar os episódios diarreicos (fazer reposição de líquidos) 2.A. -5.3.1.

FENÔMENO	Risco para infecção (História de 3 episódios de Otite) 10010104
JULGAMENTO	Interrompido
TEMPO	Algumas vezes 2.F. -1.8 (ocasionalmente)
LOCALIZAÇÃO	Ouvido 2.E. -1.1.6.
CLIENTE	Criança 2.B. -2.-4.1.6.
META	Diminuir risco para infecção 2.A.-2.1.2.1.1.3.
INTERVENÇÕES	Medida de segurança (Evitar banhos de imersão) 2.A. -4.3.2. Observar comportamento (Irritab., sensação dol.pressão tragus) 2.A.-1 Verificar (Febre alta) 2.A. -1.2.5.