

De -1000 à -2000 mètres

Par Philippe Marti

Comme vous avez pu le lire dans le dernier numéro d'Hypogées, ça y est, on a dépassé les 2000 mètres de dénivelé pour une cavité. Ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que celle-ci n'a pour l'instant qu'une seule entrée. Cette découverte est l'occasion rêvée de revenir un peu sur l'histoire de cette course au record de profondeur. En 1955 était publié un ouvrage racontant les expéditions qui visaient les 1000 mètres de dénivelé au gouffre Berger (réf. 1). Les explorateurs n'y arrivèrent pas dans le cadre du récit de cette aventure, où ils n'arrivèrent que jusqu'à -903 mètres. En 1955, lors de l'expédition suivante, ils arrivent à -985 mètres et c'est en 1956 qu'ils dépassèrent la cote mythique pour atteindre 1122 mètres de dénivelé. En 1966, avec la jonction du gouffre de la Tête Sauvage, le réseau de la Pierre St-Martin arrive à -1167 mètres et bat le gouffre Berger (réf. 2). En 1975, de nouvelles jonctions portent la profondeur du réseau à -1321 m. En 1979, le groupe spéléologique Vulcain de Lyon bat ce record de 26 mètres dans le gouffre Jean-Bernard, sur la commune de Samoëns. Depuis ce moment et jusqu'en 1991, les Vulcain ne cessent d'augmenter ce résultat pour finalement atteindre les 1602 mètres de dénivelé (réf. 3). Le gouffre Mirollda, lui, est passé à la cote -1610 mètres pendant l'hiver 1998, puis quelques mois plus tard le gouffre autrichien le distance de quelques mètres. En 2001 c'est le gouffre Krubera-Voronja qui passe en tête, dans le massif Arabika dans le Caucase de l'Ouest. Ce gouffre connu depuis les années 80 s'arrêtait à -340 m. En trois années



Photo © G. Favre

La galerie Hasselblad du Mirollda.

successives, il a atteint les 1710 mètres de profondeur. En 2003, le gouffre Mirollda récupère son titre en arrivant plus de 23 mètres plus bas avec la cote de -1733 mètres (réf. 4). Partis pour plonger le siphon qui les avait arrêtés en 1998, les explorateurs le trouvant à sec ont fini par plonger un siphon bien plus bas. Mais c'est le gouffre Krubera qui va rapidement reprendre la place de n° 1 avec une expédition en août 2004 qui atteint la cote de -1840 mètres et enfin une expédition en octobre 2004 qui atteint la cote de -2140 mètres (réf. 5). Ces presque 350 mètres d'écart entre le n° 1 et le n° 2 peuvent laisser présager qu'il ne sera pas battu de sitôt. Mais le groupe ukrainien d'exploration du Krubera a d'autres projets en tête qui visent eux aussi de dépasser les 2000 mètres de dénivelé.

Depuis 1956, beaucoup de gouffres ont atteint et dépassé la profondeur de 1000 mètres dans un peu tous les coins du monde. Sur la «World Cave Database» tenue par Eric Madelaine, on compte aujourd'hui 75 cavités qui ont dépassé la cote des -1000 m (réf. 6). Cette base de donnée, qui enregistre tous les gouffres de plus de 300 mètres de dénivelé, compte plus de 1200 cavités. Il faut aussi tenir compte du fait qu'elle est basée sur des topographies publiées, elle a donc un certain retard sur l'actualité exploratoire des cavités. D'ailleurs le gouffre Krubera est toujours indiqué à -1823 mètres. Pourtant ce gouffre a fait récemment l'objet d'un article dans National Géographique (réf. 7). Cette liste donne déjà une bonne ampleur de la tâche extraordinaire réalisée par les spéléologues. La difficulté de leur exploration fait que la majeure partie de ces gouffres se trouve en Europe, avec 54 cavités sur les 75. De nombreuses sociétés sont, comme




Photo © G. Favre

Le massif du Criou dans lequel se développe le Gouffre Mirollda.

Europe: 54	Afrique: 1	Amérique du Nord: 1	Amérique du Sud: 9	Asie: 8
Autriche: 15	Algérie: 1	Etats-Unis: 1	Mexique: 8	Géorgie: 7
Croatie: 2			Nouvelle Guinée: 1	Ouzbékistan: 1
Espagne: 15				
France: 7				
Grèce: 1				
Italie: 8				
Slovénie: 5				
Suisse: 2				

Tableau 1: Les -1000 dans le monde.


nous, à la recherche du prochain gouffre qui fera partie de cette magnifique liste. L'observation des zones karstiques planétaires nous montre bien évidemment que nous avons encore bien du travail. L'Asie, avec les karsts de Chine, aura certainement autant de cavités dépassant la cote des -1000 m que l'Europe.

Une seule ombre au tableau, certains ont mis en doute les cotes du gouffre Jean-Bernard et du gouffre Mirollda. Pour le gouffre Mirollda, la théorie qui a été avancée est qu'il ne pouvait simplement

pour le gouffre Mirollda, c'est la cote retenue par les listes espagnoles (réf. 9) et américaines (réf. 10) des gouffres les plus profonds du monde. Ce qui différencie pourtant le scientifique des autres personnes est justement sa capacité à remettre constamment en doute les modèles existants. La seule façon de lever ce doute aujourd'hui serait de refaire la topographie et je ne pense malheureusement pas que l'auteur soit prêt ni à la refaire, ni à la financer. Ah, quand la science dérape... Pour finir sur une touche d'optimisme, nous pouvons dire que bientôt, il y aura bien des -2000 mètres à rajouter sur la liste et qu'elle dépassera certainement bientôt les 100 cavités. Et puis qui sait quand nous passerons la cote des -3000 m? Est-ce que cette cote sera encore atteinte sur terre sur les flancs calcaires de l'Himalaya ou dans un tube de lave du volcan d'Olympus Mons sur Mars?

Références :

1. Cadoux J., Lavigne J., Mathieu G., Potié L. (1955) Opération -1000. Réédition aux Editions Jean Laffite (1993), 263 p.
2. Boulanger P. (1966) Grottes et abîmes: ou les ténèbres conquises. Nouvelles Editions Latines édit., 224 p.
3. Groupe spéléologique Vulcain (1991) Le gouffre Jean-Bernard -1602 m. Editions Gap, 271p.
4. Philips M. (2003) Haute-Savoie: -1733 m, nouveau record de profondeur. Le Mirollda rafle la mise. Spéléo, 43, 12-13.
5. Klimchouk A., Kasjan Y. et Solovjev N. (2005) Krubera Cave (-2080 m): dernières nouvelles. Spéléo, 50, 5.
6. <http://www-sop.inria.fr/agos-sophia/sis/DB/database.html>
7. Klimchouk A. (2005) Au coeur des abîmes. National Geographic France, mai 2005, 68, 76-88.
8. <http://www.secja.com/desniv.htm>
9. <http://www.pipeline.com/%7Ecaverbob/wdeep.htm>
10. Beaudoin, J.-P. (2003) Quelques réflexions sur la profondeur du gouffre Mirollda. Spéléoscope, 22, 20-22.



Olympus Mons: Le plus grand volcan de Mars, il mesure 27 km de haut.

pas avoir dépassé la zone noyée de la vallée (réf. 8). Ce qui est malheureux dans cette histoire c'est que l'auteur y a associé des chiffres qui sont différents d'une centaine de mètres et que c'est trop pour une erreur topographique. Dans le livre sur le Jean-Bernard, un paragraphe est consacré à l'erreur topographique, où celle-ci est estimée à un pour cent. La spéléologie a pourtant maintes fois révolutionné certaines théories géologiques régionales et je ne pense pas que cela va s'arrêter. Ce qui est vraiment dommage, c'est que