

LE CRIOU

MIROLDA 80 - 81

SITUATION

Situé à 1880 m. d'altitude dans le massif du Criou, sur le territoire de la commune de Samoëns, le gouffre Mirolda était voici trois ans encore un illustre inconnu, recensé par ses premiers inventeurs sous le matricule CD 11. En moins de deux ans, il fut possible de passer de la cote -127 à la profondeur de -1100 m., ce qui le place parmi les plus profonds gouffres connus.

HISTORIQUE

Depuis de nombreuses années déjà, la dalle calcaire inclinée du Criou a attiré les regards, et nombreux sont les groupes à avoir prospecté cette surface prometteuse de 10 Km².

Nous ne parlerons ici que de l'exploration du gouffre Mirolda et prions les personnes intéressées par les autres cavités de se référer aux précédents numéros de Spéléalpes et aux revues régionales.

En 1973, le groupe AVEN prospecte systématiquement la zone située directement au dessus des chalets du Criou et trouve plusieurs cavités dans le vallon montant en direction de la Tête du Fer à Cheval (CD 5-3-2-6-10-11, etc.). L'une d'elles, le CD 11, débite un violent courant d'air. Après un méandre assez "rasqueux" les premiers puits sont atteints (P 10-P 25-P 15- P 10), mais la suite n'est pas trouvée et le fond provisoire cote alors -127.

En 1980, le S.C.L. (Spéléo Club de Lyon) et le S.C.C. (Spéléo Club du Chablais) reprennent ensemble le CD 11 et trouvent la suite par un passage supérieur en haut de puits, et c'est le début de la nouvelle exploration qui va conduire les membres du S.C.L. à -1100 m.

Les membres de la S.S.G. (Société Spéléologique de Genève) vont alors collaborer avec le S.S.C. pour l'explo et la topo du réseau décrit ci-dessous.

Dans l'impossibilité d'obtenir la topo de la première partie du gouffre, malgré les demandes réitérées à nos collègues lyonnais, nous avons tout d'abord du refaire la topo de plusieurs tronçons. A partir du "carrefour" nos chemins se séparent : tandis que les lyonnais descendent sur faille, nous recoupons à moins de 3 m. du "carrefour" une galerie fossile qui va descendre jusqu'à -370 par ressauts et petits puits (topo du S.C.L. non communiquée à ce jour).

De retour dans cette branche colmatée à -370, nous "sentons" vers -200 un départ très aérien dans le haut d'un puits. La disparition du courant d'air à partir de ce puits nous aidera dans nos recherches. Après deux séances de spitage une main courante est posée et la suite est trouvée. Une galerie fossile de grande dimension permet de remonter de 60 m. en altitude, puis de redescendre à nouveau pour atteindre le terminus actuel vers -250 (explo en cours 82) après avoir recoupé de nombreux méandres actifs et ramifications. Cette partie du réseau développe actuellement un peu moins d'un kilomètre, mais bien plus importantes sont

les informations contenues dans ces galeries pour un début de compréhension spéléogénétique du système.

CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL, LOCAL-MORPHOLOGIE-ÉCOULEMENTS :

Ne se rattachant tectoniquement pas aux autres massifs calcaires avoisinants, le plateau incliné ou "l'écaille" du Criou, constitué par une dalle de calcaire barrémien ("urgonien"), doit être considéré comme un système spéléogénétique à part entière. Malgré son aspect uniforme, l'ensemble est affecté par de nombreuses failles qui localement vont influencer la formation des réseaux.

Le Criou est l'un des rares bassins karstiques du Haut Giffre dont les émergences demeurent inconnues.

A l'instar d'autres systèmes du même type, les écoulements passent directement de la nappe "karstique" noyée à la nappe "alluviale" de la plaine des Vallons pour s'écouler de façon diffuse dans le Giffre au sud de Samoëns.

Il n'est donc pas possible de descendre dans les calcaires à une altitude légèrement inférieure à celle des hameaux des Vallons en fonction du niveau de la nappe alluviale du Giffre. Au sein du massif l'écoulement est actuellement vadose.

Compte tenu de la disposition "en éventail" du massif et surtout de son passé structural, il est très probable que plusieurs collecteurs ou axes de drainage se côtoient.

Le Mirollda débute quant à lui dans "l'urgonien", mais à partir du "carrefour", une faille importante a porté les bancs calcaires et marno-calcaires du Sénonien (crétacé supérieur = plus jeune) à cette profondeur. Comme le plan de cette faille approche localement un plan oblique ou horizontal, nous avons dans cette partie supérieure du réseau la situation originale et peu courante des plafonds de galeries formés de roches plus anciennes que le sol (situation identique au Désert de Platé dans la grotte de la Barre Froide : sénonien sur urgonien). Cette situation détermine également un profil de galerie par endroits peu habituel et il est difficile de dire quelles furent dans l'ordre les directions et types d'écoulements. Nombreuses ont été les phases de creusement, de comblage et de concrétionnement, et dans le détail la situation est complexe. Certaines galeries de section arrondie ou elliptique et de direction approximative Nord-Sud sont certainement les plus anciennement formées sous condition phréatique, mais après avoir subi la période glaciaire et inter-glaciaire, les réennoyements du réseau ont provoqué des courants en sens inverse (creusement de bas en haut attesté par les "coups de gouge" dans la galerie du chenal de voûte). Suivit une phase beaucoup plus récente d'écoulement vadose, qui est responsable des méandres de petites dimensions, et recoupant diagonalement les galeries "phréatiques" selon la plus forte pente. Des puits de dissolution de grandes dimensions ont par endroits recoupé les conduits "phréatiques" à l'emporte-pièce (sortie main-courante, puits du Shunt) comme s'ils n'existaient pas.

L'admirable chenal de voûte développé au plafond de la galerie du même nom atteste d'un creusement sur comblage (gros conduits entièrement comblés). Ailleurs nous pouvons observer, dans une branche de galerie recoupée, un ancien plancher sur un comblage déblayé en partie, et sous lequel des concrétions ont grandi puis ont été érodées par un ennoyement général du réseau, suivi d'une baisse de

la nappe et d'une phase de surcreusement typique par méandre au sol (trou de serrure).

Et ceci ne doit être que la dernière des multiples phases qui ont marqué durant les derniers millions d'années l'évolution souterraine du Criou.

Ces quelques remarques sont à prendre avec prudence et de nombreuses observations et explorations devront être effectuées avant d'avoir une idée plus précise de ce système complexe.

En conclusion:

Nous insisterons sur un aspect pratique de l'exploration de ce massif, à savoir une collaboration dans la bonne entente entre les groupes spéléos (interclub et autres) et un libre accès pour tous aux différentes informations.

Ces découvertes et explorations ont été possibles grâce au travail collectif de (par ordre alphabétique SCC et SSG):

*C. Billaudel, P. Chevalley, G. Favre, M. Hint, J. Karlen
X. Launès, B. Léonard, R. Magnin, A. Prette, Fr Raymond,
J-C Raymond, S. Raymond, C. Ruzy, J-P Schleuner, J-Pierre
Tabacchi.*


Le Supérieur

Ce gouffre situé sur un mamelon à 1950m. d'altitude est facilement repérable depuis le Mirola. Bien que son entrée attire le regard de tous, c'est grâce à l'extrême curiosité de l'un de nous que nous avons constaté qu'il n'avait jamais été exploré.

Son exploration a nécessité deux sorties; ceci dû à deux étroitures qu'il a fallu agrandir. Son parcours n'offre aucune difficulté notoire et bien que n'ayant pratiquement pas de courant d'air, il nous laisse quand même un infime espoir de continuation.

Ultérieurement, une dénomination conforme au marquage du Criou sera donnée en accord avec les dossiers du SCL.

SCC & SSG



MIROLDA CD 11

CRIOU, SAMOENS, HAUTE - SAVOIE

X: 942.70 Y: 130.67 Z: 1880

TOPO: entrée: AVEN 1973

reste: S.C. CHABLAIS 1982

DEV: 1633 m grade 4

dessin: P. Chevalley

"LE SUPERIEUR"

X:130.63 Y:943.12 Z:1950

CRIOU (samoëns 74)

Topo: **SCC 81**

-- Jcr sr-- bl --

COUPE

échelle: 1/400^{ième}

0

20

50

80

NM

81

entrée →

PLAN