

LISTE 4 – INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES ET SÉRIES DE FOURIER

Exercice 1. Calculer les intégrales généralisées suivantes en utilisant la formule des résidus. Faire à chaque fois un dessin du contour choisi et des singularités.

- a) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$
- b) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx$
- c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + 1} dx$
- d) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^3 + i}$
- e) $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$

Exercice 2. On définit la fonction f telle que $f(x) = x$, $\forall x \in [-\pi, \pi]$ et f est 2π -périodique. Calculez les coefficients de Fourier de f et utilisez l'identité de Parseval pour en déduire

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Exercice 3. Soit \mathcal{X} l'ensemble des fonctions de $[-1, 1]$ à valeurs dans \mathbb{C} , continûment dérivables par morceaux. On définit le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) \overline{g(x)} dx$, où $f, g \in \mathcal{X}$. Calculez le produit scalaire des fonctions suivantes :

- a) $f(x) = \cos(5\pi x)$ et $g(x) = 1$.
- b) $f(x) = \cos(\pi x)$ et $g(x) = \cos(3\pi x)$.
- c) $f(x) = \cos(k\pi x)$ et $g(x) = \cos(l\pi x)$, $(k, l \in \mathbb{N})$.
- d) $f(x) = \sin(k\pi x)$ et $g(x) = \sin(l\pi x)$, $(k, l \in \mathbb{N})$.
- e) $f(x) = e^{i2\pi x}$ et $g(x) = e^{-i5\pi x}$.
- f) $f(x) = e^{i7\pi x}$ et $g(x) = e^{i7\pi x}$.
- g) $f(x) = e^{ik\pi x}$ et $g(x) = e^{il\pi x}$, $(k, l \in \mathbb{Z})$.

Exercice 4. Déterminer la série de Fourier des fonctions suivantes, définies sur $[-\pi, \pi]$ par

- a) $f(x) = x$.
- b) $f(x) = \begin{cases} -1, & \text{pour } -\pi \leq x < 0, \\ 1, & \text{pour } 0 < x \leq \pi, \\ 0, & \text{pour } x = 0. \end{cases}$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} 0, & \text{pour } -\pi \leq x < 0, \\ x, & \text{pour } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$\text{d) } f(x) = \begin{cases} \pi + x & \text{pour } -\pi < x < 0, \\ x, & \text{pour } 0 < x \leq \pi, \\ 0, & \text{pour } x = 0. \end{cases}$$

$$\text{e) } f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi + x}{2}, & \text{pour } -\pi \leq x < 0, \\ \frac{\pi - x}{2}, & \text{pour } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

$$\text{f) } f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{pour } -\pi \leq x < 0, \\ x, & \text{pour } 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Exercice 5. On considère les polynômes

$$f_0(x) = a_{00}, \quad f_1(x) = a_{10} + a_{11}x, \quad f_2(x) = a_{20} + a_{21}x + a_{22}x^2$$

Déterminer les coefficients $a_{00}, a_{10}, a_{11}, a_{20}, a_{21}, a_{22}$ de manière à ce que ces fonctions soient orthonormées par rapport au produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$.