

Статья про Капибар

Капибара, или водосвинка (*Hydrochaeris hydrochaeris*) – крупнейший грызун в мире. Она является членом рода водосвинки (*Hydrochoerus*), к которому относится еще один живой вид – малая водосвинка (*Hydrochoerus isthmius*) и два вымерших вида. Близкими родственниками капибары считаются морские свинки и горные свинки, и она более отдаленно связана с агути, шиншиллами и нутриями.

Классификация

Домен: Эукариоты;
Царство: Животные;
Тип: Хордовые;
Класс: Млекопитающие;
Отряд: Грызуны;
Семейство: Свинковые;
Род: Водосвинки;
Вид: Капибара.

Как выглядит капибара?



Внешне этот грызун очень похож на морскую свинку, только с очень большой головой. Шерсть имеет жёсткую, длиной от 30 до

120 мм, красно-коричневого или сероватого цвета (и лишь на животе она светлее и приобретает жёлтовато-бурый оттенок).

Грызун имеет тяжёлое, крепко сбитое, бочкообразной формы телосложение, при этом малая и большая берцовая кости частично сращены, а ключица отсутствует. Хвост маленький и практически незаметен.



Среда обитания

Капибары встречаются только в районах, где вода легко доступна: затопленные луга являются их предпочтительной средой обитания, но также они встречаются в заболоченных районах и низменных лесах, где есть хорошие пастбища, и вода доступна круглый год. Тем не менее эти грызуны занимают целый ряд местообитаний, включая сухой лес, кустарники и луга.

Размножение

Капибара становится половозрелой, когда достигает массы тела 30 кг, которая обычно совпадает с возрастом 1,5 года. У самки, как правило, рождается от одного до восьми детёнышей. У капибар из Парагвая обычно появляется на свет от одного до четырёх детёнышей; это меньше, чем у водосвинок из других регионов. Спаривание обычно происходит в начале сезона дождей, который начинается примерно в апреле или мае. Если

места обитания богаты на ресурсы, капибары могут размножаться более одного раза в год.

Интересные факты

- Тело капибары покрыто водоотталкивающей шерстью. Капибары умеют нырять и задерживать дыхание под водой до 5 минут.
- Капибары живут семейными группами. Возглавляет каждую семью самец-вожак.
 - Мозг капибары размером с лимон.
- В отличие от всех остальных грызунов, малыши капибар могут стоять уже через несколько минут после рождения и есть твердую пищу на четвертый день.
- Мамы-капибары кроме своих детенышей могут кормить и других малышей из своего семейства.
- Для общения между собой капибары используют разные звуки, они напоминают лай собаки, хрюканье, мурлыканье, свист, визжание.

сделал skysunflow