

## Corrigé 2

### Problème 1 Nombre de spectateurs

Soit  $Y$  le nombre de personnes qui assistent à la représentation d'une pièce de théâtre.

a) Pour 5 jours de représentation pris au hasard on a observé :

$i$	1	2	3	4	5
$y_i$	300	280	290	310	295

Estimer l'espérance  $E(Y) = \mu$  par la médiane de l'échantillon  $\bar{y}$ , puis par la moyenne de l'échantillon  $\bar{y}$ .

$$\bar{y} = \frac{1475}{5} = 295 \quad \tilde{y} = 295$$

b) Pour 4 nouveaux jours choisis au hasard on a observé :

$i$	6	7	8	9
$y_i$	305	318	290	280

Recalculer les deux estimations de  $\mu$  en considérant l'échantillon formé par l'ensemble des 9 observations. Commenter.

$$\tilde{y} = 295 \quad \bar{y} = \frac{2668}{9} \approx 296.4$$

c) Pour les cinq premières observations on trouve :

$$\sum_{i=1}^5 y_i^2 = 435'625$$

et pour l'ensemble des 9 observations :

$$\sum_{i=1}^9 y_i^2 = 792'274$$

Donner une estimation non-biaisée de la variance de  $Y$ , ainsi qu'une estimation non-biaisée de l'écart type de  $\bar{y}$  dans chacun des deux cas considérés. Commenter.

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{n}{n-1} \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \bar{y}^2 \right)$$

Attention, il s'agit de  $S^2$  qui est la variance d'une population.

a) cinq observations

$$S^2 = \frac{435625}{5} - 295^2 = 100$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{5}{5-1} 100 = 125$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{125} \approx 11.18$$

Pour la moyenne de l'échantillon, nous avons

$$\hat{\sigma}_{\bar{y}_1} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{11.18}{\sqrt{5}} = 5$$

b) neuf observations

$$S^2 = \frac{792274}{9} - 296.4^2 \approx 151.14$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{9}{9-1} 151.14 \approx 170.03$$

$$\hat{\sigma} \approx \sqrt{170.03} \approx 13.04$$

Pour la moyenne de l'échantillon, nous avons

$$\hat{\sigma}_{\bar{y}_2} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{13.04}{\sqrt{9}} \approx 4.35$$

d) Supposons maintenant qu'à la suite d'une erreur le nombre d'entrées du 9ème jour ait été mal relevé. De ce fait nous avons :

$i$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$y_i$	300	280	290	310	295	305	318	290	28

Recalculer les deux estimations de  $\mu$ . Lequel des deux estimateurs est-il le plus pertinent ?

$$\tilde{y} = 295 \quad \bar{y} = \frac{2416}{9} \approx 268.4$$

La médiane est ici plus pertinente que la moyenne comme estimateur de  $\mu$  car elle est plus robuste.