

Estimativa da temperatura de excitação (no código)

1) As riscas a analisar são dadas numa tabela de Tsantaki et al. 2013, A&A, 555, A150. Apenas contém riscas de Fe I e Fe II com o seguinte formato

Lambda	'Potencial Excitação'	log(gf)	elemento	EW_solar (mÅ)	mult
4523.4 0	3.65	-1.871	FeI	44.2	829
4537.67	3.27	-2.87	FeI	17.4	594
4551.65	3.94	-1.928	FeI	29.1	972
....					

2) Escolher dois multipletos de Fe I. A escolha pode ser feita usando um filtro na coluna dos potenciais de excitação. Os multipletos poderão ser os seguintes:

Opcão combinação	multipletos	nº de riscas	Opcão combinação	multipletos	nº de riscas
0	[13,16]	4	10	[1084,1108]	10
1	[34,39]	4	11	[1143,1147]	6
2	[62,64]	5	12	[1159,1164]	5
3	[109,115]	5	13	[1173,1181]	14
4	[205,207]	6	14	[1194,1197]	4
5	[594,641]	4	15	[1225,1234]	3
6	[816,928]	11	16	[1255,1260]	4
7	[959,982]	6	17	[1314,1327]	3
8	[1005,1022]	6			
9	[1030,1064]	7			

Aconselha-se usar dois multipletos que estejam suficientemente distante em termos de EP.