

1. ¿Hasta cuántos días se puede detectar los metabolitos de marihuana en orina?
A. 7
B. 14
C. 21
D. 28
2. Mujer de 32 años, denunciada por golpear a las mascotas de los vecinos incluso en presencia de niños; ante los reclamos, insulta, amenaza con agredir a los vecinos del edificio y los culpa de perturbar la paz. Hace fiestas ruidosas en su departamento con consumo de alcohol y drogas; soborna o echa a los serenos diciendo: "para eso pago mi alquiler". Roba objetos que los vecinos dejan en los pasillos. Desde muy joven ha tenido problemas con la justicia e incluso ha robado a sus padres, negándolo aún siendo descubierta *in fraganti*. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Narcisismo maligno
B. Personalidad disocial
C. Indiferencia afectiva
D. Control de impulsos
3. En la esquizofrenia. ¿Cuál es el complejo sintomático que se caracteriza por un comportamiento inadecuado o necio, manierismos, afecto inapropiado y delusiones o alucinaciones transitorias y no sistematizadas?
A. Hebefrenia
B. Límitrofe
C. Escisión
D. Catéxica
4. ¿Cómo se llama al aspecto psicosocial y experiencia subjetiva del sexo?
A. Identidad
B. Asignación
C. Congruencia
D. Género
5. Mujer de 38 años, ingeniera civil, que debe supervisar obras en diferentes departamentos; tiene miedo intenso y paralizante a viajar en avión, el medio más rápido de enlace con las obras que su compañía realiza. ¿Cuál es la terapia más recomendable?
A. Realidad virtual
B. De esquemas
C. Sistémica
D. Psicodinámica
6. En el retraso mental grave, el coeficiente intelectual se sitúa entre:
A. 50 - 69
B. 35 - 49
C. 15 - 25
D. 20 - 34
7. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene mayores probabilidades de causar disfunción sexual?
A. Bupropión
B. Lurasidona
C. Paroxetina
D. Clonazepam
8. Mujer de 22 años, universitaria, de tercio superior, que consultó por sentirse triste, desanimada y fracasada; piensa que es inútil como estudiante, afirmando sobre su último examen: "como obtuve una calificación baja en mi evaluación, significa que estoy haciendo un mal trabajo". ¿Cuál es la distorsión cognitiva que expresa?
A. Sobregeneralización
B. Visión en túnel
C. Filtro mental
D. Catastrofización
9. Mujer de 42 años, casada; consulta todas las decisiones hogareñas con su esposo y su madre, por temor a equivocarse, aunque no le guste el resultado final; teme que su esposo la abandone porque "con mi torpeza, no podré salir adelante". Se siente frustrada por no ejercer su carrera (economía) y afirma que eso fue porque su esposo decidió que se quede a cargo del hogar. ¿Cuál es el trastorno de personalidad más probable?
A. Obsesivo
B. Inhibido
C. Dependiente
D. Pasivo
10. Mujer de 51 años, soltera, retraída, secretaria; afirmó en la consulta: "tengo una relación en secreto con Elon Musk desde hace años, pero no puede revelarlo para protegerme de sus enemigos; sin embargo, todos los días me declara su amor en mensajes en clave por periódicos y noticieros; yo le soy fiel y lo espero". ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Celotipia
B. Obnubilación
C. Erotomanía
D. Fijación

11. Interno de psicología de 24 años, que no participa de actividades sociales ni almuerza con sus compañeros, afirma que "tenía que estudiar"; en su último día de internado, mientras preparaba su exposición ante el servicio, el residente notó que tenía rubefacción, sudor y temblor de manos. Al ver la sala llena, el interno salió con un pretexto y no regresó nunca más. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Pánico
B. Eritrofobia
C. Fobia social
D. Adaptación
12. Varón de 36 años; en ocasiones se viste con ropas de mujer para cumplir con sus fantasías e impulsos sexuales y como complemento para la masturbación y el coito. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Voyeurismo
B. Sadismo sexual
C. Travestismo
D. Coprofilia
13. ¿Cuál de los siguientes antidepresivos está más asociado a la aparición de malformaciones fetales?
- A. Escitalopram
B. Sertralina
C. Fluvoxamina
D. Paroxetina
14. Niño de 7 años; a menudo está enfadado o resentido, discute, muestra actitud desafiante, pierde la calma y se torna susceptible o se enoja con facilidad. Desafía al director de su colegio y culpa a los demás por sus errores o mal comportamiento. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Negativista desafiante
B. Conducta
C. Déficit de atención
D. Autismo leve
15. Mujer de 58 años, en tratamiento regular por trastorno bipolar. En su evaluación anual se detectó hipertensión y se encontró creatinina 2.5 mg/dL. ¿Cuál de los siguientes fármacos debe ser retirado prioritariamente?
- A. Carbamazepina
B. Ácido valproico
C. Quetiapina
D. Litio
16. Mujer de 19 años, con antecedente de abuso sexual en la infancia; desde hace 10 años presenta pesadillas sobre el abuso, episodios de flashbacks donde revive la experiencia y evita la cercanía de varones parecidos a su abusador. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Estrés agudo
B. Ansiedad generalizada
C. Estrés postraumático
D. Rememoraciones
17. Adolescente de 16 años; desde la infancia comete errores y no termina sus deberes a tiempo en casa y el colegio por no prestar atención a los detalles; pierde con frecuencia sus cosas, tiene dificultad para organizar sus actividades, se distrae con facilidad y parece no escuchar cuando le hablan. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Déficit de atención a predominio hiperactivo
B. Déficit de atención mixto
C. Déficit de atención a predominio inatento
D. Orgánico cerebral con síntomas psicóticos
18. ¿Cuál es la zona del neocórtex donde se codifican los conocimientos en el cerebro humano?
- A. Paralímbico
B. Dorsolateral
C. Parieto-temporo-occipital
D. Amígdala del lóbulo temporal
19. El cuestionario CAGE se usa en la evaluación y cribado de...
- A. depresión.
B. alcoholismo.
C. pánico.
D. esquizofrenia.
20. Mujer de 28 años, secretaria, con eficiencia promedio; avisa a sus jefes que no hagan negocios en días "aciagos" según su horóscopo. Afirma que puede conocer las intenciones de la gente con solo una mirada y presentir acontecimientos catastróficos que evita con rituales o vistiendo ciertos colores. Cree en teorías conspirativas sobre extraterrestres y terraplanismo. Poco sociable, pero amable. Su discurso es muy elaborado y a veces difícil de entender. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Personalidad esquizotípica
B. Trastorno anancástico
C. Ideas delirantes
D. Episodio psicótico

21. ¿Cuál es la patología que se caracteriza por la tríada sintomática de dolor abdominal tipo cólico agudo, polineuropatía motora y psicosis?
A. Encefalopatía hepática
B. Porfiria intermitente aguda
C. Uremia
D. Diabetes
22. En la narcolepsia hay episodios de, que consiste en pérdida brusca temporal del tono muscular que causa debilidad e inmovilidad, seguida frecuentemente de sueño.
A. disociación
B. lipotimia
C. cataplexia
D. hipotensión
23. Niño de 6 años; llevado a consulta cuando intentó ahorcar a un gato recién nacido. En el colegio acosa, amenaza o intimida a otros niños, inicia peleas y rompe los juguetes de sus amigos; robó pertenencias de su profesora e intentó incendiar su colegio. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Desafiante
B. Déficit de atención
C. Asperger
D. Conducta
24. Neutropenia, íleo paralítico, ortostatismo y convulsiones son efectos secundarios potenciales de...
A. fluoxetina.
B. paroxetina.
C. clozapina.
D. fluvoxamina.
25. ¿Cuál es el trastorno de personalidad donde el aspecto clínico fundamental es la hipersensibilidad al rechazo?
A. Anancástico
B. Solitario
C. Paranoide
D. Evitativo
26. ¿Cuál es la deformación no intencionada de la memoria que se produce al ser filtrada a través del estado emocional, cognitivo y experimental de una persona?
A. Falsificación retrospectiva
B. Seudología fantástica
C. Mitomanía recurrente
D. Incorporación subjetiva
27. ¿Cuál de las siguientes sustancias se puede administrar por vía intravenosa?
A. Marihuana
B. Éxtasis
C. Heroína
D. Alprazolam
28. Mujer de 16 años que terminó con su enamorado hace una semana; desde allí se torna irritable y triste, afirmando que quiere morir. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Autismo
B. Adaptación
C. Déficit atención
D. Esquizofrenia
29. Varón de 87 años, sin antecedentes de importancia; desde hace cuatro meses experimentó desorientación, olvidos, desinterés, hipoergia, irritabilidad, inversión del ritmo circadiano y alucinaciones visuales; se sospechó una demencia secundaria. La hija recordó que el paciente solicitó medicación a su geriatra por insomnio. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene mayor probabilidad de ser el causante?
A. Haloperidol
B. Risperidona
C. Quetiapina
D. Alprazolam
30. ¿Cuál es el principio de la psicoterapia donde se espera que la persona evalúe de manera objetiva el mundo fuera de sí mismo, percibiéndose a sí mismo de manera precisa?
A. Realidad
B. Transferencia
C. Empatía
D. Aceptación
31. Las personas que se cortan o lesionan la piel sin propósitos suicidas afirman que así obtienen alivio de sus síntomas disfóricos. ¿Cuál de las siguientes sustancias se libera con esta acción y es responsable de tal efecto?
A. Endorfinas
B. Glutamato
C. Serotonina
D. Cortisol

32. ¿Cuál de los siguientes antidepresivos se prescribe con mayor probabilidad en una persona con depresión, hiporexia y dolor neuropático?
A. Paroxetina
B. Mirtazapina
C. Fluoxetina
D. Bupropión
33. ¿Cuál de siguientes fármacos es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina que restringe el apetito?
A. Mirtazapina
B. Clomipramina
C. Propanolol
D. Fluoxetina
34. ¿Qué tipo de sustancia es la psilocibina?
A. Alucinógeno
B. Antidepresivo
C. Anabólico
D. Antipsicótico
35. La acción de la nicotina involucra a los receptores colinérgicos, potencia la liberación de acetilcolina y produce:
A. Estimulación de β endorfinas
B. Bloqueo dopaminérgico
C. Estimulación pituitaria
D. Bloqueo glutamatérgico
36. Varón de 48 años, que compra y recolecta objetos de poco o ningún valor porque piensa que pueden serle útiles en algún momento, hasta ocupar grandes áreas de su casa. Cuando sus hijos intentan eliminar objetos inservibles, tiene dificultad para separarse de ellos por la necesidad percibida de guardar sus posesiones. Se entristece porque no puede invitar a su casa a sus amigos, ya que no tiene lugar para recibirlos. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Compulsivo
B. Acumulación
C. De Diógenes
D. Maníaco
37. Niña de 4 años de edad, con diagnóstico definitivo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad severo. ¿Cuál de los siguientes fármacos está indicado?
A. Lisdexanfetamina
B. Clonidina
C. Dextroanfetamina
D. Metilfenidato
38. ¿Cuál es el fármaco indicado en el tratamiento de mantenimiento del trastorno bipolar?
A. Escitalopram
B. Lamotrigina
C. Clomipramina
D. Clonazepam
39. En la psicoterapia de apoyo. ¿Cuál es la experiencia donde el terapeuta muestra una conducta diferente a la conducta destructiva o improductiva de un progenitor del paciente, neutralizando o revirtiendo los efectos originados por tal conducta?
A. Acrítica despersonalizada
B. Psicodinámica breve
C. Emocional correctiva
D. Reestructuración conductual
40. Niña de 6 años, tiene deficiencias en la reciprocidad socioemocional y comunicación social, muestra patrones repetitivos, estereotipias, ecolalia y angustia frente a cambios pequeños. No interactúa con otros niños y grita cuando hay sonidos fuertes. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Retraso mental
B. Déficit atención e hiperactividad
C. Espectro autista
D. Desafiante oposicionista
41. Varón de 30 años, usuario de risperidona desde hace 4 meses; acude a emergencia por sensación subjetiva de inquietud, con necesidad urgente de estar en movimiento constante, que ocurre desde hace dos días, luego de incrementar la dosis de su medicamento. ¿Cuál es el síntoma más probable?
A. Psicosis
B. Dromomanía
C. Irritabilidad
D. Acatisia
42. ¿Cuál es el trastorno del discurso dirigido por el sonido de un término más que por su significado, donde las palabras no tienen una conexión lógica y los juegos de palabras y las rimas pueden dominar la conducta verbal?
A. Discurso afectivo
B. Asociación sonora
C. Lenguaje disgregado
D. Ensalada de palabras

43. Sirve para conocer y explicar el mundo, las cosas y las propias formas de actuar y para relacionarse con otras personas:
A. Imaginación
B. Percepción
C. Pensamiento
D. Apatía
44. ¿Cuál es la principal causa de muerte prematura entre los pacientes con esquizofrenia?
A. Infarto
B. Hiperglicemia
C. Cirrosis
D. Suicidio
45. Terminada la fase aguda de la depresión mayor; el insomnio, la fatiga y la hipoprosexia son los síntomas más comunes de los pacientes sin remisión.
A. nucleares
B. vegetativos
C. residuales
D. indirectos
46. Mujer de 28 años que recibió durante un mes decanoato de flufenazina 50 mg por semana, por vía IM; acudió a emergencia por fiebre. Examen: FC: 105X', FR: 32X', T°: 40.5 °C, PA: 160/90 mmHg; rigidez muscular; acinesia. Ex. mental: mutismo, confusión y agitación. ¿Cuál es el síndrome más probable?
A. Discontinuación
B. Neuroléptico maligno
C. Ganser
D. Cushing
47. ¿En qué parte del neocórtex se codifican los valores?
A. Ínsula
B. Occipital
C. Hipocampo
D. Prefrontal dorsolateral
48. Mujer de 25 años, derivada por dermatología debido a su preocupación por la apariencia de su cutis y revisión constante de su rostro; refirió que tiene periodos de gran tensión al ver cicatrices o marcas en su mentón, la que se alivia al rascarlas hasta dejar lesiones, tras de lo cual siente alivio pero luego culpabilidad por haberse dejado más huellas. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Excoriación
B. Obsesivo
C. Prurigo
D. Dismórfico
49. Varón de 65 años, presenta reducción del procesamiento mental, tiempos de reacción prolongados y olvidos benignos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
A. Deterioro cognitivo leve
B. Enfermedad de Alzheimer
C. Demencia mixta
D. Demencia por proteínas tau
50. Varón de 34 años; durante la entrevista tiene actividad espontánea, se mueve, dirige la mirada y responde lentamente cuando se le habla o se le da una orden. ¿Cuál es el síntoma más probable?
A. Afasia amnésica
B. Alexitimia
C. Hipoactividad
D. Hiperprosexia
51. Varón de 78 años; durante su segundo día post operatorio de cirugía laparoscópica presentó alteración del nivel de conciencia con atención fluctuante y agitación psicomotriz. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Delusional
B. Delirium
C. Infarto
D. Apatía
52. Abogada de 45 años en estudio privado, con rendimiento promedio, se queja con sus jefes porque no le asignan casos importantes (mejor pagados) a pesar de juzgarse la mejor abogada del estudio. Se muestra seductora cuando quiere conseguir algo, pero tiene estallidos de furia y maltrata a secretarías y practicantes si no priorizan sus pedidos o no la tratan como ella exige. Reclama que hay favoritismo hacia una de sus colegas de rendimiento superior al suyo y buen trato, que es profesora universitaria y estimada de todos. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Episodio maniaco
B. Delusión de grandiosidad
C. Ideas referenciales
D. Personalidad narcisista

53. La ailurofobia es la fobia a:
A. Rayos
B. Líneas
C. Gallinas
D. Gatos
54. Mujer de 14 años, luego de alimentarse vomita porque se siente obesa y tiene miedo intenso a ganar peso; usa laxantes, restringe alimentos y bajó 10 Kg en 5 meses. IMC: 16.5. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Anorexia restrictiva y con purgas
B. Bulimia con purgas
C. Atracones compulsivos
D. Anorexia grave y restrictiva
55. El uso de está asociado a irritabilidad, agresividad, depresión y psicosis.
A. antidepresivos tricíclicos
B. antagonistas dopaminérgicos
C. esteroides anabólicos
D. agonistas gabaérgicos
56. ¿Qué antagonista β -adrenérgico es eficaz en el temblor inducido por litio y la acatisia aguda inducida por neurolépticos?
A. Pindolol
B. Propranolol
C. Clonazepam
D. Lurasidona
57. El concepto, es la unidad esencial del...
A. imaginario.
B. habla.
C. pensamiento.
D. sensorio.
58. ¿Cuál de los siguientes exámenes auxiliares debe hacerse antes de iniciar la terapia con litio?
A. Resonancia magnética
B. B12
C. Electroencefalograma
D. TSH
59. Puérpera de 33 años; durante el primer mes posparto presentó insomnio, fluctuación del ánimo, irritabilidad, delusiones incongruentes con su estado de ánimo, conducta desorganizada y riesgo de infanticidio y suicidio. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Psicosis orgánica
B. Autismo
C. Depresión posparto
D. Psicosis posparto
60. ¿Cuál es un efecto adverso urogenital de la memantina?
A. Incontinencia
B. Priapismo
C. Inhibición
D. Litiasis
61. ¿Cuál es la estructura que obra como interfaz principal para la información sensorial visual, auditiva y somática recibida del tálamo y la corteza en la respuesta ante el miedo?
A. Sustancia blanca
B. Lóbulo prefrontal
C. Núcleo lateral amigdalino
D. Vía aferente visceral
62. ¿Cuál es el problema psiquiátrico más frecuente durante el primer año posterior al trasplante renal?
A. Depresión
B. Pánico
C. Delirio
D. Claustrofobia
63. ¿Cuál es el tipo de psicoterapia con mejor evidencia empírica para el tratamiento del trastorno de personalidad inestable?
A. Esquemas
B. Conductual dialéctica
C. Familiar sistémica
D. Eneagrama
64. Mujer de 62 años, presenta cambios progresivos del comportamiento y personalidad como apatía, desinhibición y deterioro del lenguaje que perjudican su conducta social. ¿Cuál es la demencia más probable?
A. Alzheimer
B. Vascular
C. Frontotemporal
D. Cuerpos de Lewy

65. Mujer de 19 años, presenta atracones recurrentes pero sin comportamiento compensatorio (vómitos, abuso de laxantes o dieta excesiva) ni deseo excesivo de delgadez, con peso normal o elevado. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Bulimia
B. Anorexia
C. Disociativo
D. Atracones
66. Varón de 19 años; hace 7 años presenta rituales de comprobación, duda si ha cerrado la puerta varias veces, a veces con tanta fuerza que a roto varias puertas, indica que sus ideas son angustiosas e ilógicas. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Obsesivo compulsivo
B. Anancástico de la personalidad
C. Esquizofrenia
D. Bipolar
67. Mujer de 28 años, soltera, muestra patrones restringidos de interacción social desde la infancia con lenguaje adecuado y presencia de manierismos motores; no tiene retraso general ni cognitivo del desarrollo ni presenta delusiones. Su coeficiente intelectual es 80. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Retraso mental leve
B. Esquizofrenia
C. Asperger
D. Retraso mental moderado
68. ¿Cuál de los siguientes antidepresivos tiene mayor potencial de inhibición del citocromo P450 - CYP1A2?
- A. Nefazodona
B. Duloxetina
C. Fluvoxamina
D. Imipramina
69. Mujer de 37 años, llevada a la emergencia por sospecha de consumo de drogas en una fiesta porque reía sin razón aparente y comenzó a bailar quitándose la ropa; ella protestó: "no he tomado nada; he tenido depresión pero estoy muy alegre estas dos semanas. Sólo me he vestido sensual para la fiesta". Sus amigos confirmaron que esa no era su conducta habitual y el episodio depresivo. Ex. mental: maquillaje recargado, conducta intrusiva, taquialia, ánimo elevado pero irritable a la confrontación. Ex. físico y laboratorio: sin alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Trastorno límite
B. Psicosis aguda
C. Episodio maniaco
D. Disociación
70. Mujer de 72 años, desde hace 2 años tiene necesidad de apuestas cada vez más altas para lograr la misma emoción, se vuelve irritable cuando intenta no jugar y tiene pensamientos persistentes sobre el juego; miente para ocultar sus pérdidas económicas y pide dinero a los hijos y amigos con pretextos diversos. ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Alcoholismo
B. Demencia
C. Juego patológico
D. Psicopatía
71. ¿Cuál es el trastorno del sueño caracterizado por la dificultad para iniciar o mantener el sueño o despertarse temprano por la mañana con incapacidad para volver a dormir?
- A. Parasomnia
B. Automatismo
C. Insomnio
D. Inquietud
72. ¿Cuál de los siguientes trastornos psiquiátricos es la comorbilidad más frecuente de los trastornos dermatológicos crónicos?
- A. Psicosis
B. Pánico
C. Depresión
D. Adaptación
73. ¿En cuál de las siguientes terapias grupales se usa con más frecuencia la confrontación?
- A. Cognitiva
B. Autoayuda
C. Psicodinámica
D. Conductual
74. Varón de 21 años, posee habilidades sociales y ocupacionales adecuadas para un mínimo de independencia; sin embargo, requiere guía o asistencia frente a un nivel inusual de estrés económico o social. ¿Cuál es el grado de retraso mental más probable?
- A. Moderado
B. Grave
C. Fronterizo
D. Leve

75. ¿Cómo se denomina a la actividad mental que sigue un sistema lógico totalmente subjetivo e idiosincrático y que no toma en consideración los hechos de la realidad ni la experiencia?
- A. Ilusión
B. Sincretismo
C. Dereísmo
D. Aislamiento
76. ¿En qué trastorno de comportamiento del sueño se producen puñetazos, patadas y otros movimientos desde la cama durante el intento de representación del sueño del paciente?
- A. Sonambulismo
B. Parálisis
C. Fase REM
D. Hipnagogia
77. Varón de 45 años, gerente de una pequeña agencia bancaria; no es ascendido porque, debido a su perfeccionismo, se demora en exceso para implementar indicaciones superiores; no puede delegar funciones y se recarga de trabajo, desatendiendo al hogar y sus amigos. Cuando intentan convencerlo de algún cambio, se muestra obstinado y es rígido en los procedimientos. ¿Cuál es el trastorno de la personalidad más probable?
- A. Paranoide
B. Desorganizado
C. Obsesivo compulsivo
D. Pasivo agresivo
78. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que permite el manejo de un impulso inaceptable permitiendo su expresión en la forma contraria (antitética)?
- A. Sublimación
B. Desplazamiento
C. Acting out
D. Formación reactiva
79. Las asociaciones se manifiestan como un fallo de la comunicación verbal, donde las ideas se desplazan de un tema a otro sin relación ni conexión.
- A. fijas
B. laxas
C. parciales
D. libres
80. ¿Cuál es el trastorno de personalidad que tiene mayor evidencia de abuso sexual en la infancia y suele consultar por disforia de género?
- A. Límitrofe
B. Dependiente
C. Antisocial
D. Anancástico
81. Sobre neuroimágenes. ¿Cuáles son las regiones cerebrales con mayor activación durante un episodio de crisis de pánico?
- A. Frontal y temporal
B. Occipital y ventral
C. Wernicke y cingular
D. Insular y estriada
82. En la pérdida de las fronteras del yo, el paciente no distingue dónde acaba el propio cuerpo, mente e influencia y dónde empiezan las del resto de objetos animados e inanimados, lo que se expresa en las delusiones...
- A. hápticas.
B. de ruina.
C. de poder.
D. referenciales.
83. El trastorno esquizofreniforme dura entre a meses.
- A. 1 / 6
B. 3 / 10
C. 6 / 12
D. 4 / 9
84. Varón de 34 años, procedente de Madre de Dios, sin patología previa, que refina oro en su domicilio y se alimenta en su taller. Desde hace dos meses ríe y hace bromas sin motivo aparente, afirma que es invulnerable a las enfermedades y que es amigo de todos sus vecinos (no habla con ellos). Es llevado al hospital por diarrea sanguinolenta. Examen: temblor en ambas manos, encías inflamadas y desorientado en lugar y tiempo. Resto sin alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
- A. Rabia
B. Botulismo
C. Infección por *E. coli*
D. Intoxicación por mercurio

85. ¿Cuál es el trastorno que se inicia antes de los 18 años y combina tics vocales (entre ellos coprolalia) y motores múltiples?
A. Disonía
B. Hemibalismo
C. La Tourette
D. Corea
86. Niño de 12 años, desde hace 4 años presenta regurgitación sin esfuerzo ni dolor; a veces deglute o escupe los alimentos. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Pica
B. Rumiación
C. Restricción de alimentos
D. Atracones
87. Mujer de 34 años, en episodio depresivo con buena evolución desde hace 2 meses; acudió a control quejándose de insomnio, a pesar de aumentar la frecuencia y dosis de un inductor del sueño que antes era de uso muy ocasional. Examen: edema de miembros inferiores, resto sin alteraciones. La paciente confesó que una semana antes del inicio del insomnio, consumió un "producto natural" sin consulta médica, para "mejorar su energía". ¿Cuál es la sustancia ingerida, con mayor probabilidad?
A. Kava
B. Hipérico
C. Lúpulo
D. Ginseng
88. Niño de 2 años, desde hace 10 semanas llora insistentemente cuando se separa de su madre, presentando palpitaciones, dolor abdominal, náusea, vómitos, síntomas pseudogripales y cefalea. Los síntomas no están relacionados a condiciones clínicas o quirúrgicas. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Ansiedad por separación
B. Depresión
C. Ansiedad generalizada
D. Autismo
89. ¿Cuál es el inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina que produce mayor prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma?
A. Fluoxetina
B. Sertralina
C. Citalopram
D. Paroxetina
90. Varón, 25 años, acude en agosto a la emergencia gritando que se asfixia, refirió que desde hace 3 meses tiene episodios de sensación de falta de aire, parestesias, temblor y miedo a morir. Al examen: vestido con camiseta corta y shorts, FC: 105X', FR: 28X', SatO₂: 99%, piel caliente, con zonas hipopigmentadas y tremor fino en manos; resto del examen sin alteraciones. ¿Cuál es el examen auxiliar que el psiquiatra debe solicitar?
A. Electroencefalograma
B. Tomografía cerebral
C. Perfil tiroideo
D. Transaminasas
91. ¿Cuál es el riesgo de usar benzodiazepinas en un paciente con trastorno de personalidad antisocial y conducta heteroagresiva?
A. Sedación
B. Desinhibición
C. Insomnio
D. Acatisia
92. Varón de 36 años; simula síntomas sin recompensa o motivación externa aparente, pero su objetivo es asumir el papel de enfermo. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Disociativo
B. Ganser
C. Facticio
D. Evitativo
93. Los fenómenos que consisten en distorsiones visuales, alucinaciones geométricas, estelas de imágenes de objetos en movimiento y emociones intensas revividas, se denominan...
A. delirium.
B. flashbacks.
C. delusión.
D. alucinaciones.
94. Primigesta de 24 años, en 28ª semana de gestación, con evolución de la gestación aparentemente normal, que experimenta la necesidad irresistible de consumir tierra de jardín. ¿Cuál es el trastorno más probable?
A. Anemia
B. Alergia
C. Pica
D. Oxiuriasis

95. ¿Cómo se llama la interrupción brusca del curso del pensamiento antes de que una reflexión o una idea finalice donde, después de una pausa breve, la persona dice que no recuerda lo que estaba diciendo o lo que iba a decir?
- A. Dispersión
B. Bloqueo
C. Hipomnesia
D. Saturación
96. Mujer de 27 años; se queja de episodios intermitentes de "distanciamiento de sí misma", normalmente asociados a situaciones sociales que le provocan ansiedad. En la consulta afirmó: "de pronto yo estaba hablando, pero me sentía como si no fuera yo quien hablara". ¿Cuál es el trastorno más probable?
- A. Ansiedad generalizada
B. Pánico
C. Bipolar
D. Despersonalización
97. ¿Cuál de los siguientes es un antipsicótico de segunda generación?
- A. Haloperidol
B. Olanzapina
C. Tioridazina
D. Trifluoperazina
98. Comprende intervenciones diseñadas para ayudar a las personas con discapacidades por trastornos mentales, destinadas a mejorar su funcionamiento y calidad de vida.
- A. Rehabilitación
B. Prevención
C. Diagnóstico
D. Plan de trabajo
99. Rafael de 45 años, con antecedentes de consumo de alcohol; desde hace un año presenta deterioro cognitivo en memoria reciente y amnesia anterógrada. Al examen: hipoalerta, reactivo y presenta confabulaciones. ¿Cuál es el síndrome más probable?
- A. Wernicke
B. Ganser
C. Korsakoff
D. Lagunas
100. ¿Cuál es el antipsicótico antagonista de los receptores 5-HT_{2A}, indicado para el tratamiento de la esquizofrenia y la manía aguda, así como para potenciar la acción de los antidepresivos en el trastorno depresivo mayor?
- A. Aripiprazol
B. Haloperidol
C. Trifluoperazina
D. Fluoxetina