


## Método de Newton

O método de Newton (também conhecido por método de Newton-Raphson) é um método numérico para encontrar as raízes (ou zeros) de uma função.

Considere a função  $f(x)$  e uma primeira aproximação,  $x_0$ , como mostra a figura a seguir, onde  $r$  é a raiz de  $f(x)$ :



Podemos obter uma segunda aproximação,  $x_1$ :

$$f'(x_0) \sim \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{0 - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$(x_1 - x_0)f'(x_0) \sim -f(x_0)$$

$$x_1 - x_0 \sim -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Analogamente, obtemos uma terceira aproximação,  $x_2$ :

$$f'(x_1) \sim \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{0 - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$(x_2 - x_1)f'(x_1) \sim -f(x_1)$$

$$x_2 - x_1 \sim -\frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}$$

Repetindo esse processo, obtemos uma sequência de aproximações  $x_0, x_1, x_2, \dots$ . Assim, se  $x_n$  for a n-ésima aproximação, de modo que  $f'(x_n) \neq 0$ , então temos que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Se os números  $x_n$  ficarem cada vez mais próximos da raiz,  $r$ , à medida que  $n$  aumenta, então temos que a sequência de aproximações converge para a raiz da função, isto é,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = r.$$

Vale observar que o procedimento para ir de  $n$  para  $n+1$  é o mesmo, para todos os valores de  $n$ , o que caracteriza o método de Newton como um método iterativo. Logo, dada uma precisão, um critério de parada é quando duas aproximações sucessivas,  $x_n$  e  $x_{n+1}$ , apresentarem os mesmos valores na dada precisão (isso significa que se a precisão for de  $10^{-4}$ , quatro casas decimais, no momento em que as duas aproximações sucessivas,  $x_n$  e  $x_{n+1}$ , são iguais até a quarta casa decimal, então o método pára).

### Referências Bibliográficas:

- BURDEN, R. L.; FAIRES, D. *Análise Numérica*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
- STEWART, J. *Cálculo: volume 1*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

Implementar o Método de Newton e fazer os seguintes teste:

1. Determinar a terceira aproximação da raiz da equação  $x^5 + 2 = 0$ , considerando a primeira aproximação  $x_0 = -1$ .
2. Determinar as raízes de  $x^6 - x^4 + 3x^3 - 2x = 0$ , com precisão de três casas decimais.
3. Determinar as raízes de  $2x^3 - 6x^2 + 3x + 1 = 0$ , no intervalo  $[2; 3]$ , com precisão de cinco casas decimais.
4. Determinar as raízes de  $x^7 - 3x^5 + 4x^2 - 2 = 0$ , no intervalo de  $[0; 2]$ , com precisão  $10^{-4}$ .
5. Faça uma análise para caso  $x^3 - 3x + 6 = 0$ , com  $x_0 = 1$ .