DOCUMENTO 10 · EMERGENCIA

¿CUÁNDO LLAMAR AL SAMU 131?

Guía de decisión rápida basada en criterios MINSAL.
Imprima y péguela cerca del teléfono.

SAMU · SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA

131

Gratis · 24/7 · en todo Chile

El SAMU envía una ambulancia con personal de salud si la situación lo requiere, y coordina el traslado al centro más adecuado. **No dude en llamar.**

🫀 INFARTO AL MIOCARDIO — LLAMAR INMEDIATAMENTE

Síntomas típicos

- **Dolor opresivo en el pecho** (peso o apretón) que dura más de 15 minutos
- Irradia al brazo izquierdo, mandíbula, espalda o cuello
- Sudoración fría · náuseas o vómitos · ahogo
- Angustia o sensación de muerte inminente
- No pasa con reposo ni con cambios de posición

Síntomas atípicos (mujeres, diabéticos, adultos mayores)

- Cansancio extremo sin motivo · ahogo sin dolor
- Náuseas persistentes · malestar inespecífico

QUÉ HACER

1. Marque **131**
2. Siente o acueste al paciente · afloje ropa ajustada
3. Si tiene aspirina y no es alérgico: masticar 1 (100–300 mg) puede ayudar mientras llega la ambulancia
4. No dé comida ni bebida
5. Si pierde el conocimiento y deja de respirar: inicie **RCP** (compresiones 100–120/min en el centro del pecho)

🧠 ACV — REGLA F.A.S.T.

LETRA	QUÉ EVALUAR	CÓMO EVALUAR
F · cara	¿Está caída o torcida?	Pídale sonreír
A · brazo	¿Se cae un brazo al levantar los dos?	Pídale levantar ambos
S · habla	¿Se le arrastra la voz?	Pídale repetir una frase
T · tiempo	Anote la hora de inicio	Llame al 131 ya

QUÉ HACER Marque 131 · Anote la hora exacta de inicio · Acueste con la cabeza más alta · **No dé comida, bebida ni medicamentos** · No le dé aspirina sin confirmación médica (algunos ACV son por sangrado).

Cada minuto cuenta: el tratamiento tiene ventanas de 4,5 h para trombolisis y 6 h para trombectomía.

🫁 DIFICULTAD RESPIRATORIA SEVERA

- No puede hablar por frases completas por falta de aire
- Labios o uñas **morados** (cianosis)
- Pecho se hunde al respirar (especialmente en niños)
- Quejido, aleteo nasal, tiraje
- Crisis de asma que no responde al inhalador
- Ahogo súbito sin explicación

🤕 TRAUMATISMOS GRAVES

- Caída desde altura (>1 m niños, >2 m adultos)
- Accidente vehicular con heridos · atropellos
- Golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento, vómitos o confusión
- Fractura expuesta (hueso visible)
- Hemorragia abundante que no cede con presión directa
- Herida profunda con objeto incrustado (**no retirarlo**, fijarlo y esperar)
- Quemaduras extensas o eléctricas

🌀 PÉRDIDA DE CONCIENCIA O CONVULSIONES

Convulsión

1. No sujete a la persona ni le meta nada en la boca
2. Protéjala de golpes (apártela de muebles, almohada bajo la cabeza)
3. Poner de lado (posición lateral de seguridad) al terminar
4. Cronometre la duración
5. Llame al 131 si dura >5 min, son varias seguidas, es primera vez, hay fiebre alta, golpe previo o no respira bien al terminar

Pérdida de conciencia

Verifique respiración. Si no respira → RCP + 131. Si respira sin responder → posición lateral + 131.

🩸 SANGRADO ABUNDANTE

- Sangrado arterial (a chorros, rojo brillante)
- No cede tras 10 min de presión directa
- Vómitos con sangre · deposiciones con sangre abundante
- Sangrado vaginal con embarazo
- Hemorragia nasal que no cede en 20 min

Mientras llega la ambulancia: presión directa firme con paño limpio · zona elevada si es posible · no retirar objetos enterrados.

🤱 EMERGENCIAS DEL EMBARAZO

- Sangrado vaginal abundante
- Pérdida de líquido amniótico antes de las 37 semanas
- Dolor abdominal intenso
- Dolor de cabeza fuerte + visión borrosa + hinchazón (sospecha preeclampsia)
- Sin movimientos fetales >12h (tercer trimestre)
- Contracciones regulares antes de las 37 semanas

👶 EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

Lactantes <3 meses

- Fiebre sobre 38°C (cualquier fiebre)
- Rechazo alimentario total · llanto inconsolable
- Dificultad respiratoria · color pálido o azulado

Niños en general

- Dificultad respiratoria, quejido, tiraje
- Decaimiento importante
- Vómitos persistentes con bilis o sangre
- Convulsiones (primera vez o con fiebre)
- Erupción que **no desaparece al presionar** (sospecha meningococo)
- Deshidratación (boca seca, no orina en 8h)

🧪 INTOXICACIONES

- Medicamentos, venenos, detergentes, pesticidas, plantas
- Mariscos con síntomas de marea roja (hormigueo labios, parálisis)
- Monóxido de carbono (estufas mal ventiladas): dolor de cabeza, náuseas, somnolencia
- Picadura de araña de rincón con síntomas
- Mordedura de serpiente

QUÉ HACER Llame al 131 · Llame al **CITUC 22 635 3800** (24/7, gratuito) · **No provoque vómitos** a menos que se lo indiquen · Identifique la sustancia, la cantidad y hace cuánto · Lleve el envase al hospital.

🔥 QUEMADURAS GRAVES

Llame al 131 si es extensa (>palma de la mano = 1% SCT), en cara, manos, genitales, pliegues o pies, eléctrica, química, por fuego directo, profunda (piel blanca o negra, sin dolor) o si la persona respiró humo.

Mientras llega: enfríe con **agua corriente** 15–20 min. No hielo, no pasta dental, no mantequilla, no reviente ampollas. Cubra con paño limpio húmedo.

🕷️ ARAÑA DE RINCÓN (LOXOSCELES)

Llamar si después de una mordedura aparece: dolor creciente 2–6 h · mancha violácea u "ojo de buey" · fiebre · orina color coca-cola · decaimiento · ictericia.

🌊 INTOXICACIÓN POR MARISCOS (MAREA ROJA)

Hormigueo en labios/lengua · adormecimiento · dificultad para hablar o tragar · debilidad muscular · parálisis ascendente.

QUÉ DECIR CUANDO LLAME AL 131

1. **Dónde está** (dirección exacta, puntos de referencia)
2. **Qué pasa** (síntomas principales en 1–2 frases)
3. **Edad y estado** (consciente, respira, sangra)
4. **Número del que llama** (por si se corta)
5. **No cuelgue** hasta que el operador lo indique

NÚMEROS ÚTILES EN PARALELO

SAMU	131
Bomberos	132
Carabineros	133
CITUC · intoxicaciones	22 635 3800
Salud Responde	600 360 7777

Material educativo basado en criterios oficiales del MINSAL y sociedades médicas. Ante cualquier duda, siempre es mejor llamar al 131 y preguntar.