

1. $X = (0.7681, -0.189, -0.6549)^t$

2. A última linha do sistema triangular é nula, portanto é satisfeita para qualquer valor de z , o que significa que o conjunto de soluções do sistema linear é infinito e está definido por:

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = \frac{1}{16}(z + 13); y = \frac{1}{8}(11z - 17) \right\}$$

3. Há necessidade de troca da primeira e terceira linhas.

$(x, y, z) = (10/7, -5/3, 9/5) \approx (1.423, -1.667, 1.800)$, usando 4 dígitos e arredondamento.

4.

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; U = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (a) (i) $X = (6/5, -1/5)^t$
 (ii) $X = (-3/5, -2/5)^t$

(b)

$$LU \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} | & | \\ d_1 & d_2 \\ | & | \end{bmatrix}}_{D=A^{-1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | \\ I_1 & I_2 \\ | & | \end{bmatrix}}_I$$

onde

$$d_1 = \begin{bmatrix} d_{11} \\ d_{21} \end{bmatrix}; d_2 = \begin{bmatrix} d_{12} \\ d_{22} \end{bmatrix};$$

$$I_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}; I_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Assim, resolvemos 4 sistemas:

$$LUd_1 = I_1 \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_1=y_1} \begin{cases} Ly_1 = I_1 & (1) \Rightarrow \text{Acho } y_1 \\ Ud_1 = y_1 & (2) \Rightarrow \text{Acho } d_1 \end{cases}.$$

$$d_1 = \begin{bmatrix} 1/5 \\ -1/5 \end{bmatrix}.$$

$$LUd_2 = I_2 \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_2=y_2} \begin{cases} Ly_2 = I_2 & (3) \Rightarrow \text{Acho } y_2 \\ Ud_2 = y_2 & (4) \Rightarrow \text{Acho } d_2 \end{cases}.$$

$$d_2 = \begin{bmatrix} 4/5 \\ 1/5 \end{bmatrix}.$$

Logo,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 4/5 \\ -1/5 & 1/5 \end{bmatrix}.$$

5. (a)

$$LU \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ d_1 & d_2 & d_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}}_{D=A^{-1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ I_1 & I_2 & I_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}}_I$$

onde

$$d_1 = \begin{bmatrix} d_{11} \\ d_{21} \\ d_{31} \end{bmatrix}; d_2 = \begin{bmatrix} d_{12} \\ d_{22} \\ d_{32} \end{bmatrix}; d_3 = \begin{bmatrix} d_{13} \\ d_{23} \\ d_{33} \end{bmatrix};$$

$$I_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; I_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; I_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Assim, resolvemos 6 sistemas:

$$\begin{aligned}
 LUd_1 = I_1 & \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_1=y_1} \left\{ \begin{array}{ll} Ly_1 = I_1 & (1) \Rightarrow \text{Acho } y_1 \\ Ud_1 = y_1 & (2) \Rightarrow \text{Acho } d_1 \end{array} \right. . \\
 LUd_2 = I_2 & \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_2=y_2} \left\{ \begin{array}{ll} Ly_2 = I_2 & (3) \Rightarrow \text{Acho } y_2 \\ Ud_2 = y_2 & (4) \Rightarrow \text{Acho } d_2 \end{array} \right. . \\
 LUd_3 = I_3 & \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_3=y_3} \left\{ \begin{array}{ll} Ly_3 = I_3 & (5) \Rightarrow \text{Acho } y_3 \\ Ud_3 = y_3 & (6) \Rightarrow \text{Acho } d_3 \end{array} \right. .
 \end{aligned}$$

Assim,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ d_1 & d_2 & d_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$LU \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ d_1 & d_2 & d_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}}_{D=A^{-1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} | & | & | \\ P_1 & P_2 & P_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}}_P$$

onde

$$d_1 = \begin{bmatrix} d_{11} \\ d_{21} \\ d_{31} \end{bmatrix} ; d_2 = \begin{bmatrix} d_{12} \\ d_{22} \\ d_{32} \end{bmatrix} ; d_3 = \begin{bmatrix} d_{13} \\ d_{23} \\ d_{33} \end{bmatrix} ;$$

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} ; P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} ; P_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} .$$

Assim, resolvemos 6 sistemas:

$$LUd_1 = P_1 \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_1=y_1} \left\{ \begin{array}{ll} Ly_1 = P_1 & (1) \Rightarrow \text{Acho } y_1 \\ Ud_1 = y_1 & (2) \Rightarrow \text{Acho } d_1 \end{array} \right. .$$

$$LUd_2 = P_2 \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_2=y_2} \left\{ \begin{array}{l} Ly_2 = P_2 \quad (3) \Rightarrow \text{Acho } y_2 \\ Ud_2 = y_2 \quad (4) \Rightarrow \text{Acho } d_2 \end{array} \right.$$

$$LUd_3 = P_3 \underbrace{\Rightarrow}_{Ud_3=y_3} \left\{ \begin{array}{l} Ly_3 = P_3 \quad (5) \Rightarrow \text{Acho } y_3 \\ Ud_3 = y_3 \quad (6) \Rightarrow \text{Acho } d_3 \end{array} \right.$$

Assim,

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} | & | & | \\ d_1 & d_2 & d_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

6. $X = (4/7, -1/14, -5/14)^t$

7. (a) $X = (-0.8780, -1.4390, -2.2195, 2.2195)$