

Cálculo Numérico - IME/UERJ
Gabarito - Lista de Exercícios 3
Sistemas Lineares - Métodos diretos e iterativos

1. (a) (i) $X = (6/5, -1/5)^t$;
(ii) $X = (-3/5, -2/5)^t$;
(b)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 4/5 \\ -1/5 & 1/5 \end{bmatrix}.$$

Primeira maneira:

Sabemos que

$$UU^{-1} = I$$

Como a inversa de uma matriz triangular superior também é triangular superior, logo,

$$U^{-1} = C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ 0 & c_{22} \end{bmatrix}$$

Assim,

$$UU^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ 0 & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De onde tiramos:

$$c_{11} = 1$$

$$c_{12} - 4c_{22} = 0$$

$$5c_{22} = 1 \Rightarrow c_{22} = 1/5 \Rightarrow c_{12} = 4/5$$

Logo,

$$U^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 4/5 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix}$$

Analogamente,

$$LL^{-1} = I$$

A inversa de uma matriz triangular inferior também é triangular inferior. Neste caso,

$$L^{-1} = D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ d_{21} & 1 \end{bmatrix}$$

Assim,

$$LL^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ d_{21} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

De onde tiramos:

$$d_{21} = -1$$

$$L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sabemos que **sem pivoteamento parcial**:

$$A = LU \Rightarrow A^{-1} = (LU)^{-1} \Rightarrow A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$$

Então,

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 4/5 \\ 0 & 1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 4/5 \\ -1/5 & 1/5 \end{bmatrix}$$

Segunda maneira: Usando forma escalonada por linhas para achar as inversas de L e U .

Assim,

$$A = LU \Rightarrow A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$$

Cálculo de U^{-1} :

$$U \mid I = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \end{array}$$

pivô = $a_{22} = 5$;

$$m_{12} = \frac{a_{12}}{a_{22}} = -\frac{4}{5} \Rightarrow L_1 \leftarrow L_1 + \frac{4}{5}L_2$$

$$U^{(1)} \mid D^{(1)} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 4/5 \\ 0 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \end{array}$$

Dividindo L_2 por 5, obtemos:

$$I \mid U^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 4/5 \\ 0 & 1 & 0 & 1/5 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \end{array}$$

Cálculo de L^{-1} :

$$L \mid I = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \end{array}$$

pivô = $a_{11} = 1$;

$$m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = 1 \Rightarrow L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$$I \mid L^{-1} = \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1 \\ L_2 \end{array}$$

Portanto,

$$A^{-1} = U^{-1}L^{-1} = \left[\begin{array}{cc} 1 & 4/5 \\ 0 & 1/5 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} 1/5 & 4/5 \\ -1/5 & 1/5 \end{array} \right]$$

2. (a)

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(b) Sim. Resolver usando pivoteamento parcial.

3. $X = (6/5, -1, 6/5)^t$;

4. A última linha do sistema triangular é nula, portanto é satisfeita para qualquer valor de z , o que significa que o conjunto de soluções do sistema linear é infinito e está definido por:

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = \frac{1}{16}(z + 13); y = \frac{1}{8}(11z - 17) \right\}$$

5. Há necessidade de troca da primeira e terceira linhas.

$(x, y, z) = (10/7, -5/3, 9/5) \approx (1.423, -1.667, 1.800)$, usando 4 dígitos e arredondamento.

6. (a) $X = (0.3906, 1.2031)$;

(b) $X = (0.4023, 1.2012)$;

7. (a) Sim.

(b) $X = (0.3636, 0.4545, 0.4545, 0.3636)^t$

8. Para garantir a convergência do método, devemos efetuar trocas de linhas no sistema para satisfazer o Critério das Linhas, no caso do método de Gauss-Jacobi. Após as trocas das linhas 1 e 3, e em seguida das linhas 2 e 3, obtemos o sistema:

$$\begin{cases} 2.1x + y + z = 3 \\ x - 3y + z = 5 \\ 2y + 5z = 9 \end{cases}$$

onde:

$$\alpha_1 = \frac{|1| + |1|}{|2.1|} = \frac{2}{2.1} \approx 0.9523 < 1$$

$$\alpha_2 = \frac{|1| + |1|}{|-3|} = \frac{2}{3} \approx 0.6667 < 1$$

$$\alpha_3 = \frac{|0| + |2|}{|5|} = \frac{2}{5} \approx 0.4 < 1$$

$$\max\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 0.9523 < 1$$

Logo, o Critério das Linhas é satisfeito.

Resolvendo o sistema pelo método de Gauss-Jacobi, uma primeira aproximação $X^{(1)}$, partindo de $X^{(0)} = (0, 0, 0)^t$, é dada por:

$$X^{(1)} = (1.4286, -1.6667, 1.8000)^t.$$

9. (a) $\alpha_1 = \frac{|2| + |-1| + |0|}{|1|} = \frac{2}{2.1} = 3 > 1 \Rightarrow$ Não satisfaz o Critério das Linhas.
- (b) $\beta_1 = \alpha_1 = 3 > 1 \Rightarrow$ Não satisfaz o Critério de Sassenfeld.
- (c) Resolvendo o sistema a partir de $X^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$, não há convergência em nenhum dos métodos.
- (d) Permutando-se as duas primeiras equações para o sistema, o Critério de Sassenfeld é satisfeito (verifique).
- (e) Resolvendo o sistema do item (d) a partir de $X^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^t$, obtemos a solução:

$$X^* = (0.9052, 0.8150, 1.5413, 1.2706)^t.$$

10. $k = 4$.