



FONDATION
POUR LE
TRI-NATIONAL
DELTA
SANGHA



Séminaire de clôture du projet CAPRO_TNS – Présentation des résultats cartographiques

Évaluation spatio-temporelle de l'empreinte de la
cacaoculture sur la déforestation et la dégradation
forestière dans la périphérie du TNS



Présenté par :

DA SILVA Rodrigue

Du 26 au 27 mars 2026, Lobéké/Yaoundé



NOTRE ZONE D'ETUDE: le TNS



Le Tri-National de la Sangha c'est :

-Un ensemble de 3 **parcs nationaux limitrophes** (Lobéké, Nouabalé-Ndoki, Dzanga-Ndoki) s'étalant sur **trois pays différents** (Cameroun, Congo, RCA) et leurs périphéries.

-**4 405 884 ha** dont 755 500 ha de parcs nationaux, 333 400 ha de réserves spéciales et 1 787 950 ha de zones périphériques où les activités économiques et habitations sont autorisées mais très restreintes



Axe 2 du Projet CAPRO_TNS et cartographie

En décembre 2023, la Fondation pour le Tri-National de la Sangha (FTNS) a initié le Projet de recherche CAPRO_TNS dans le cadre du programme RESSAC piloté par le CIFOR-ICRAF avec le financement de l'Union européenne. Le projet portant sur « la problématique de l'économie cacaoyère à l'interface des aires protégées dans le Tri-National de la Sangha » est divisé en 5 axes directeurs :

01

EFFECTUER UNE REVUE SYSTEMATIQUE DE LA LITTERATURE ET FAIRE UNE META-ANALYSE RELATIVE AUX POSSIBILITES DE CONCILIER L'ECONOMIE CACAORYERE ET LA CONSERVATION DE L' ENVIRONNEMENT

02

FAIRE L'ETAT DES LIEUX DE LA CACAOCULTURE DANS LE TNS ET EVALUER LA DEFORESTATION ET LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT IMPUTABLE A CETTE CULTURE

03

IDENTIFIER LES INTERVENANTS DE LA FILIERE ET DOCUMENTER LEURS PRATIQUES ET LES JEUX D'ACTEURS DANS LE CADRE DE LA GOUVERNANCE ACTUELLE DE LA FILIERE CACAOCULTURE

04

DEVELOPPER DES INDICATEURS PERMETTANT D'EVALUER LES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA CACAOCULTURE SUR LES POPULATIONS VULNERABLES

05

EVALUER LA COHERENCE DES PRATIQUES DE CACAOCULTURE DANS LE TNS PAR RAPPORT A LA REGLEMENTATION DE L'UNION EUROPEENNE SUR LA DEFORESTATION

Le deuxième axe demande une identification précise des espaces cultivés et forestiers afin de pouvoir établir un suivi correct de la cacaoculture et de ses conséquences. C'est pourquoi une cartographie de la cacao-culture réalisée à l'aide d'analyses d'images satellitaires temporelles dans le Tri-National est essentielle.

Le Projet CAPRO_TNS fait appel à une multitude de domaines scientifiques différents : parmi eux, les tâches cartographiques de l'axe 2 sont réparties en trois phases principales au cours de l'année (voir frise ci-contre)

02

02/2025 - 05/2025
Travaux de terrain et d'acquisition des données

06/2025 - 08/2025
Traitement des données post-terrain et rédaction des articles

09/2025 - 12/2025
Valorisation des résultats



« Quelle est l'ampleur de l'évolution de la cacaoculture sur la couverture forestière du TNS ? Comment ces changements s'expriment-ils dans l'espace (déforestation, déboisement, dégradation...) et quelles conséquences sur les écosystèmes peuvent-ils laisser présager ? »

I -Dynamique spatiale dans le TNS : déforestation, perte de tree cover et expansion agricole :

- Forêt et déforestation
- Occupation du sol dans le TNS
- Perte de tree cover dans le TNS
- Perspectives futures

II- Cacaoculture autour des aires protégées du TNS

- La cacaoculture dans le TNS aujourd'hui
- Evolution de la cacaoculture dans le TNS : passé, présent et avenir
- Cartes participatives

III- Conclusions : Cacaoculture et perte de tree cover

IV- Recommandations



I- DYNAMIQUES SPATIALES DANS LE TNS : déforestation, perte de tree cover et expansion agricole

FORÊT (Définitions) :


→ La FAO en 2020 et le MINFOF (Cameroun) : « Territoire d'une superficie de + de 0,5 ha, comportant des arbres d'une hauteur minimale de 5 m et un couvert arboré de plus de 10 % » Les terres dont la vocation dominante est agricole ou urbaine sont exclues.

→ Le MEFDD (Congo) en 2020 : Formation autre qu'agricole de + de 0,5 ha, arbres d'une hauteur minimale de 3 m et un couvert arboré de plus de 30 %.

DÉFORESTATION (Définitions) :

→ Le World Resource Institute (site web) : Passage d'une occupation du sol ou d'un usage du sol de type forêt à un autre

Les définitions officielles de forêt et de déforestation = Plus ou moins faciles à appliquer scientifiquement par télédétection selon les régions (ex : Côte d'Ivoire / Cameroun)



Forêts dans le TNS (Schéma)

- A : Vergers/arbres fruitiers/cultures vivrières/ Cacao (+ de 5m d'hauteur d'arbres)
- B : Cacaoculture sous canopée (ou ombrage)
- C : Forêt dense (sous-bois+canopée)



TREE COVER (Définition) :

Pour estimer la déforestation et la dégradation, on calcule le tree cover (couvert d'arbres) par télédétection (étude des images satellitaires):

WRI (site web) → Tout espace boisé composé d'arbres de plus de 5 mètres et d'un couvert de canopée de plus de 30 % à 30 m de résolution fait partie du « tree cover ». Il est mesuré dans le GFR (Global Forest Review) et utilise l'algorithme GFC (Global Forest Change).

- **Le tree cover comprend donc les forêts primaires et secondaires ainsi que les plantations agroforestières les plus recouvertes par la canopée.**

CLASSIFICATION: Occupation du sol et tree cover

Chaque type de sol (sol nu, espaces boisés, eau, bâti, champs ouverts) réfléchit différemment la lumière du soleil: en croisant les bandes spectrales des images satellitaires, on doit donc obtenir une signature différente pour chacun d'entre eux. En classant les pixels une image satellite du TNS en fonction de leur signature spectrale, on obtient une **occupation du sol** du territoire (Figure 1).

Si on reproduit le processus pour une autre date, on pourra comparer les pixels des deux occupations du sol et ainsi estimer **la perte de tree cover** en voyant quelle est la part des pixels « espaces boisés » qui ont changé de signature (Figure 2a et 2b).



Images utilisées pour les classifications :

-Images LANDSAT-8 et 9 : leur faible résolution atténue les ombres le voile atmosphérique. La correction est meilleure que celle de Sentinel-2





Le TNS aujourd'hui :

97 % de forêts
(espaces boisés)

0,65 % de savanes et plaines herbacées
(entre Nola et Salo)

2 % de champs ouverts (entre Nola et Salo, autour de Libongo, Bayanga, Toukoulaka et Pokola)





Figure 1 : Occupation du sol du TNS en 5 classes (2015-2025) à l'aide de l'algorithme de classification SVM


CARTE DES FOYERS DE PERTE DE "TREE COVER" DANS LE TNS (2015-2025)



Sur les 522 km² de perte de "tree cover" entre 2015 et 2025, 495 km² soit environ 95% est due aux activités agricoles. Même si les pertes totales ne représentent que 1,18% du paysage TNS, il s'agit d'environ un quart de la superficie du Parc National de Lobéké. Sur ces 522 km², 203 km² se trouvent dans la zone tampon de l'UNESCO. Les agglomérations de Libongo-Béla (Cameroun), Bayanga (République Centrafricaine), Lindjombé (République Centrafricaine) et Yondo-Yobé (République Centrafricaine) sont les foyers de perte de "tree cover" les plus proches des zones protégées.

Métadonnées:
Carte réalisée par Rodrigue da Silva, le 02/11/2025
SCR: EPSG:32633 - WGS 84 UTM zone 33N

Sources:
- Données images : Mosaïque et classification Landsat 8 du TNS réalisée le 28/10/25 par Loïc Brinel Atiogo et Rodrigue da Silva
- Outils utilisés : QGIS, ArcGIS, Inkscape



Perte de tree cover 2015-2025 :

522 km² ou 52 200 ha soit 1,18 % du TNS ou 25 % du Parc de Lobéké dont 95 % est due à l'expansion des zones agricoles (voir figure 1).

Pokola, Toukoulaka et sa région ainsi que Bayanga, Libongo, Nola et Salo sont les lieux qui ont connu le plus de dégradations sur la période 2015-2025

Figure 2a : Perte de tree cover dans le TNS issue de la diachronie réalisée par l'équipe CAPRO (CAPRO_TNS, 2025) par classification supervisée d'images Landsat 8







Figure 2b : Perte de tree cover autour du parc de Lobéké entre 2000 et 2024 réalisée par Rodrigue DA SILVA à partir des données du Global Forest Change v1.12 (Hansen et al., 2024))






Zoom sur deux régions particulières du TNS 2015-2025 :

Les deux études de cas ont été choisies non pas pour leur proximité avec le parc mais pour leur vulnérabilité à l'expansion agricole.

Nola-Yobè (Nola-Salo), en Centrafrique, et Pokola-Ouessou, au Congo, montrent deux exemples d'expansion agricole dans deux contextes sociaux-politiques différents

Figure 3 : Occupation du sol entre 2016 et 2025 (zoom sur deux des quatre régions d'intérêt → Pokola et Nola-Salo) réalisée à l'aide des images Sentinel-2






Nola-Yobè (RCA) :

- Expansion agricole autour de la savane de Beya (en blanc) et de l'agglomération de Nola
- Expansion agricole autour des routes partant de Nola vers le nord et l'ouest
- Expansion agricole autour des nouvelles bases-vies en pleine forêt dense (Liboko, Yombo, Yobè-Bosso) à l'est

Figure 4a : Diachronie 2016-2025 (Secteur de Nola-Salo)






Nola-Yobè (RCA) :

- Expansion agricole autour de la savane de Beya (en blanc) et de l'agglomération de Nola
- Expansion agricole autour des routes partant de Nola vers le nord et l'ouest
- Expansion agricole autour des nouvelles bases-vies en pleine forêt dense (Liboko, Yombo, Yobè-Bosso) à l'est

Figure 4a : Diachronie 2016-2025 (Secteur de Nola-Salo)





Axe Yokadouma-Moloundou :

-Expansion agricole le long de l'axe routier et autour de Yokadouma

-Surface à vocation agricole (sous agroforêts principalement) doublée entre 1998 et 2024

Figure 5 : Evolution probable des terres agricoles du segment Cameroun entre 1998 et 2024 (CAPRO_TNS, 2025)



PARTIE II: Cacaoculture autour des aires protégées du TNS




Figure 6 : Différences entre cacaocultures (Images du haut : Cacaoculture intensive à Djidoubaye, Côte d'Ivoire ; Images du bas : Cacaoculture traditionnelle extensive sous canopée du TNS à Salapoumbé, Cameroun)




Figure 7 : Variétés et étendue de la cacaoculture dans le monde (ICCO, 2023)

La culture du cacao s'étend sur 3 continents et son système de production varie d'un pays à l'autre :

- Le Cameroun est l'un des principaux producteurs mondiaux, contrairement au Congo ou à la RCA
- Introduction du cacao dans le territoire du paysage TNS après les années 1930 (CNIECG, 2023)




Catégorie	Système	Caractéristiques clés du système	Localisation (s)
Grande plantation	Grande plantation avec fertirrigation	Plantation gérée professionnellement (>100 ha) avec un ou plusieurs gestionnaires et du personnel embauché. Du cacao clonal est cultivé. La saison sèche marquée nécessite l'irrigation. L'engrais est fourni via l'irrigation (c.-à-d. fertirrigation). Le cacao est destiné au marché du vrac. Les rendements varient généralement de 1,5 à 2,5 tonnes ha ⁻¹ .	Équateur : Côte Ouest ; Brésil : S. Bahia, Espírito Santo ; République dominicaine
	Grande plantation non irriguée	Plantation gérée professionnellement (>100ha) avec un ou plusieurs gestionnaires et du personnel embauché. Du cacao clonal est cultivé et des engrais sont utilisés. Il n'y a pas d'irrigation. Les marchés sont le vrac, le cacao fin ou les deux. Les rendements sont généralement supérieurs à 1 tonne ha ⁻¹ .	Indonésie : Java
Plantation moyenne, cultures associées	Cultures associées avec cacao	Ici, la taille totale de l'exploitation varie de 20 à 100 ha. Le système se caractérise par le fait que l'exploitation peut être consacrée à différentes cultures, dont le cacao. De cette façon, l'agriculteur répartit son risque. Rendements entre 600 et 1 000 kg ha ⁻¹ . Le cacao est généralement fermenté et vendu en vrac.	Côte d'Ivoire, Brésil, Équateur
	Culture associées et intercalées avec le cacao	Semblable au système ci-dessus, le principal facteur de différenciation réside dans le fait que dans la partie de l'exploitation où le cacao est cultivé, il est intercalé avec une ou plusieurs cultures, par exemple l'hévéa. Rendements entre 600-1 200 kg ha ⁻¹ . Le cacao est généralement fermenté et vendu en vrac.	Côte d'Ivoire, Brésil, Équateur
Petite exploitation avec cultures intercalaires structurées	Cultures intercalaires bien gérées, non irriguées	Petite exploitation (~1 ha) agroforestière avec cacao clonal et arbres d'ombrages plantés en lignes régulières. La parcelle est fertilisée et les ravageurs/maladies sont contrôlés. Les rendements sont élevés (1,0-1,5 t ha ⁻¹). Le cacao est vendu en vrac (souvent non fermenté, parfois fermenté). Un revenu supplémentaire provient des arbres d'ombrage.	Indonésie, Pérou
	Cultures intercalaires irriguées	Petite exploitation (~1 ha) agroforestière avec cacao clonal et arbres d'ombrage (généralement des cocotiers ou aréquiers) plantés en lignes régulières. L'irrigation est nécessaire car il y a une saison sèche marquée. Le cacao est fermenté et vendu en vrac. Un revenu supplémentaire provient des arbres d'ombrage. Rendements entre 525-950 kg ha ⁻¹ .	Inde
Petite exploitation bien gérée	Plantations plein soleil avec CCN 51	Petites exploitations (généralement <5 ha) qui cultivent du CCN 51 sans ombrage. Des engrais sont utilisés et les rendements sont élevés (souvent supérieurs à 1 t ha ⁻¹). Le cacao est généralement fermenté et vendu en vrac.	Équateur
	Plantation bien gérée sous ombrage léger	Petite exploitation (généralement 1-5 ha). Planté avec des hybrides améliorés et fertilisés. Les ravageurs et les maladies sont contrôlés. Les rendements sont raisonnablement élevés (0,8-1,2 tonne ha ⁻¹). Le cacao est fermenté et vendu en vrac.	Ghana, Côte d'Ivoire
Petite exploitation traditionnelle	Cabruca, exploitation avec système d'ombrage et biodiversité	Petites à moyennes exploitations cultivées sous ombrage d'arbres de forêts résiduelles avec une riche biodiversité. L'intensité élevée de l'ombre explique les rendements souvent modestes (120 – 180 kg ha ⁻¹). Le cacao fermenté ou non est vendu en vrac.	Brésil : Bahia ; Costa Rica ; Cameroun
	Exploitation traditionnelle produisant du cacao fin	Caractérisé par la culture du cacao fin Nacional. Le cacao n'est pas toujours la principale source de revenus des agriculteurs. Il n'y a pas d'application d'engrais et les rendements sont modestes, de l'ordre de 100 à 500 kg ha ⁻¹ . Le marché est celui du cacao fin.	Équateur
	Rustique – gestion limitée	Petite exploitation familiale. Le cacao n'est pas la principale source de revenus. Les variétés cultivées sont traditionnelles. La gestion de l'exploitation est minimale (peu ou pas d'engrais). Les rendements sont faibles (généralement 200-400 kg ha ⁻¹). Le cacao est fermenté et vendu sur le marché en vrac.	Ghana, Côte d'Ivoire

Figure 8 : Tableau des systèmes de production (Daymond et al., 2016)

Cacaoculture dans le TNS (→ Triple comparaison Lescuyer, Jagoret et Daymond) :


- Différente de celles du Centre, Sud et Ouest Cameroun et celles de Côte d'Ivoire et Ghana
- Similaire aux agroforesteries cacaoyères du Brésil et du Costa-Rica
- Production inférieure, moins de moyens (produits phytosanitaires)
- Exploitation traditionnelle sous couvert de canopée et de taille familiale (moins de 10 employés en général)

D'après les PCD et documents économiques congolais, camerounais et centrafricains, le segment Cameroun semble être l'une des rares régions dans le TNS avec une forte tradition cacaoyère et où cette activité prospère toujours (avec Pokola) → **focus sur le segment Cameroun pour évaluer à quel point la déforestation est imputable à la cacaoculture = CHOIX PERTINENT**



COMMENT RECONNAÎTRE LE CACAO SI LE TREE COVER NE SUFFIT PAS :

On utilise là encore les images satellitaires pour estimer les chances d'obtenir une estimation de l'étendue des agroforêts cacaoyères. Chaque bande d'un set d'images couvrant le TNS donne une information précise.



Bande Infra-rouge proche (NIR) :

- Les sols avec une végétation dense en bonne santé auront une valeur plus élevée en NIR
- Les agroforêts sous canopée se détachent un peu des forêts naturelles, plus ombragées



Cacaoculture sous ombrage du TNS :

- Canopée présente, plusieurs strates de couvert pluriannuelles de NIR que les autres cultures mais plus que la forêt (valeur de NIR et de NDVI fortes en saison humide, semblable à celle de la forêt dense en saison sèche)

Dans le segment Cameroun du TNS, la cacaoculture est la principale culture sous canopée mais il peut être judicieux d'effectuer une série temporelle et repérer les espaces dont la valeur de NIR diminue légèrement pour identifier les agroforêts cacaoyères







Image 2: Classification non-supervisée (Classe Forêt dense en noir, classe agroforesterie en gris foncé, classe champs ouverts en gris clair, sol nu / ville en blanc) et échantillons de champs de cacao (entourés en jaune)
Source: Classification à partir des bandes Landsat 8 de février 2024 réalisée par Rodrigue da Silva

DETECTION DU CACAO PAR CLASSIFICATION NON-SUPERVISEE :

- Il y a à première vue une forte corrélation spatiale entre espaces à forte réflectance dans le proche infrarouge et les espaces d'agroforêts où on trouve le cacao
- Lancement d'une nouvelle occupation du sol à l'échelle locale en 4 classes, partiellement inspirée de la carte phytogéographique de Letouzey (1985) : (Forêt primaire, forêt secondaire ou dégradée, champs ouverts et sol nu/bâti) **pour mettre en évidence les agroforêts**
 - Absence d'un nombre suffisants d'échantillons terrain pour lancer une classification supervisée → **classification non-supervisée**
- Lissage si besoin
- Croisement entre les données de la classification non-supervisée et les échantillons de champs de cacao, fournis par le projet BRIDGE
- Correspondance entre les champs de cacao et la classe « forêt secondaire » à plus de 64 % mais le nombre de champs (150) n'est pas suffisant pour entraîner un algorithme de détection de la cacaoculture (pour lequel plusieurs milliers d'échantillons est nécessaire).



DETECTION DU CACAO ET REFLECTANCE PROCHE-INFRA ROUGE :






Figure 9 : Comparaison des zones à réflectance élevée dans le proche-infrarouge avec les résultats de la FAO

Les méthodes les plus efficaces pour distinguer les zones probables de culture de cacao demandent toujours un grand nombre échantillons de vérité-terrain (de l'ordre du milier voire plus). Avec plus de 2000 champs de cacao délimités, les géomaticiens de la FAO ont été capables de coder un algorithme de reconnaissance automatique sur Google Earth Engine. La FTNS ne possédant que 150 champs, nous avons dû nous procurer les résultats de la FAO et les comparer à nos méthodes...





La cacaoculture est la principale culture de rente dans le segment Cameroun du TNS et elle se cultive massivement autour des routes reliant les bassins de production de Yokadouma et Moloundou. Cette culture est aussi présente au segment Congo dans les localités de Pokola, Kabo, Minganga, Toukoulaka, Bene et Mboua, principalement. En Centrafrique, elle commence à peine à s'épanouir

Figure 10 : Carte de répartition potentielle du cacao en 2025, réalisée par l'équipe du projet CAPRO (CAPRO_cTNS, 2025) avec l'aide des données FAO, PARSA et des PDL (Plans locaux de développement)



Le travail de cartographie continue également sur le terrain où il s'informe auprès des populations locales et où il collabore avec les acteurs du Parc National de Lobéké...

Afin d'avoir un portrait de la cacaoculture à une échelle plus fine, on peut procéder également à la cartographie participative. Réalisée sur un segment de la bande agricole du segment Cameroun à proximité du Parc National de Lobéké (Momboué-Mbangoye II), zone fortement cacaoyère à une dizaine de kilomètres des zones protégées, elle permet de récolter les avis des cacaoculteurs des 11 villages concernés. Outre la position approximative des champs de cacao, cette cartographie, permet aussi de localiser les infrastructures, les hameaux, les forêts communautaires et communales, les corridors d'éléphants et d'autres informations utiles à d'autres axes majeurs du projet



Quand les cartes participatives montrent bien que les champs de cacao suivent les fleuves, les pistes et routes et que les cultures vivrières se situent bien au plus près des habitations comme nous le supposions, elles sont doublement biaisées : inconsciemment par le géographe et par le manque de familiarité des villageois avec la cartographie.



III- CACAOCULTURE ET PERTE DE TREE COVER

- La cacaoculture est la première culture de rente dans le segment Cameroun et dans certaines localités du Congo (Pokola, Kabo...)
- La perte de tree cover dans le segment centrafricain ainsi que dans les parties est du segment Congo n'est donc pas due à la cacaoculture mais plus probablement à l'augmentation de la population et des cultures vivrières autour des bases-vies. Il est toutefois important de mentionner que la cacaoculture, bien que peu présente dans la zone, est en progression
- La perte de tree cover dans les villages cacaoyers du segment Congo précède la relance de l'activité cacaoyère en 2014 mais depuis cette date, on remarque une expansion agricole plus soutenue → responsabilité de la cacaoculture probable (même indirectement)
- Nouveaux espaces cacaoyers > Nouvelles pertes de tree cover dans le segment Cameroun : la cacaoculture ne nécessite pas une diminution importante de la densité de canopée puisqu'elle peut pousser sous ombrage
- Au Cameroun, la cacaoculture progresse dans les UFA vers le parc de Lobéké

La cacaoculture et la perte de tree cover sont géographiquement corrélées : les espaces concernés par les deux phénomènes s'étendent autour des axes de transports routiers et fluviaux, dans les bandes agricoles ainsi qu'autour des agglomérations mais l'essentiel de la perte de tree cover du TNS n'est pas à attribuer à la cacaoculture mais à l'agriculture en général. Même dans le segment du TNS où la cacaoculture est réellement présente, l'impact laissé par l'aménagement de ces cultures sur les milieux forestiers n'est pas toujours mis en évidence par le tree cover. S'il y a dégradation dans les champs de cacao sous ombrage, elle n'affecte que trop peu la canopée et le bilan carbone pour être repérable par télédétection (voir les échantillons BRIDGE)



IV-RECOMMANDATIONS

→ *Lancement possible d'un suivi annuel en deux étapes :*

- Possibilité d'un premier suivi simple sur l'ensemble du TNS (croisement des données Global Forest Change et des polygones des champs recensés en République Centrafricaine, au Cameroun par le CICC et au Congo par le programme PARSA)

- Suivi précis réalisé à partir d'une occupation du sol plus locale, conseillé pour chaque zone à haut risque (zone d'expansion rapide et récente de l'agriculture en partie imputable à la cacaoculture hors des zones prévues pour l'agriculture/agroforesterie à proximité des espaces protégés) identifiée à l'aide du premier suivi. Pour 2024-2025, ces zones à haut risque comprennent : Pokola (de Pokola centre au carrefour Ecogarde Djaka), Minganga, Toukoulaka, Bene, Mboua au Congo, ainsi que Libongo, Mokounounou-Kabagna (du carrefour Banana jusqu'à Mokounounou), Lokomo SEBC, Ngulili II (du carrefour Ngulili jusqu'à Djombi Village), Kika (Kika,Zéga,PK27) au Cameroun.

→ *Mise en commun des données géographiques et démographiques de tout le TNS (APDS, PNNN, PNL) :*

-Mise en commun des différentes orthographes d'un même toponyme

-Création d'un nouvel échelon du TNS (cumul de tout le territoire ZPR/Zone tampon UNESCO + Paysage TNS)

→ *Faciliter le contact avec la FAO, le CICC et le WWF et acteurs de la conservation*



MERCI



FONDATION
POUR LE
TRI-NATIONAL
DE LA
SANGHA

