

נספח לפרוטוקול הפעלת לידה - מיזופרוסטול (ציטוטק) - הנחיות לתחילת השימוש במחלקתנו.

התוויות לשימוש:

- לידה ראשונה עד שלישית עם ציון בישופ נמוך.
- אוגמנטציה לאחר בלון – ללא התקדמות.
- ירידת מים צלולים עם כשלון פיטוצין ובישופ נמוך – רק באישור רופא בכיר.
- בתחילת הטיפול נא לתעד לפי קוד 73406R ובסימנים לבחור הפעלת לידה עם Cytotec.

התוויות נגד לשימוש:

- כל התוויות הנגד ללידה נרתיקית.
- רגישות ידועה לפרוסטגלנדינים.
- ניתוח רחמי או קיסרי בעברה.
- חשד למצוקה עוברית.
- דימום חשוד להפרדות שליה.
- הריון תאומים.
- נוכחות צירים תכופים המורגשים ע"י היולדת.

אופן השימוש בציטוטק להשראת לידה:

- המינון של כל קפסולה הינו 25 מק"ג, הטיפול יינתן בבליעה במינון זה.
- ניתן לשימוש במחלקת סיכוני הריון או חדר לידה.
- טרם תחילת הטיפול יש לוודא ניטור ראקטיבי, העדר צירים תכופים ומורגשים ובישופ נמוך.
- יש להדריך את היולדת לדווח לאחות מחלקה עם תחילתם של צירים, דימום או ירידת מים.
- יש לבצע ניטור חוזר לאחר 30 דקות ועד שעתיים מרגע תחילת הטיפול וכן בעת דיווח היולדת על תחילתם של צירים.
- ניתן לתת מינון של 50 מק"ג או להעביר טיפול ל SL באישור רופא בכיר או תורן אחראי, החל ממנה שנייה בלבד.
- הקפסולה תינתן בהפרשים של 4-6 שעות.
- טרם מתן כל מנה יש לבצע הערכה חוזרת כולל ניטור עוברי ובדיקה נרתיקית לבישופ.
- ניתן לחזור על מתן הטיפול עד 6 מנות.
- יש להמתין לפחות 4 שעות מרגע מתן מנת הציטוטק האחרונה ועד למתן פיטוצין.