
Função Par e Ímpar

FUNÇÃO PAR

UMA FUNÇÃO É PAR QUANDO F(-X) = F(X). ISTO SIGNIFICA QUE O VALOR ASSUMIDO PELA FUNÇÃO NOS PONTOS X E -X SÃO IGUAIS. A FUNÇÃO ASSUME VALORES IGUAIS PARA VALORES DE X SIMÉTRICOS.



EXEMPLO

FUNÇÃO F:R⟶R DEFINIDA POR $f(x) = |x|$

x	f(x)	y
-3	$f(x) = \|-3\|$	3
0	$f(x) = \|0\|$	0
3	$f(x) = \|3\|$	3


F(-3) = F(3) = 3, DE FORMA QUE A FUNÇÃO É PAR E SEU GRÁFICO É SIMÉTRICO EM RELAÇÃO AO EIXO Y.

EXEMPLO

FUNÇÃO F:R⟶R DEFINIDA POR $f(x) = x^3$

x	f(x)	y
-1	$f(-1) = (-1)^3$	-1
0	$f(0) = 0^3$	0
1	$f(1) = 1^3$	1

F(-1) = -F(1) = -1, PORTANTO A FUNÇÃO É ÍMPAR E SEU GRÁFICO É SIMÉTRICO EM RELAÇÃO À ORIGEM.



FUNÇÃO ÍMPAR

UMA FUNÇÃO É ÍMPAR QUANDO F(-X) = -F(X). ISTO SIGNIFICA QUE OS VALORES ASSUMIDOS PELA FUNÇÃO SERÃO SIMÉTRICOS TANTO EM RELAÇÃO AO EIXO X, QUANTO EM RELAÇÃO AO EIXO Y.