TABELA DE CONTROLE DIÁRIO DE MEDICAMENTOS

Organize seus horários, evite esquecimentos e garanta o uso seguro da sua medicação.

Identificação do Paciente / Idoso: _____

Médico / Telefone: _____ | **Cuidador / Contato:** _____

Medicamento / Dosagem / Finalidade	Jejum (~06h)	Café da Manhã (~08h)	Almoço (~12h)	Lanche / Tarde (~16h)	Jantar (~19h)	Ao Deitar (~22h)	Como Tomar & Recomendações (Ex: com água, antes da refeição)
Ex: Losartana 50mg (Pressão)	1 comp						Tomar com 1 copo de água pela manhã
Ex: Metformina 850mg (Diabetes)		1 comp			1 comp		Ingerir junto das refeições principais
Ex: Omeprazol 20mg (Estômago)	1 comp						Ingerir em jejum 30 min antes do café
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

REGISTRO DE CHECAGEM SEMANAL (Marque [✓] ao tomar cada dose)

Período / Dia	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Manhã (Jejum / Café)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Tarde (Almoço / Lanche)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Noite (Jantar / Deitar)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

GUIA PRÁTICO DE USO SEGURO E CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Recomendações fundamentais baseadas nos protocolos de saúde e órgãos farmacêuticos para proteger a eficácia dos tratamentos.

1. Cuidados no Uso de Porta-Comprimidos e Organizadores

• **Mantenha no blíster (cartela):** Ao colocar remédios em caixas organizadoras semanais, **não retire o comprimido da embalagem original**. Recorte a cartela ao redor do comprimido mantendo-o lacrado. A exposição ao ar, luz e umidade degrada os princípios ativos e altera a validade.
• **Identificação preservada:** Recortar a cartela garante que o nome do remédio, dosagem e lote continuem visíveis, evitando trocas acidentais.
• **Não coloque líquidos ou refrigerados:** Medicamentos líquidos, xaropes ou que exigem geladeira nunca devem ir para caixas organizadoras.
• **Sistemas separados:** Se houver mais de um idoso na casa, use organizadores de cores totalmente diferentes para impedir confusão.

2. Onde Guardar os Medicamentos em Casa

• **Locais adequados:** Guarde em ambientes secos, frescos, bem ventilados e abrigados da luz direta, como um armário ou gaveta do quarto.
• **Evite Banheiro e Cozinha:** O calor do fogão e a alta umidade do chuveiro alteram a composição química dos medicamentos, reduzindo seu efeito.
• **Medicamentos de Geladeira:** Guarde na **prateleira central** (entre 2°C e 8°C), dentro de um recipiente plástico limpo e longe dos alimentos. *Nunca guarde na porta ou perto do congelador.*

3. Ficha de Emergência e Alergias

Alergias Medicamentosas Conhecidas:

_____

Tipo Sanguíneo: _____ | **Posto de Saúde / UBS de Referência:**

_____

Contato de Emergência 1: _____ (Tel: _____)
Contato de Emergência 2: _____ (Tel: _____)

4. Precauções na Ingestão e Administração

• **Não parta nem triture sem orientação:** Cortar comprimidos sem indicação pode causar doses desiguais. Remédios de liberação prolongada/controlada (siglas ER, XR, AP, SR) **nunca devem ser partidos**, pois isso pode provocar superdosagem fatal.
• **Tome sempre com água:** Evite ingerir remédios com leite, refrigerantes, sucos ou chás quentes, pois podem interferir na absorção do fármaco.
• **Respeite os horários em jejum:** Remédios em jejum devem ser tomados de 30 a 60 minutos antes do café da manhã.
• **Manuseio de cápsulas especiais:** Determinados remédios (como finasterida/dutasterida) não devem ser manuseados por gestantes se esfarelados.

5. Dicas de Ouro para Cuidadores e Familiares

• **Lista Sempre Atualizada:** Mantenha esta tabela fixa na porta da geladeira ou em local de fácil visualização.
• **Use Alarmes e Lembretes:** Programe despertadores no celular para cada horário fixo.
• **Revisão Médica Periódica:** Peça ao médico geriatra ou farmacêutico para revisar todos os remédios em uso (polifarmácia) para eliminar duplicidades ou interações perigosas.
• **Descarte Correto:** Nunca jogue remédios vencidos no lixo comum, pia ou vaso sanitário. Entregue-os em postos de coleta em farmácias ou Unidades Básicas de Saúde (UBS).