Standardized absolute difference (SAD), mean

$\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.001$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.01$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.025$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.05$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.1$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.005$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.05$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.125$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.25$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.5$

p = 0.5

p = 0.2

0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000

N = 20 N = 20 N = 50 N = 50
n_i = S n_i = M n_i = S n_i = M

SAD(ORACLE−A1,ORACLE−A2(1))
SAD(ORACLE−A1,ORACLE−A2)
SAD(PML−A1,PML−A2(1))
SAD(PML−A1,PML−A2)

Standardized absolute difference (SAD), 95th percentile

$\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.001$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.01$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.025$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.05$ | $\sigma_0^2 = 0.1, \sigma_1^2 = 0.1$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.005$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.05$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.125$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.25$ | $\sigma_0^2 = 0.5, \sigma_1^2 = 0.5$

p = 0.5

p = 0.2

0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

N = 20 N = 20 N = 50 N = 50
n_i = S n_i = M n_i = S n_i = M

SAD(ORACLE−A1,ORACLE−A2(1))
SAD(ORACLE−A1,ORACLE−A2)
SAD(PML−A1,PML−A2(1))
SAD(PML−A1,PML−A2)