

# 6

## ARITHMÉTIQUE

### Résumé

D'abord d'intérêt ludique pour les mathématiciens, l'arithmétique a su prendre une importance cruciale dans nos vies avec l'arrivée des ordinateurs et de la cryptologie où l'arithmétique y est centrale. Tour d'horizon de choses connues et de quelques propriétés plus avancées.

### 1 Multiples et diviseurs

#### Définitions

Soient  $n, k \in \mathbb{Z}$  tel qu'il existe  $k' \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = kk'$ . On dit que :

- $k$  est un **diviseur** de  $n$ .
- $n$  est un **multiple** de  $k$ .

**Exemple** On a  $42 = 6 \times 7$  donc 42 est un multiple de 6 et 6 est un diviseur de 42. On dit aussi que 42 est **divisible** par 6 ou que 6 **divise** 42.  
L'ensemble des diviseurs de 42 est  $\{42, 21, 7, 6, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -6, -7, -21, -42\}$ .

**Remarque** Tout nombre entier relatif non nul  $n$  est toujours divisible, au moins, par 1 et lui-même et admet une infinité de multiples :  $n, 2n, 3n, -n, -2n$ , etc.

#### Exercice

1. Déterminer tous les multiples positifs de 7 strictement inférieurs à 60.
2. Déterminer les diviseurs de 100 supérieurs ou égaux à 12.

### Propriété | Somme, différence et produit

Soient  $a, n, m \in \mathbb{Z}$ . Si les entiers  $n$  et  $m$  sont deux multiples de  $a$ , alors la somme  $m + n$ , la différence  $n - m$  et le produit  $nm$  sont aussi des multiples de  $a$ .

### Définition | Nombre premier

Un **nombre premier** est un nombre entier naturel différent de 1 dont les seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même.

**Exemples** ► Donnons quelques nombres premiers :

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31.

► 15 n'est pas premier car  $15 = 3 \times 5$ .

#### Exercice

Soient  $a$  et  $b$  deux entiers naturels tel que  $a^2 - b^2$  est premier.  
Montrer que  $a$  et  $b$  sont consécutifs.

### 2 Parité

#### Définitions

Soit  $n \in \mathbb{Z}$ .

- Si  $n$  est divisible par 2, on dit que  $n$  est **pair**. Il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = 2k$ .
- Sinon,  $n$  est dit **impair**. Il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = 2k + 1$ .

### Propriétés | Somme d'entiers

- La somme de deux entiers **pairs** est un nombre **pair**.
- La somme de deux entiers **impairs** est un nombre **pair**.
- La somme d'un entier **pair** et d'un entier **impair** est un nombre **impair**.

### Propriété | Parité d'un carré

Soit  $n \in \mathbb{Z}$ .

- Si  $n$  est pair, alors  $n^2$  est pair.
- Si  $n$  est impair, alors  $n^2$  est impair.

*Démonstration.* Soit  $n$  un entier relatif.

- Si  $n$  est pair, il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = 2k$ .  
Dans cas,  $n^2 = (2k)^2 = (2k) \times (2k) = 2 \times (2k^2)$  et 2 divise  $n^2$ .
- Si  $n$  est impair, il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $n = 2k + 1$ .  
Dans cas,  $n^2 = (2k + 1)^2 = (2k)^2 + 2 \times (2k) \times 1 + 1^2 = 2 \times 2k^2 + 2 \times 2k + 1 = 2 \times (2k^2 + 2k) + 1$ .  $\square$

### Exercice

Soit  $n \in \mathbb{Z}$ .

1. On suppose que  $n^2$  est un entier pair.
  - a)  $n$  peut-il être impair?
  - b) En déduire la parité de  $n$ .
2. On suppose que  $n^2$  est impair.  
Déterminer la parité de  $n$ .

### Exercice

Soit  $p$  premier différent de 2.

1. Quelle est la parité de  $p$ ?
2. Quelle est la parité de  $p + 1$ ? De  $p - 1$ ?
3. Démontrer que  $p^2 - 1$  est divisible par 4.

### Théorème | $\mathbb{R} \neq \mathbb{Q}$

$\sqrt{2}$  est irrationnel. C'est-à-dire,  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

*Démonstration.* Supposons, **par l'absurde**, que  $\sqrt{2}$  est rationnel. Montrons qu'on arrive à quelque chose d'impossible : une **absurdité**. Ainsi, notre hypothèse sera fausse et on aura montré que  $\sqrt{2}$  est irrationnel.

Si  $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ , alors il existe  $p, q \in \mathbb{Z}^*$  tels que  $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$  et la fraction est irréductible. On peut ainsi

calculer le carré de cette quantité, à savoir  $(\sqrt{2})^2 = \left(\frac{p}{q}\right)^2$  et donc  $p^2 = 2q^2$  est pair.

Par la propriété de parité d'un carré,  $p^2$  est pair donc  $p$  **est pair**.

On peut écrire  $p = 2p'$  où  $p' \in \mathbb{Z}$  et donc  $2 = \frac{4p'^2}{q^2}$ , ce qui implique que  $q^2 = 2p'^2$ .  $q^2$  est pair donc  $q$  **est aussi pair**.

Nous venons de montrer que 2 divise  $p$  et  $q$  donc la fraction  $\frac{p}{q}$  n'est pas irréductible. C'est impossible puisque nous avons supposé le contraire.

Nous obtenons une **absurdité** et donc l'hypothèse sur  $\sqrt{2}$  est fausse. Nous avons démontré **par l'absurde** que  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .  $\square$