

10

LOGARITHME NÉPÉRIEN

Résumé

La dualité entre la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien est centrale dans la résolution de nombreux problèmes comme la modélisation des population, et pour des calculs financiers.

1 Fonctions logarithmes

Définition | Logarithmes de base a

Soit $a > 0$.

La fonction f_a exponentielle de base a admet une fonction réciproque : la fonction **logarithme** \log_a de **base** a .

$$\forall x \in \mathbf{R}, \log_a(a^x) = x$$

$$\forall x \in \mathbf{R}_+^*, a^{\log_a(x)} = x$$

Remarque Toute fonction logarithme est définie sur \mathbf{R}_+^* à valeurs dans \mathbf{R} mais les fonctions exponentielles sont, elles, définies sur \mathbf{R} à valeurs dans \mathbf{R}_+^* .

Exemple L'exemple le plus classique de logarithme est \log_{10} .

$$\blacktriangleright \log_{10}(10000) = 5 \text{ car } 10000 = 10^5.$$

$$\blacktriangleright \log_{10}(0,1) = -1 \text{ car } 0,1 = 10^{-1}.$$

$$\blacktriangleright 10^{\log_{10}(4,2)} = 4,2$$

Exercice

Calculer $\log_{10}(100)$ et $\log_{10}(0,000001)$.

Propriétés

Soit $a > 0$.

$$\blacktriangleright \log_a(1) = 0$$

$$\blacktriangleright \log_a(a) = 1$$

$$\blacktriangleright \forall x, y \in \mathbf{R}_+^*, \log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$$

$$\blacktriangleright \forall x, y \in \mathbf{R}_+^*, \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$

$$\blacktriangleright \forall x \in \mathbf{R}_+^*, \forall y \in \mathbf{R}, \log_a(x^y) = y \log_a(x)$$

Démonstration. On dispose des propriétés de la fonction exponentielle de base a et on utilise la réciprocity entre exponentielle et logarithme. \square

Exemples On peut calculer des logarithmes plus facilement en se ramenant à des valeurs connues.

$$\blacktriangleright \log_{10}(20) = \log_{10}(2 \times 10) = \log_{10}(2) + \log_{10}(10) = \log_{10}(2) + 1 \approx 0,3 + 1 \approx 1,3$$


$$\blacktriangleright \log_{10}(\sqrt{10}) = \log_{10}\left(10^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2} \log_{10}(10) = \frac{1}{2}.$$

2 Logarithme népérien

Définition | Fonction \ln

On appelle **logarithme népérien**, notée \ln , la fonction logarithme de base e définie sur $]0; +\infty[$.

Sa courbe représentative est la symétrie de celle de \exp selon l'axe $y = x$.



Propriétés

On a les propriétés suivantes;

- ▶ $\ln(1) = 0$
- ▶ $\ln(e) = 1$
- ▶ $\forall x, y \in \mathbf{R}_+^*, \ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- ▶ $\forall x, y \in \mathbf{R}_+^*, \ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- ▶ $\forall x \in \mathbf{R}_+^*, \forall y \in \mathbf{R}, \ln(x^y) = y \ln(x)$

Théorème | Dérivabilité

\ln est dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$\forall x > 0, \ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

Remarques ▶ La fonction \ln est donc une primitive de la fonction inverse.

▶ La fonction d'expression $x \ln(x) - x$ est une primitive de \ln sur $]0; +\infty[$.

Corollaire | Variations de \ln

\ln est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Démonstration. Sur $]0; +\infty[$, la fonction inverse est strictement positive. \square

Exercice


Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{2x} - 7 \geq 3$
2. $3 \ln(x) + 1 = 13$
3. $\ln(-4x + 2) > 0$

Propriétés | Limites en $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$



Exercice

Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(-3x)$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x^2 - 7x)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x^2 + 1)$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(-x)^2$

Théorème | Croissances comparées

Soit $n \in \mathbf{N}^*$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$$