

# 3

## LIMITES DE FONCTIONS

### Résumé

L'étude des limites de suites nous a ouvert la voie à l'étude de nouvelles limites : celles des fonctions.

Nous pourrions aborder le comportement asymptotique de courbes et fonctions avancées tout en donnant des résultats de comparaisons très puissants.

Dans toute la suite,  $f, g, h, u$  et  $v$  désigneront des fonctions et  $\ell, x_0, a, \alpha$  des nombres réels.

### 1 Limites d'une fonction


#### 1.1 Comportement en $\pm\infty$

##### Définitions

Soit  $f$  définie sur  $[\alpha; +\infty[$ .


- La **limite de  $f$  en  $+\infty$  est égale à  $\ell$**  si, et seulement si, tout intervalle ouvert contenant  $\ell$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  suffisamment grand.

On note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ .




- La **limite de  $f$  en  $+\infty$  est égale à  $+\infty$**  si, et seulement si, tout intervalle  $]a; +\infty[$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  suffisamment grand.

On note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .



- La **limite de  $f$  en  $+\infty$  est égale à  $-\infty$**  si, et seulement si, tout intervalle  $] -\infty; a[$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  suffisamment grand.

On note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .



**Exemple** Une fonction constante égale à  $\ell$  tend vers  $\ell$  en  $+\infty$  et tend vers  $\ell$  en  $-\infty$ .

**Remarques** ► On peut encore utiliser les deux notations :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell.$$

- On définit de manière similaire la limite de  $f$  en  $-\infty$ .
- On dit que la droite d'équation  $y = \ell$  est une **asymptote horizontale à la courbe** de  $f$  en  $+\infty$  (respectivement en  $-\infty$ ) si, et seulement si,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$  (respectivement  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ).

## Définitions


Soit  $f$  définie sur l'intervalle  $]x_0; x_0 + r[$  ou sur  $]x_0 - r; x_0[$  avec  $r > 0$ .

- La **limite de  $f$  en  $x_0$  est égale à  $\ell$**  si, et seulement si, tout intervalle ouvert contenant  $\ell$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  suffisamment proche de  $x_0$ .

On note  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ .


- La **limite de  $f$  en  $x_0$  est égale à  $+\infty$**  si, et seulement si, tout intervalle  $]a; +\infty[$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  suffisamment proche de  $x_0$ .

On note  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ .



- La **limite de  $f$  en  $x_0$  est égale à  $-\infty$**  si, et seulement si, tout intervalle  $]-\infty; b[$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  suffisamment proche de  $x_0$ .

On note  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ .



**Remarques** ► On parlera de **limite à gauche** quand on approche de  $x_0$  en faisant croître  $x$ . On pourra utiliser les notations suivantes.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x < x_0}} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

- On parlera de **limite à droite** quand on approche de  $x_0$  en faisant décroître  $x$ . On pourra utiliser les notations suivantes.

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$


- On dit que la droite d'équation  $x = x_0$  est une **asymptote verticale à la courbe** de  $f$  en  $x_0$  si, et seulement si,  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$  ou  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$ .

## 2 Opérations sur les limites

## 2.1 Fonctions usuelles

## Propriétés | Limites usuelles


- Si  $f(x) = x^n$  avec  $n \in \mathbf{N}^*$  **pair**, alors :



$$\triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = +\infty$$

$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$


- Si  $f(x) = x^n$  avec  $n \in \mathbf{N}$  **impair**, alors :



$$\triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$$


$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty.$$

► Si  $f(x) = \frac{1}{x^n}$  avec  $n \in \mathbf{N}^*$  **pair**, alors :




$$\begin{aligned} \triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} &= 0 \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} &= 0 \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} &= +\infty \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} &= +\infty. \end{aligned}$$

► Si  $f(x) = \frac{1}{x^n}$  avec  $n \in \mathbf{N}$  **impair**, alors :




$$\begin{aligned} \triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} &= 0 \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} &= 0 \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^n} &= -\infty \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^n} &= +\infty. \end{aligned}$$

► Si  $f(x) = \sqrt{x}$ , alors :



$$\triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

► Si  $f(x) = e^x$ , alors :



$$\begin{aligned} \triangleright \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x &= 0 \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x &= +\infty. \end{aligned}$$

**Remarques** On a aussi les limites suivantes. Soient  $n \neq 0$  et  $a \in \mathbf{R}$ .

$$\begin{aligned} \triangleright \lim_{x \rightarrow a} x^n &= a^n \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} &= \sqrt{a} \text{ pour } a \geq 0 \\ \triangleright \lim_{x \rightarrow a} e^x &= e^a. \end{aligned}$$

## 2.2 Somme, produit et quotient

On considère dans cette section deux fonctions  $f$  et  $g$  définies sur un intervalle  $I$ .

### Théorème | Limite d'une somme

Soient  $\ell$  et  $\ell'$  deux réels.  $a$  peut désigner ici  $+\infty$  ou  $-\infty$ .

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\ell$	$\ell$	$\ell$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	FI

**Exemples** ►  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left( \frac{1}{x} + x^4 \right) = +\infty$ .

►  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^3} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x = e^0 = 1$  donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left( \frac{1}{x^3} + e^x \right) = +\infty$ .

### Théorème | Limite d'un produit

Soient  $\ell$  et  $\ell'$  deux réels.  $a$  peut désigner ici  $+\infty$  ou  $-\infty$ .

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\ell$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\ell'$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x))$	$\ell \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	FI

**Exemples** ►  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$  donc  $\lim_{x \rightarrow -\infty} -6e^{-x} = -\infty$ .

►  $\lim_{x \rightarrow 1} e^x = e$  et  $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{3x^3 - x^2 + 2} = \sqrt{3 - 1 + 2} = 2$  donc  $\lim_{x \rightarrow 1} (e^x \sqrt{3x^3 - x^2 + 2}) = 2e$ .

### Théorème | Limite d'un quotient

Soient  $\ell$  et  $\ell'$  deux réels.  $a$  peut désigner ici  $+\infty$  ou  $-\infty$ .

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\ell$	$\ell$	$\pm\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	FI	FI

Si  $g(x) > 0$  pour tout  $x \in I$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\ell > 0$	$\ell < 0$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$0^+$	$0^+$
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$+\infty$	$-\infty$

Si  $g(x) < 0$  pour tout  $x \in I$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	$\ell > 0$	$\ell < 0$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$0^-$	$0^-$
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$	$-\infty$	$+\infty$

**Exemple**  $\lim_{x \rightarrow 7} \left( 2 - \frac{7}{14-x} \right) = 2 - \frac{7}{14-7} = 1$  et  $\lim_{x \rightarrow 7} (x^2 - x) = 49 + 7 = 56$  donc  
 $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \frac{7}{14-x}}{x^2 - x} = \frac{1}{56}$ .

### 3 Comparaison

On a des résultats similaires aux limites de suites, encore.

### Théorème | Théorème de comparaison

Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions et  $x_0$  telles que pour tout  $x \geq x_0$ ,  $f(x) \leq g(x)$ .

- Si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ .
- Si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$  alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ .

### Théorème | Théorème des gendarmes

Soient  $f$ ,  $g$  et  $h$  trois fonctions et  $x_0$  telles que pour tout  $x \geq x_0$ ,

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x).$$

Si  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \ell$  alors  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \ell$ .

### Exercice

Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(x)}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 7 \sin(x)}{x^2}$ .