Calculatrice : • Durée : 15 minutes

Exercice 1 | 6 points

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, définies sur R.

1.
$$f(x) = 2e^{7x}$$

3.
$$h(x) = e^{4x} \times e^{8x}$$

5.
$$k(x) = (5x - e^x)x^2$$

2.
$$g(x) = e^{-28x} + e^{28x}$$

4.
$$i(x) = (2 + x)e^x$$

6.
$$l(x) = \frac{1}{1 + e^{5x}}$$

Correction

1.
$$f'(x) = 2 \times 7e^{7x} = 14e^{7x}$$

2.
$$g'(x) = -28e^{-28x} + 28e^{28x}$$

3.
$$h(x) = e^{4x+8x} = e^{12x} \text{ donc } h'(x) = 12e^{12x}$$
.

4. C'est la dérivée d'un produit :

$$i'(x) = 1 \times e^x + e^x(2 + x) = (3 + x)e^x$$

5. C'est encore la dérivée d'un produit :

$$k'(x) = (5 - e^x)x^2 + 2x(5x - e^x) = 15x^2 - (x^2 + 2x)e^x$$

6. C'est la dérivée d'un quotient :

$$l'(x) = \frac{-5e^{5x}}{(1 + e^{5x})^2}$$