

# 7

## VECTEURS DU PLAN

### Résumé

Nous allons découvrir les vecteurs dans un cadre simple : le plan. Trouvant ses origines en physique pour représenter des déplacements ou des forces, tout bon physicien ou ingénieur manipule des vecteurs quotidiennement. Les applications proposées ici sont des critères de colinéarité de points ou des calculs de coordonnées de points particuliers.


### 1 Translations et vecteurs

#### Définition | Translation


Soient  $M$  et  $M'$  deux points du plan.

Pour tout point  $N$  du plan, on construit l'unique point  $N'$  tel que  $MM'N'N$  soit un parallélogramme (éventuellement aplati). On dit alors que le point  $N'$  est l'image du point  $N$  par la translation qui transforme  $M$  en  $M'$ . Cette translation est aussi appelée **translation de vecteur**  $\overrightarrow{MM'}$ .

**Exemples** ► On observe une première translation de vecteur  $\overrightarrow{MM'}$  en dessous. On note  $\overrightarrow{MM'}$  à l'aide d'une flèche qui part de  $M$  et va en  $M'$ .



► Dans le cas particulier où  $M$ ,  $M'$  et  $N$  sont alignés, nous avons la configuration suivante, où la parallélogramme est plat.



**Remarque** Le vecteur  $\overrightarrow{MM'}$  matérialise le **déplacement rectiligne** de  $M$  vers  $M'$  caractérisé par une **direction**, celle de  $(MM')$ , un **sens**, celui de  $M$  vers  $M'$ , et sa **norme**  $\|\vec{u}\|$ , la longueur  $MM'$ .

### 2 Égalité de deux vecteurs

#### Définition

Lorsque la translation qui transforme  $M$  en  $M'$  transforme aussi  $N$  en  $N'$ , on dit que les vecteurs  $\overrightarrow{MM'}$  et  $\overrightarrow{NN'}$  sont égaux et on le note  $\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'}$ .


**Remarque** Si  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$  ou  $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CD}$  alors  $AB = CD$ .

#### Propriété


$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'}$  si, et seulement si, le quadrilatère  $MM'N'N$  est un parallélogramme (éventuellement aplati).

**Démonstration.** C'est immédiat par définition d'un vecteur et propriétés d'un parallélogramme. □

**Exemple**  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CD}$  sont égaux alors que  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{CE}$  ne le sont pas.



**Remarque** On considère la situation suivante.



Il y a une infinité de vecteurs égaux à  $\overrightarrow{AB}$ , comme, entre autres,  $\overrightarrow{CD}$  ou  $\overrightarrow{EF}$ . On peut le noter  $\vec{u}$  et on dit que  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{CD}$  et  $\overrightarrow{EF}$  sont des **représentants** du vecteur  $\vec{u}$ .

### Définition | Vecteur nul


La translation qui transforme le point  $M$  en lui-même est la translation de vecteur  $\overrightarrow{MM}$ . Le vecteur  $\overrightarrow{MM}$  est appelé **vecteur nul** et est noté  $\vec{0}$ . Ainsi,  $\overrightarrow{MM} = \vec{0}$ .

## 3 Somme de vecteurs

### Définition | Vecteur somme

La **somme** de deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est le vecteur associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteur  $\vec{u}$  puis de vecteur  $\vec{v}$ . On note ce vecteur  $\vec{u} + \vec{v}$ .

**Exemple** Voici une illustration de la somme de deux vecteurs.



### Théorème | Relation de Chasles


Pour tous points  $A$ ,  $B$  et  $C$ , on a  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .

*Démonstration.* Découle de la définition de la somme de deux vecteurs.  $\square$


### Définition | Opposé

Soit  $\overrightarrow{AB}$  un vecteur. Alors le vecteur  $\overrightarrow{BA}$  est appelé **opposé** du vecteur  $\overrightarrow{AB}$  et on le note aussi  $-\overrightarrow{AB}$ .

**Exemples** ► On visualise l'opposé de  $\overrightarrow{AB}$ .



► On peut aussi représenter l'opposé d'un vecteur  $\vec{u}$ .



### Propriété

Soit  $\overrightarrow{AB}$  un vecteur. Alors  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} = \vec{0}$ .

*Démonstration.*  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$  Ainsi, par la relation de Chasles,  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$ .  $\square$


## 4 Produit par un réel

### Définition


Soit  $\vec{u}$  un vecteur non-nul et  $k \in \mathbb{R}^*$ . Le vecteur  $k\vec{u}$  est le vecteur qui a :

- la même direction que  $\vec{u}$
- le même sens que  $\vec{u}$  si  $k > 0$ , le sens contraire si  $k < 0$
- pour norme  $k\|\vec{u}\|$  si  $k > 0$ ,  $-k\|\vec{u}\|$  si  $k < 0$

**Exemples** ►  $\|-2\vec{u}\| = 2\|\vec{u}\|$



►  $\|\frac{3}{4}\vec{u}\| = \frac{3}{4}\|\vec{u}\|$



### Propriétés

Soient  $\vec{u}, \vec{v}$  deux vecteurs et  $k, k'$  des réels.

- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$
- $k\vec{u} = \vec{0}$  si, et seulement si,  $k = 0$  ou  $\vec{u} = \vec{0}$

## 5 Vecteurs et coordonnées

### 5.1 Coordonnées d'un vecteurs

#### Définitions | Repère et base orthonormée

Soient  $O$  un point et deux vecteurs  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  dont les directions sont perpendiculaires et dont les normes sont égales à 1.

On dit que  $(\vec{i}, \vec{j})$  est une **base orthonormée** du plan et que  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  est un **repère orthonormé** du plan.


#### Propriété | Décomposition dans une base orthonormée

Pour tout vecteur  $\vec{u}$ , il existe  $x$  et  $y$  deux réels, uniques, tels que  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .

**Démonstration.** Soit  $\vec{u}$  un vecteur. Il existe un unique point  $M$  tel que  $\overrightarrow{OM} = \vec{u}$ . Les coordonnées  $(x; y)$  de  $M$  dans le repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  sont uniques et  $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ .  $\square$

**Remarque** On donne souvent les **coordonnées** de  $\vec{u}$  dans la base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j})$  en écrivant  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ .

**Exemple** Regardons  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ .



## Exercice

On se place dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

1. Représenter les vecteurs  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ .
2. Soit le point  $A(1; 1)$ . Placer  $B$  tel que  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

**Remarque** Deux vecteurs sont égaux si, et seulement si, leurs coordonnées dans une même base orthonormée sont égales.

## 5.2 Opérations sur les vecteurs

### Propriété | Somme

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  deux vecteurs dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Alors,  $\vec{u} + \vec{v}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$ .

*Démonstration.* On décompose  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ .

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

et

$$\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$$

Ainsi,  $\vec{u} + \vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + x'\vec{i} + y'\vec{j} = (x + x')\vec{i} + (y + y')\vec{j}$ . □

### Propriété | Produit par un réel

Soient  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  un vecteur dans le repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  et  $k$  un réel.

Alors,  $k\vec{u}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$ .

*Démonstration.* Comme pour la démonstration précédente,  $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$  donc  $k\vec{u} = kx\vec{i} + ky\vec{j}$ . □

## 5.3 Conséquences

### Théorème

Soient  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  deux points dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  du plan.

Le vecteur  $\vec{AB}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$  dans la base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j})$ .

*Démonstration.* Remarquons d'abord que  $O$  a pour coordonnées  $(0; 0)$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Ensuite, regardons  $\vec{OA}$  et  $\vec{OB}$ . Dans la base orthonormée  $(\vec{i}, \vec{j})$ ,  $\vec{OA}$  se décompose en

$$\vec{OA} = x_A\vec{i} + y_A\vec{j}$$

et de même,


$$\vec{OB} = x_B\vec{i} + y_B\vec{j}.$$

Ainsi, nous avons  $\vec{OA} \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$  et  $\vec{OB} \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$ .

Donc, par la relation de Chasles,  $\vec{AB} = \vec{AO} + \vec{OB} = \vec{OB} - \vec{OA}$ .

Finalement, le calcul des coordonnées de  $\vec{AB}$  se fait grâce aux propriétés sur les coordonnées vues précédemment.  $\vec{AB}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$ . □

**Exemples** ► On visualise le résultat précédent sur le repère suivant :




► Soient  $A(1; 4)$  et  $B(8; -1)$ . Alors  $\vec{AB}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} 8 - 1 \\ (-1) - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$ .

### Théorème | Norme d'un vecteur

Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ . Alors, on a :

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

*Démonstration.* On appelle  $A$  le point du plan tel que  $\vec{u} = \vec{OA}$  et  $B$  le point tel que  $x\vec{i} = \vec{OB}$ . Le triangle  $OBA$  ainsi formé est un triangle en  $B$  tel que  $OA = \|\vec{u}\|$ ,  $OB = x$  et  $BA = y$ .



Par le théorème de Pythagore, nous avons :

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$$

et donc,

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

car  $\|\vec{u}\| \geq 0$ . □

**Exemple** Si  $\vec{AB} \begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$ , alors la norme de  $\vec{AB}$  est égale à  $\sqrt{7^2 + (-5)^2} = \sqrt{74}$ .

### Corollaire | Distance entre deux points

Soient  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  deux points du plan, dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Alors la distance  $AB$  est égale à  $\sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .

*Démonstration.* Le vecteur  $\vec{AB}$  a pour coordonnées  $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$  dans la base  $(\vec{i}, \vec{j})$ .

On peut donc utiliser le théorème précédent pour obtenir  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ . □

**Exemple** Soient  $A(10; 2)$  et  $B(-2; 4)$ .


$$AB = \sqrt{((-2) - 10)^2 + (4 - 2)^2} = \sqrt{(-12)^2 + 2^2} = \sqrt{148}$$

### Propriété | Milieu d'un segment

Soient  $A(x_A; y_A)$  et  $B(x_B; y_B)$  deux points du plan, dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

Alors le milieu du segment  $[A, B]$  a pour coordonnées  $\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)$ .

*Démonstration.* Notons  $M$  le milieu de  $[A, B]$ . Partant de  $A$ , l'image de la translation de vecteur  $\frac{1}{2}\vec{AB}$  est  $M$ . Rappelons que  $\vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$  a pour coordonnées  $\frac{1}{2}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_B - x_A}{2} \\ \frac{y_B - y_A}{2} \end{pmatrix}$ .



Enfin, les coordonnées de  $M$  sont donc  $\left(x_A + \frac{x_B - x_A}{2}; y_A + \frac{y_B - y_A}{2}\right) = \left(\frac{x_B + x_A}{2}; \frac{y_B + y_A}{2}\right)$ . □