

Tratamiento:

Metformina



Ajustar dosis a dosis máxima:

Dosis máximas recomendada (sujeta a criterio del médico)

1000 (mg/día)

Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.

y combinar con un:

iSGLT2

Si se pretende reducir progresión del deterioro de TFGe y albuminuria (cana, dapa, empa)

Dosis máximas recomendada

Canagliflozina 100 (mg/día)

Dapagliflozina 10 (mg/día)

Empagliflozina 25 (mg/día)

Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.

arGLP1

Si se pretende reducir progresión de albuminuria (lira, sema, dula)

Dosis máximas recomendada

Liraglutida 1.8 (mg/día)

Lixisenatida 20 (mg/día)

Dulaglutida 1.5 (mg/día)

Semaglutida 1.0 (mg/día)

Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.

iDPP41

Ajustar dosis

Dosis máximas recomendada

Alogliptina 12.5 (mg/día)

Gemigliptina 50 (mg/día)

Linagliptina 5 (mg/día)

Sitagliptina 50 (mg/día)

Saxagliptina 2.5 (mg/día)

Vildagliptina 50 (mg/día)

Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.