

Tratamiento:

# Metformina



Ajustar dosis a dosis máxima:

Dosis máximas recomendada

**2000 (mg/día)**

*Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.*

y combinar con un:

## iSGLT2

Si se pretende reducir progresión del deterioro de TFGe y albuminuria (cana, dapa, empa)

Dosis máximas recomendada (sujeta a criterio del médico)

**Canagliflozina 300 a 100 (mg/día)**

**Dapagliflozina 10 (mg/día)**

**Empagliflozina 25 (mg/día)**

*Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.*

## arGLP1

Si se pretende reducir progresión de albuminuria (lira, sema, dula)

Dosis máximas recomendada

**Liraglutida 1.8 (mg/día)**

**Lixisenatida 20 (mg/día)**

**Dulaglutida 1.5 (mg/día)**

**Semaglutida 1.0 (mg/día)**

*Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.*

## iDPP41

Ajustar dosis

Dosis máximas recomendada (sujeta a criterio del médico)

**Alogliptina 25 o 12.5 (mg/día)**

**Gemigliptina 50 (mg/día)**

**Linagliptina 5 (mg/día)**

**Sitagliptina 100 a 50 (mg/día)**

**Saxagliptina 5 a 2.5 (mg/día)**

**Vildagliptina 100 a 50 (mg/día)**

*Para mayor información favor de consultar el artículo de investigación.*