


# CORRIGÉS FICHE 1

## □ Exercice 1 : compréhension

Dans le référentiel  $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ , on considère les parties  $D$  et  $T$  telles que :  
 $D$  = ensemble des multiples de 2 et  $T$  = ensemble des multiples de 3.

1. Placer les éléments de  $E$  dans chacun des deux dessins suivants :




2. Exprimer à l'aide d'opérations ensemblistes les parties suivantes et exprimer ces parties en extension :

- le sous-ensemble des multiples de 2 et 3  $T \cap D = \{6, 0\}$
- le sous-ensemble des multiples de 2 mais pas de 3  $D \setminus T = \{2, 4, 8\}$
- le sous-ensemble des multiples de 2 ou 3  $D \cup T = \{2, 8, 4, 6, 0, 9, 3\}$
- le sous-ensemble des multiples de 2 ou 3 mais pas des deux  $D \Delta T = \{2, 8, 4, 9, 3\}$
- le sous-ensemble des éléments de  $E$  qui ne sont ni multiples de 2 ni de 3  $\overline{D \cup T} = \{7, 1, 5\}$

## □ Exercice 2 :

$P$ ,  $Q$  et  $R$  sont trois parties d'un référentiel  $E$  représentées sur le diagramme de Venn ci-dessous :



1. Reporter les données dans le diagramme de Karnaugh.

2. Exprimer en extension les sous-ensembles suivants de  $E$  :

- $\overline{P} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $P \cap Q = \{n, o\}$
- $P \cup Q = \{f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $P \Delta Q = \{f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $\overline{P \cup Q \cup R} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $\overline{P \cap Q \cap R} = \overline{P \cap Q \cap R} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $\overline{P \cup Q \cap R} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $(\overline{P \cup Q}) \cap \overline{R} = \overline{P \cap Q \cap R} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$
- $\overline{P} \cup (\overline{Q \cap R}) = \overline{P} \cup \overline{Q \cap R} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z\}$

### □ Exercice 3 :

On considère les ensembles suivants :

$$A = \{1, 2, 3\} \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \quad C = \emptyset \quad D = \{3, 4, 5, 7\} \quad E = \{4, 6, 8\} \quad F = \{1, 4, 3\}$$

Décrire en extensions les ensembles :

- $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $A \cap C = \emptyset$
- $B \cup D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
- $B \cap A = \{1, 2, 3\} = A$
- $E \cap (B \cup D) = \{4, 6\}$
- $(E \cap B) \cup D = \{3, 4, 5, 6, 7\}$
- $(E \cup B) \cap D = \{3, 4, 5\}$
- $E \cup (B \cap D) = \{3, 4, 5, 6, 8\}$

Conclusion :  $(E \cup B) \cap D \neq E \cup (B \cap D)$ . Il faut respecter les priorités opératoires.

### □ Exercice 4

1).  $A = \{2^k / k \in \mathbb{N}, 0 \leq k \leq 6\}$

autre possibilité qui marche tout le temps mais n'est pas satisfaisante:

$$A = \{x \in \mathbb{R} / (x-1)(x-2)(x-4) \dots (x-64) = 0\}$$

•  $B = \{x \in \mathbb{N} / x \leq 20\}$

•  $C = \{2000 + 4k / k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 6\}$

2).  $D = \left\{ \frac{1-\sqrt{5}}{2}; \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right\}$  → on cherche les solutions de l'équation  $x^2 - x - 1 = 0$

•  $E = \{1\}$

•  $F = \{-1, 1\}$

•  $G = \{-1, 1; i; -i\}$

3).  $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

•  $B = ]-28; 4.5[$

•  $C = \emptyset$  (ou  $-3 \notin \mathbb{N}$ )

•  $D = \{1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15\}$

•  $E = \{0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24\}$

•  $F = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$

•  $G = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$

### □ Exercice 5:

1) ①  $T = C \cup B$

②  $G \subset C$

③  $\overline{G} \subset \overline{B}$  (ou  $B \subset G$ )

④  $C \subset G \cap H$

⑤  $H \cap R = \emptyset$  (ou  $H \subset \overline{R}$ )

⑥  $R = G$

$$2) a) \left. \begin{array}{l} \textcircled{6} R = G \\ \textcircled{5} H \cap R = \emptyset \\ \textcircled{4} C = G \cap H \end{array} \right\} \Rightarrow H \cap C = \emptyset \left\} \Rightarrow C = \emptyset$$

Comme  $\textcircled{2} G \subset C$ , alors  $G = \emptyset$


b)  $G = \emptyset$   
or  $B \subset G \textcircled{3}$ , donc  $B = \emptyset$

$\textcircled{1} T = C \cup B$  avec  $B = \emptyset$  et  $C = \emptyset$   
donc  $T = \emptyset$

## Exercice 6

Notons  $J$  l'ensemble de étudiants ayant pratiqué Javascript  
et  $P$  l'ensemble de étudiants ayant pratiqué Python.

On a alors  $|J| = 50$   $|P| = 40$   $|E| = 100$   
et  $|J \cap P| = 30$




On a  $|J \cup P| = 100 - 30 = 70$ .

or  $|J \cup P| = |J| + |P| - |J \cap P|$   
 $70 = 50 + 40 - |J \cap P|$

donc  $|J \cap P| = 50 + 40 - 70 = 20$

20 étudiants ont pratiqué les 2 langues.


## Exercice 7



1)  $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

2) On sait que  $|E| = 100$   $|M| = 32$   $|P| = 20$   $|B| = 45$   
 $|M \cap B| = 15$   $|M \cap P| = 7$   $|P \cap B| = 10$   $|\bar{P} \cap \bar{B} \cap \bar{M}| = 30$

a)



b) On sait que  $|\overline{P \cup B \cup M}| = 30$

$$\text{Donc } |P \cup B \cup M| = 100 - 30 = 70.$$

D'après la formule du 1), on a:

$$|P \cup B \cup M| = |P| + |B| + |M| - |P \cap B| - |P \cap M| - |B \cap M| + |P \cap M \cap B|$$

$$70 = 20 + 45 + 32 - 10 - 7 - 15 + |P \cap M \cap B|$$

$$70 = 65 + |P \cap M \cap B|$$

$$|P \cap M \cap B| = 70 - 65 = 5$$

5 étudient les 3 matières.

### Exercice 8:

$$1) A = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \mid 18\}$$

$$B = \{37, 74, 111\} = \{x = 37k \mid k \in \llbracket 1; 3 \rrbracket\}$$

$$C = \{7, 9, 11, 13\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ est impair et } x \in \llbracket 7; 13 \rrbracket\}$$

$$2) D = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$F = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$G = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

### Exercice 9:

T = "joue au Tennis"

G = "joue au Golf"

F = "joue au football"

$$|T| = 32$$

$$|G| = 17$$


$$|T \cap G| = 11$$

$$|G \cap F| = 1$$

$$|T \cap G \cap F| = 1$$

$$|T \cup F \cup G| = 80$$

1)



$$2) |T \cup F \cup G| = |T| + |F| + |G| - |T \cap F| - |T \cap G| - |F \cap G| + |T \cap F \cap G|$$

$$80 = 32 + |F| + 17 - 10 - 11 - 1 + 1$$

$$80 = 28 + |F|$$

$$|F| = 80 - 28 = 52$$

52 jouent au football.

$$3) 12 + 42 + 6 = 60$$

60 pratiquent un seul sport.

4) 6 personnes ne jouent qu'au Tennis.

